

〔第 1 圖 版〕



〔圖1右〕 玉咲つぐらふぢ雌株、(臺大、植物園栽植、昭和13年7月2日寫)


〔圖2左〕 同雄株、(臺大、植物園栽植、昭和8年4月基隆田寮港ヨリ持來、昭和13年4月寫)

〔第 2 圖 版〕



〔圖 1〕 玉咲つぐらふぢノ塊根ノ標準形(雄株1—7)
(臺中州楠子脚萬產、昭和13年2月寫)


〔第 3 圖 版〕



〔圖 2〕 同塊根、不定形(雄株1—6)
(臺中州埔子脚萬壹、昭和13年2月寫)


〔第 4 圖 版〕

C



〔圖 3〕 同塊根、正常形ノ小薯8箇、(雄株1—5, 7, 8)、(雌株6)
(臺中州楠子脚萬壟、昭和13年2月寫)


〔第 5 圖 版〕



〔圖 4〕 同塊根、小薯ヲ持テル母薯3箇、(雄株1, 3)、(雌株2)
(臺中州竹子脚萬達、昭和13年2月寫)

〔第 6 圖 版〕

E



〔圖 5〕 同塊根、圓筒形ノモノ9箇、(雄株1—7, 9)、(雌株8)
(臺中州埔子脚寓產、昭和13年2月寫)

〔第 7 圖 版〕




〔圖 1〕 臺中州和社溪左岸ノ自生地、一面鬼莖ノ草生ヲ見ル、海拔約600米(昭和13年11月10日寫)




〔圖 2〕 高雄州潮州郡クワルスノ自生地、主トシテ鬼莖ノ草生ヲ見ル、海拔約1000米(昭和15年1月11日寫)

〔第 8 圖 版〕




〔圖〕 臺灣ニ於ケル玉咲つゞらふぢ分布圖、(昭和14年12月調)

〔第 9 圖 版〕




〔圖1上〕 臺北州萬里加投ヨリ持來セル雄株、重量1.77瓩ノ薯(昭和14年2月12日計量)

〔圖2下〕 玉咲つぐらふぢ試作場全景、面積1畝歩、竹ノ支柱ヲ施セルトコロ



臺北帝大植物園內試作場（昭和14年4月25日寫）

〔第 10 圖 版〕



〔 圖 〕 新竹州控溪ニ於ケル增殖試驗、薯ノ莖極部ヲ栽植シテ多數ノ支根ヲ生ゼル狀、(昭和13年10月15日寫)

育種農藝科圖書



Y. Yamamoto, anal. K. Sakamoto, del. Stephania cepharantha, Hayata　たまさきつゞらふぢ (in mense Augusto anni 1938)

農藝科圖書