臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄

A List Pests of Fruit Plant from Taiwan and Mainland China

林奎順編著

Compiled by **Kwei-Shun Lin**

Taiwan Agricultural Research Institute

Wufeng, Taichung, Taiwan, R.O.C.

行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 100 號
Taiwan Agric. Res. Inst., Spec. Publ. No. 100

臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄

A List Pests of Fruit Plant from Taiwan and Mainland China

林 珪 瑞 編 著

Compiled by **Kwei-shui Lin**

行政院農業委員會 農業試驗所 印行
中華民國九十一年四月

Published by
Taiwan Agricultural Research Institute
Wufeng, Taichung, Taiwn. R.O.C
April, 2002.

序

林珪瑞先生在本所服務期間從事昆蟲—小蜂、瘿蜂、細蜂等分類研究凡四十餘年，爲國際知名的學者，發表論文無數，深受國內外學者之尊崇和肯定，此外曾就水稻害蟲及洋菇蟲之分類、生態及防治亦有極深入的研究、研究成果極具學術和應用之價值。林先生於十六年前(1986 年)自本所榮退，由於林先生對臺灣昆蟲學的傑出貢獻，獲得中華昆蟲學會頒贈「榮譽會員」證書的第一人，以表彰林先生一生對昆蟲學研究的成就。

在林先生退休十六年期間，有鑑於臺灣面積雖小，但由於地處亞熱帶和熱帶，地勢又可分爲熱帶、亞熱帶、溫帶、寒溫帶之氣候，因而植物種類多達 4,000 餘種，昆蟲之蘊藏種類極豐富而多樣化，已記錄者多達 15,000 種。因此世界各地的害蟲一旦侵入臺灣、極可能易於立足，對臺灣農業乃至於昆蟲相均有重大不利之影響。林先生乃毅然肩負起編著臺灣及中國大陸果樹害蟲名錄的重任。

十六年來雖經多次心導管手術，在身體並不健朗情況下，日復一日，年復一年，孜孜不倦，自強不息地搜集臺灣及中國大陸的相關資料，同時也利用陶家駒先生所贈送本所的有關文獻，總計達 3,166 篇，現已編著完成「臺灣和中國大陸果樹蟲名錄」巨著，850 餘頁，共包括害蟲 3,800 餘種。除列出各害蟲之學名、中名、寄主及分布、引用文獻外，並將害蟲的原記錄、異名、中文別名及天敵儘量列入。在引用文獻之後，又列出果樹名錄、害蟲學名索引、害蟲中文索引、寄主植物索引，可謂極爲周全，爲從事果樹害蟲必備的工具書，極具學術及應用價值，尤其在我國甫加入 WTO 之初，此書之出版，更具重大意義和價值。在此也特別對林先生嚴謹的治學態度和實是求是的研究精神，致以無上的敬意，並爲之序。

所長　林俊義　謹識

2002 年 4 月

前 言

中國位於亞洲東部，太平洋西岸，南自海南島，北迄黑龍江省的黑龍江，東自黑龍江省的烏蘇里江，西至新疆省的帕米爾高原，疆土遼闊，尚有 18,000 多公里的海岸線。在地形方面有長江中下游平原、華北平原、東北平原及四川盆地；江南丘陵、雲貴高原、青藏高原、黃土高原及內蒙古高原。北迴歸線貫穿臺灣、廣東、廣西及雲南；沿海地區屬海洋氣候，內陸則屬大陸氣候，在各高原地區則隨著海拔高度或高緯度而屬於寒溫帶氣候；就一般而言，中國南部小部份地區屬熱帶，漸往北就屬亞熱帶、溫帶、寒溫帶及寒帶氣候。

由於地理位置及地形特殊的關係，而影響整個氣候的千變萬化；因此，就可分爲若干氣候帶、氣候大區及氣候區。在各種氣候帶或氣候區的複雜環境下所產生的植物相就各不盡相同；當然，在南方若干地區往往由於高溫多濕的環境，以及若干熱帶雨林，所產生的植物種類顯然較往北方或諸高原爲多(雖然有部分原始森林)。就以臺灣而言，植物有 4,000 多種，福建 2,000 餘種，湖南的木本植物有 2,470 種，雲南有 14,000 種以上。一般昆蟲的發生或種類蘊藏量，端賴其食物建豐富所左右；植物相複雜的環境下，昆蟲發生種類就愈多。如臺灣將近 15,000 種，雲南省目前已知的昆蟲就有 11,000 多種。

因各地區的地理環境特殊關係，果樹種類甚爲豐富(包括鮮果、加工或貯藏)(如附錄)，其中有三種松樹產生松子供食用，故將其他有共通性松蟲列入。各地區因受氣候條件的限制，各有其獨特的果樹。在各地區果樹上發生的害蟲及爲害程度，往往亦有差異。經查文獻，發現僅有少部分重要果樹害蟲的報告，而無較完整所有果樹害蟲資料。因鑒於加入國際關稅貿易總協(WTO)，在入關後勢將有大量農產品湧進臺灣，當然包括果品在內，對於植物檢疫將形成相當嚴重問題。爲著將來進口種類繁多的果品檢疫工作，必需預作準備。茲就手頭現有有關果樹害蟲資料，將臺灣和中國大陸已知果樹害蟲編成名錄，共有 3,800 餘種，供爲同道參考。其中有少數種類雖然目前尚未記錄，但有可能會發生，值得檢疫當局特別重視。

編輯目錄時，原擬只編害蟲學名、中名、寄主及分佈，在害蟲中名之後加括弧中的引用文獻；其後再將害蟲的原記錄、異名、中文別名及天敵等儘量列入，所以多花一些時間。因手頭資料有限，恐有許多遺漏，並祈諸先進，同道及讀者賜予詳加指正，冀能提供有關資料，以資增訂時補充較完整名錄，則感幸甚!

在編輯目錄工作時，承蒙陶家駒先生及周樑鎰博士允許借用其私人搜集中國大陸的有關圖書及期刊，應用動物系羅主任幹成給予諸多方便，最初二三年間陳健忠博士安排農業委員會計劃補助部分津貼，姚美吉先生及古琇芷小姐在電腦處理方面給予很多幫助，在此一併誌謝！又內人謝雪梅女士在我編輯目錄進行的十三年間(另外尚編輯害蟲天敵一書)，全部負起家計內外，給我無後顧之憂，始能將全部時間投入工作，在此表示衷心感激！

編者
中華昆蟲學會榮譽會員
2002 年 3 月

臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄

目 次

序
前 言
INSECTA 昆蟲綱, 1
DERMAPTERA 革翅目, 1
Forficulidae 球螋科, 1
ISOPTERA 等翅目, 1
Kalotermitidae 木白蟻科, 1
Hodotermitidae 草白蟻科, 2
Rhinotermitidae 鼻白蟻科, 2
Termitidae 白蟻科, 4
ORTHOPTERA 直翅目, 7
Blattidae 蜚蠊科, 7
Pseudomorpidae 姬蠊科, 7
Acrididae 蝗蟲科, 7
Gryllidae 蟋蟀科, 12
Gryllotalpidae 螻蛄科, 13
Tettigoniidae 蠟蟬科, 14
PHASMIDA 竹節蟲目, 16
Phasmatidae 竹節蟲科, 16
THYSANOPTERA 纓翅目, 16
Thripidae 薊馬科, 16
Phlaeothripidae 管薊馬科, 28
HETEROPTERA 半翅目, 30
Plataspidae 龜蝽科, 30
Scutelleridae 盾蝽科, 31
Tessarotominae 慕蝽亞科, 33
Dinidorinae 兜蝽亞科, 34
Phyllocephalinae 短喙蝽亞科, 35
Pentatominae 蝽亞科, 35
Acanthosomatidae 同蝽科, 44
Urostylidae 異蝽科, 45
Coreidae 緣蝽科, 46
Pyrrhocoridae 紅蝽科, 50
Lygaeidae 長蝽科, 51
Berytidae 跷蝽科, 52
Miridae 盲蝽科, 52
Tingidae 網蝽科, 54
HOMOPTERA 同翅目, 56
Cicadidae 蟬科, 56
Cercopidae 沫蟬科, 59
Aphrophoridae 尖胸沫蟬科, 60
Machaerotidae 黑沫蟬, 60
Membracidae 角蟬科, 61
Fulgoridae 蠟蟬科, 62
Dictyopharidae 象蠟蟬科, 63
Achilidae 顏蠟蟬科, 64
Flatidae 蛾蠟蟬科, 64
Ricanidae 廣翅蠟蟬科, 64
Issidae 飾蠟蟬科, 67
Derbidae 袖蠟蟬科, 67
Delphacidae 草蠟蟬科, 67
Cixiidae 麥蠟蟬科, 67
Tropiduchidae 扁蠟蟬科, 68
Cicadellidae 葉蟬科, 68
Psyllidae 木蝨科, 82
Aleyrodidae 粉蝨科, 91
Adelgidae 球蚜科, 102
Phylloxeridae 根瘤蚜科, 103
Pemphigidae 綿蚜科, 104
Thelaxridae 群蚜科, 105
Greenideidae 毛管蚜科, 105
Hormaphidae 扁蚜科, 107
Lachnidae 大蚜科, 107
Drepanosiphidae 斑蚜科, 112
Aphididae 蚜蟲科, 114
Coccoidea 蚧蟲總科, 140
Monophlebidae 硕蚧科, 140
Ortheziidae 旌蚧科, 146
Pseudococcidae 粉蚧科, 146
Eriococcidae 絨蚧科, 156
Asterolecaniidae 星蚧科,157
Kerriidae 膠蚧科, 157
Kermesidae 紅蚧科, 158
Coccidae 蠟蚧科, 159
Diaspididae 盾蚧科, 179
COLEOPTERA 鞘翅目, 225
Corynetidae 隱翅郭公科, 225
Elateridae 叩甲科, 225
Bostrychidae 長蠹科, 226
Nitidulidae 出尾甲科, 227
Coccinellidae 瓢蟲科, 227
Meloidae 芫菁科, 228
Anthicidae 蟻形甲科, 229
Alleculidae 朽木甲科, 229
Mordellidae 花蚤科, 229
Trictenotomidae 三栉牛科, 229
Tenebrionidae 偽步行蟲科, 229
Anobiidae 窃蠹科, 230
Lagriidae 偽葉甲科, 230
Buprestidae 吉丁蟲科, 231
Dermestidae 皮蠹科, 235
Salvanidae 錐盾蕊科, 236
Lucanidae 鍬甲科, 236
Dynastidae 犀金龜科, 238
Melolonthidae 鰓金龜科, 239
Rutelidae 麗金龜科, 246
Cetoniidae 花金龜科, 251
Trichiidae 斑金龜科, 258
Valgidae 雙翅金龜科, 258
Cerambycidae 天牛科, 259
Prioninae 齒天牛亞科, 259
Aseminae 齒天牛亞科, 262

Disteniinae 瘦天牛亞科, 264
Lepturinae 花天牛亞科, 265
Cerambycinae 天牛亞科, 269
Laminae 溝腔天牛亞科, 288
Chrysomelidae 葉甲科, 313
Crioceridae 負泥蟲科, 313
Alticinae 跳甲亞科, 314
Chrysomelinae 葉甲亞科, 316
Galerucinae 螢葉甲亞科, 318
Eumolpinae 肖葉甲亞科, 322
Cryptocephalinae 隱頭葉甲亞科, 327
Clyptrinae 鋸角葉甲亞科, 327
Hispidae 鐵甲科, 328
Anisoderinae 潛甲亞科, 328
Hispinae 鐵甲亞科, 328
Cassidinae 龜甲亞科, 330
Attelabidae 卷象科, 331
Curculionidae 象蟲科, 334
Anthribidae 長角象科, 345
Platypodidae 長小蠹科, 345
Scolytidae 小蠹科, 346
LEPIDOPTERA 鱗翅目, 357
Hepialidae 蝙蝠蛾科, 357
Nepticulidae 微蛾科, 359
Tischeriidae 冠潛蛾科, 359
Tineidae 穀蛾科, 359
Hieroxestidae 蘚蛾科, 359
Psychidae 袋蛾科, 359
Gracillariidae 細蛾科, 365
Phyllocnistidae 潛葉蛾科, 367
Xyloryctidae 木蛾科, 368
Argyresthiidae 銀蛾科, 369
Oecophoridae 織蛾科, 369
Lecithoceridae 祝蛾科, 370
Gelechiidae 麥蛾科, 370
Coleophoridae 鞘蛾科, 372
Cosmopterigidae 尖翅蛾科, 372
Carposinidae 蛀果蛾科, 373
Glyphipterygidae 雕翅蛾科, 373
Yponomeutidae 巢蛾科, 373
Argyresthiidae 食心蛾科, 374
Lyonetiidae 潛蛾科, 375
Heliodinidae 舉肢蛾科, 376
Thyrididae 網蛾科, 377
Pyralidae 螟蛾科, 377
Pterophoridae 羽蛾科, 389
Sessidae 透翅蛾科, 390
Zygaenidae 斑蛾科, 391
Cossidae 木蠹蛾科, 392
Metarbelidae 髮木蠹蛾科, 395
Limacodidae 刺蛾科, 396
Cochylidae 細卷蛾科, 406
Tortricidae 卷蛾科, 406
Geometridae 尺蛾科, 427
Thyatiridae 波紋蛾科, 441
Drepanidae 鈎蛾科, 441
Eupterotidae 帶蛾科, 442
Bombycidae 蠶蛾科, 443
Lasiocampidae 枯葉蛾科, 445
Endromidae 樺蛾科, 461
Brahmaeidae 羅紋蛾科, 461
Saturniidae 大蠶蛾科, 462
Sphingidae 天蛾科, 466
Notodontidae 舟蛾科, 475
Lymantriidae 毒蛾科, 479
Lithosiidae 灰蛾科, 495
Arctiidae 燈蛾科, 496
Hypsiidae 擬燈蛾, 503
Amatidae 斑蛾科, 504
Nolidae 瘤蛾科, 505
Agaristidae 虎蛾科, 506
Noctuidae 夜蛾科, 507
RHOPALOCERA 蝶亞目,
Hesperiidae 弄蝶科, 540
Papilionidae 鳳蝶科, 5481
Pieridae 粉蝶科, 545
Lycaenidae 小灰蝶科, 546
Nymphalidae 蛺蝶科, 547
Danaidae 斑蝶科, 548
Satyridae 眼蝶科, 548
HYMENOPTERA 膜翅目, 549
Xyelidae 鞘葉蜂科, 549
Pamphiliidae 扁蜂科, 549
Xyphydriidae 項樹蜂科, 552
Siricidae 樹蜂科, 552
Cephidae 莖蜂科, 553
Diprionidae 松葉蜂科, 554
Tenthredinidae 葉蜂科, 558
Cynipidae 癭蜂科, 560
Eurytomidae 扁小蜂科, 561
Formicidae 蟻科, 561
Vespidae 胡蜂科, 562
Megachilidae 切葉蜂科, 565
Apidae 蜜蜂科, 565
DIPTERA 雙翅目, 565
Tipulidae 大蚊科, 565
Cecidomyiidae 癭蚊科, 566
Lonchaeidae 黑艷蠅科, 568
Chloropidae 稈蠅科, 568
Trypetidae 實蠅科, 568
Drosophilidae 果蠅科, 572
Agromyzidae 潛蠅科, 572
Anthomyiidae 花蠅科, 573
Fanniidae 厩蠅科, 573
Muscidae 蠅科, 573
ACARINA 蜱蟎目, 574
Varroidae 瓦蟎科, 574
Tarsonemidae 跗線蟎科, 574
Cunaxidae 巨鬚蟎科, 575
Stigmaeidae 長鬚蟎科, 575
Tetranychidae 葉蟎科, 575
Tenuipalpidae 細鬚蟎科, 592
Tuckerellidae 杜克蟎科, 594
(Tarsonemidae 細蟎科, 594)
Rhyncaphytoptidae 大嘴癭蟎科, 595
Eriophyidae 癭蟎科, 595

Diptilomiopidae 刺爪癭蟎科, 602
Sierraphytoptidae 鋸癭蟎, 602
Acaridae 粉蟎科, 602
Glycyphagidae 甜蟎科, 602
Carpoglyphidae 果蟎科, 603
NEMATODA 線蟲, 603
Trichodoridae 毛刺線蟲科, 603
Meloidogynidae 根結線蟲科, 604
Tylenchinae 墊刃亞科, 606
Psilenchinae 平滑墊刃亞科, 607
Ditylenchinae 莖亞科, 607
Tylenchorhynchinae 矮化亞科, 607
Pratylenchinae 短體亞科, 609
Radopholinae 穿孔亞科, 611
Hoplolaiminae 扭帶亞科, 611
Rotylenchinae 盤旋亞科, 612
Rotylenchulinae 腎臟亞科, 614
Criconematinae 環亞科, 615
Paratylenchinae 短體亞科, 616
Tylenchulinae 半穿刺亞科, 616
Aphelenchinae 真滑刃亞科, 617
Aphelenchoidinae 滑刃亞科, 617
Neotylenchinae 擬莖亞科, 619
Longistorinae 長針亞科, 619
Trichordorinae 毛刺亞科, 621
來明亞科線蟲, 621
FLORA 植物, 622
Convolvulaceae 旋花科, 622
LAGOMORPHA 兔形目, 623
Ochotonidae 鼠兔科, 623
Leporidae 兔科, 623
RODENTIA 嚙齒目, 623
Sciuridae 松鼠科, 623
Muridae 鼠科, 624
GASTROPODA 腹足綱, 632
PULMONATA 有肺目, 632
Helicarionidae 鷲甲蝸牛科, 632
Bradybaenidae 扁蝸科, 633
AVES 鳥綱, 633
Phasianidae 雉科, 633
Columbidae 鳩鴿科, 634
Picidae 啄木鳥科, 634
Sturnidae 椋鳥科, 635
Pycnonotidae 鵯科, 635
Corvidae 鴉科, 637
引用文獻
附錄 中國果樹名錄
害蟲學名索引
害蟲中名索引
害蟲寄主索引

臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄

A List Pests of Fruit Plant from Taiwan and Mainland China

林 珪 瑞 編 著

Compiled by **K. S. Lin**

(Beijing FC., 1980[ed.]:1-410; Chen, 1986:1-216; Chen, 1990[ed.]:1-401; Chen, Wang et Wei, 1980:1-317; Chu, 1952:1-213; Heilongjiang Mudingjiang FS, 1988[ed.]:1-332; Huang, 1990[ed.] 1:1-398, 2:1-240; Huang, Cheng et Wen, 1995; 1-308; Huang et al., 1989:1-226; Li, 1992[ed.]:1-146; Lin, 1986[ed.]:1-380; Qian, 1994[ed.]:1-165; Handong, FS[ed.]:1-411; Liang, 1989:176-198; Liu, 1982[ed.]:156-378; Shi,1985[ed.]:1-544; Suzhou, CS, 1985[ed.]:1-253; Sun, 1984[ed.]:1-429; Tao, 1980:185-260, Tao, 1999:1-144; Tao, 1999:1-176; Wu, 1995[ed.] 1-586; Yue, 1990[ed.]:1-110; Yue, 1991[ed.]:1-368; Zhang, 1985[ed.]:1-325; Zhang, 1986[ed.]:325; Zhongnan FC. 1987[ed.]:1-369; Zou et Cao, 1958:1-216)

INSECTA 昆蟲綱

DERMAPTERA 革翅目

Forficulidae 球螋科

1. **Eorsicula auricularia** Linnaeus 蠼螋 (Suzhou CS., 1985:246; Zheng, 1982:246)
   Eorsicula auricularia Linnaeus,
   寄 主：桑(芽)、蘋果、桃、核桃、煙草、榆、楊。
   分 佈：江蘇。

2. **Forficula auticularia** Linnaeus 蠼螋 (NZWDI, 1981:1095)
   Forficula auticularia Linnaeus,
   寄 主：桑(芽)、蘋果、桃、煙葉。
   分 佈：山西。

ISOPTERA 等翅目

(Zeng, 1999, 21(1):43-44)

Kaloteromidae 木白蟻科

3. **Cryptotermes declivis** Tsai et Chen 鏟頭堆砂白蟻 (Xiao, 1992:145)
   寄 主：木構件外尚危害荔枝、咖啡、椰子、榕樹、黃槿、無患子、楓楊等活樹。
   分 佈：福建、廣東、海南、廣西。

4. **Cryptotermes domesticus** (Haviland) 截頭堆砂白蟻 (Guangdong Ent. Res. Inst. 1979, 16(6):260-263; Huang et Dai, 1989, 11(4):196-198; 1990, 7(1):25-27; Huang et al., 1994, 16(2):94-96; 1994, 16(3):148-150; Huang et al., 1997, 19(4):165-168; Xiao, 1992:146)
   寄 主：房屋、木構件，荔枝、椰子、咖啡、榕樹、楓楊、苦楝、紫薇等。

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南；越南、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、澳洲、太平洋諸島嶼、哥斯達黎加、巴拿馬。

5. **Glyptotermes fuscus** Oshima 黑樹白蟻 (ASZI, 1986,1:30; Huang et al., :158; Luo et Jin, 1997:74)

Glyptotermes fuscus Oshima 1912:

寄 主：橡果、波蘿蜜、白楊、茄苳。

分 佈：臺灣、海南、雲南、四川、湖北；琉球、石垣島、小笠原群島。

6. **Glyptotermes liangshanensis** Gao et al. 涼山樹白蟻 (Gao et al., 1982:67)

Glyptotermes liangshanensis Gao et al., 1982:67.

寄 主：核桃(*Juglans regia* L.)。

分 佈：四川。

7. **Glyptotermes satsumensis** (Matsumura) 赤樹白蟻 (Huang et al., 1989:134; Hun., 1992:25; Xiao, 1992:148)

Glyptotermes satsumensis (Matsumura 1904:)

寄 主：板栗及伐倒木。

分 佈：臺灣、海南、廣西、雲南、湖南；日本。

8. **Neotermes koshunensis** (Shiraki) 恒春新白蟻 (Xiao et al., 1996, 18(4):171)

寄 主：木棲。

分 佈：臺灣、海南。

Hodotermitidae 草白蟻科

9. **Hodotermopsis japonicus** Holmgren et Li 東方原白蟻 (Cai et Lin, 1995:56; Li & Ping, 1988:301)

Hodotermopsis japonicus Holmgren, Li, 1979.

=*Hodotermopsis sjostedti* Holmgren, Tsai et Huang, 1980.

=*Hodotermopsis oreintalis* Li et Ping, 1988:301.

寄 主：黃山松等。

分 佈：浙江。

10. **Hodotermopsis sjstedti** Holmgren 山林原白蟻 (Huang et al, 1989:198; Hun., 1992:26; Xiao, 1992:149; Zhu et al., 1992:45)

Hodotermopsis sjstedti Holmgren, 1911:

寄 主：建巢於樹木內，危害活樹及伐倒木，包括粵松、圓櫧、中華五加、牯嶺甜櫧、紫荊、赤楠、狹葉泡花樹、楊桐、檜木、烏飯樹、冬青、金葉白蘭、長苞鐵杉、檜木、栗類、櫟類、馬尾松等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江；日本、越南。

Rhinotermitidae 鼻白蟻科

11. **Coptotermes ceylonicus** Holmgren 錫蘭家白蟻 (Lin, 1988:116; Zhang, 1987[ed.]:11)

別 名：*普見家白蟻*。

寄 主：椰子、棕櫚、茶樹、向日葵、甘蔗、橡膠、樟、楊、松、柏、杉、竹、農林植物等。

分 佈：江西、雲南；印度南部、斯里蘭卡。

12. **Coptotermes curvignathus** Holmgren 大家白蟻 (Chen, 1994, 20(3):33; Lin, 1988:116)

寄 主：柑橘、檬果、咖啡、橄欖、椰子、油棕、松樹、橡膠、柚木、桉樹、桃花心木、南洋杉、木棉、合歡、黃檀等。

分 佈：廣東；越南、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、印度、印尼文萊。

13. **Coptotermes formosanus** Shiraki 家白蟻 (Beijing FC., 1980[ed.]:355-356; Cai et Lin, 1995:57; Chai, 1995, 11(2):68-69; Chao, 1982:16; Chang & Hung, 1986:7; Fan et Li, 1996(4):27; He et al., 1997, 19(2):70-74; He et al., 1997, 19(3):130-132; Huang et al., 1989:255; Lin, 1988:114; Liu, 1982[ed.]:305-307; Liu, 1997, 19(4):169-172; Teng, 1999(2):36; Tsai, 1965:17; Xiao, 1992:151; Xiao et al., 1996, 18(4):171; Zeng, 1999, 21(1):43-44; Zhu et al., 1992:45)

Coptotermes formosanus Shiraki, 1909:

=*Coptotermes formosane*; Holmkgven,

=*Termes raffrayi* Matsumura,

=*Termas gestroi* Oshima,

別 名：*臺灣兇白蟻*。

寄 主：銀杏、桑、板栗、槍、柏、麻櫟、梧桐、合歡、臭椿、棕櫚、衛矛類、懸鈴木、桉、松、杉、竹、茶、木樁等木材、製品及活樹已死部分、爲橘樑、房屋及綠化林木嚴重的土、木兩棲白蟻。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；朝鮮、日本、琉球、菲律賓、夏威夷、美南部各州。

天 敵：真菌、細菌、蜻類、螞蟻、蝙蝠、蟾蜍、蛙、壁虎、蜥蜴。

14. **Heterotermes aculabialis** (Tsai et Hwang) 尖唇異白蟻 (Huang et al., 1989:384; Hun., 1992:34)

Heterotermes aculabialis (Tsai et Hwang 1977)

=*Reticulitermes chinensis chinensis* Hsia et Fan,1965:

寄 主：松、杉、懸鈴木等樹皮及伐樁。

分 佈：福建、廣東、廣西、四川、雲南、江西、浙江、江蘇、安徽、湖南、湖北、河南、陝西、甘肅。

15. **Reticulitermes bitumulus** Ping et Xu 雙峰散白蟻 (Zhu et al., 1992:48)

寄 主：成活松樹幹部及伐樁。

分 佈：貴州、四川。

16. **Reticulitermes (Planifrontotermes) brachygnathus** Li et al. 短顎散白蟻 (Li et al., 1982:101)

Reticulitermes (*Planifrontotermes*) *brachygnathus* Li et al., 1982:101.

寄 主：荊桑(*Morus* sp.)。

分 佈：四川。

17. **Reticulitermes brevicurvatus** Ping et Xu 短彎網白蟻 (Ping et Xu, :1983:154; Zhu et al., 1992:46)

Reticulitermes brevicurvatus Ping et Xu, 1983:154.

寄 主：馬尾松(伐根)

松樹頭。

分 佈：貴州。

18. **Reticulitermes chinensis** Snyder 黑胸散白蟻 (Zhang, 1987[ed.]:12)

寄 主：松、杉、樁、枸等木材，甘蔗、毛竹、枯立木、松、柏等伐根。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北；印度。

19. **Reticulitermes fukienensis** Light 花胸散白蟻 (Cai et Lin, 1995:57)
寄 主：活樹已死部分或經砍伐的樹樁及根內。
分 佈：福建、浙江、江蘇。

20. **Reticulitermes gullinensis** Li et Xiao 桂林散白蟻 (Li et Xiao, 1989:466)
Reticulitermes guilinensis Li et Xiao, 1989:466.
寄 主：濕地松。
分 佈：廣西(桂林)。

21. **Reticulitermes guizhouensis** Ping et Xu 貴州散白蟻 (Zhu et al., 1992:47)
寄 主：松樹及伐根、楓楊、杉樹等。
分 佈：湖南、貴州、四川。

22. **Reticulitermes leptogulus** Ping et Xu 細頸散白蟻 (Zhu et al., 1992:48)
寄 主：松樹頭。
分 佈：福建、貴州。

23. **Reticulitermes microcephalus** Zhu 小頭散白蟻 (Zhu, 1984:108; Zhu et al., 1992:46)
Reticulitermes microcephalus Zhu, 1984:108.
寄 主：馬尾松。
分 佈：廣東、廣西、貴州。

24. **Reticulitermes parvus** Li 小散白蟻 (Zhu et al., 1992:47)
寄 主：松樹根。
分 佈：湖南、浙江。

25. **Reticulitermes speratus** (Kolbe) 大和白蟻 (Chao, 1982:16; Chang & Hung, 1986:7; Teng, 1999(2):36; Xiao, 1992:155)
Leucotermes speratus Kolbe,
Reticulitermes speratus,
別 名：*長頭白蟻*，*黃胸散白蟻*。
寄 主：柑橘類、桑等。
分 佈：臺灣、湖南；日本、朝鮮。

26. **Reticulitermes xingyiensis** Ping et Xu 興義網白蟻 (Ping et Xu, 1983:153)
Reticulitermes translucens Ping et Xu, 1983:153.
寄 主：華山松。
分 佈：貴州。

Termitidae 白蟻科

27. **Capritermes nitobei** (Shiraki) 歪白蟻 (Chao, 1982:19)
別 名：*歪嘴白蟻*，*曲頸白蟻*。
寄 主：果樹、林木、甘蔗、木薯、甘薯、花生、馬鈴薯、小麥等。
分 佈：臺灣、福建。

28. **Macrotermes barneyi** Light 黃翅大白蟻 (ASZI, 1986, 1:42; Cai et Lin, 1995:57; Chao, 1982:19; Chen, 1996, 22(2):27; Chen et al., 1993:113; Fan et Li, 1996(4):27; Teng, 1999(2):36; Xiao, 1992:157; Xiao et al., 1996, 18(4):171; Zhang, 1987[ed.]:10)

Macrotermes barneyi Light, 1924:

寄　主：板栗、桃、李、棗、楊梅、杉、擦、樟、桉樹、刺槐、懸鈴木、重陽木、油茶橡膠、泡桐、木薯、甘蔗、小麥等，被害樹木達 100 多種。

分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、長江以南諸省；越南。

29. **Macrotermes dimorphus** Tsai et Chen 小頭蠻白蟻 (Lin, 1988:95)

寄　主：椰子苗、甘蔗、雜草、樹皮、木柱、枯竹、樹枝幹等。

分　佈：廣西、雲南。

30. **Nasutitermes parvonasutus** (Shiraki) 小象白蟻 (Teng, 1999(2):36; Xiao, 1992:161)

寄　主：板栗、甜櫧、青栲、小葉櫟等活樹，也危害枯立木、伐倒木等。

分　佈：臺灣、福建、湖南。

31. **Odontotermes formosanus** (Shiraki 1909) 黑翅土白蟻 (Beijing FC., 1980[ed.]:353-355; Cai et al. Lin, 1995:57; Chang, 1982:288; 1987:40; Chao, 1982:20; Chang & Hung, 1986:7; Chen, 1996, 22(2):27; Chen et al., 1993:111; Fan et Li, 1996(4):27; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:237-239; Huang, 1990[ed.] 2:301; Huang et al., 1989:476; Hun., 1992:35; Lin, 1988:58; Luo, 1991:83; Liu, 1982[ed.]:304-305; Liu, 1995:52-54; Luo et al., 1996:52; Tsai, 1965:17; Wang, 1987[ed.]:347-348; Wu, 1977:78-80; Xiao, 1992:162; Xiao et al., 1996, 18(4):171; Yunn., 1987:93; Zeng, 1999, 21(1):43-44; Zhang, 1985[ed.]:250-252; Zhang, 1987[ed.]:11; Zhu et al., 1992:56)

Odontotermes formosanus (Shiraki 1909)

別　名：*臺灣白蟻*，*臺灣黑翅大白蟻*，*黑翅大白蟻*。

寄　主：雜食，板栗、栗類、核桃、棗、柑橘、梨、桃、李、櫻桃、沙果、枇杷、龍眼、檬果、錫蘭橄欖、葡萄、鳳梨、香蕉、咖啡、桑、腰果、松、木蓮、藍果樹、杉、擦、樟、楠、泡桐、木荷、櫟類、油茶、油桐、甘蔗、麻黃、藥材等 70 多種，地下電纜、水庫堤壩，爲農林和水利主要害蟲。

分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅；琉球、越南、泰國、緬甸。

天　敵：(Zhang et Li, 1982:227-230)

Scolopendridae　蜈蚣科

Scolopendra subspinipes　少刺蜈蚣

Araneidae　圓蛛科

Araneus cornuta Clerck　角突圓蛛

Araneus sia Strand　葉斑圓蛛

Araneus ejusmodi Boes. et Str.　黃斑圓蛛

Araneus ventricosa (L. Koch)　大腹圓蛛

Agelenidae　漏斗蛛科

Agelena difficilis Fox　機敏漏斗蛛

Linyphiidae　華蓋蛛科

Nereine radiata Walckenaer　花腹蓋蛛

Oxyopidae　貓蛛科

Oxyopes sertatus L. Koch　斜紋貓蛛

Clubionidae　管巢蛛科

Clubiona maculata Song et Chen　斑管巢蛛

Lycosidae 狼蛛科
Lyeosa auribrachialis Schenkel 黑腹狼蛛
Lyeosa pseudoanulata (Boes. et Str.) 擬環狼蛛
Pardosa laula Karsch 溝渠狼蛛
Pardosa T-insignita Boes. et Str. 丁斑狼蛛
Aeshnidae 晏蜓科
Anax sp. 晏蜓
Labiduidae 蠼螋科
Labidura riparia 蠼螋
Staphlinidae 隱翅蟲科
翹尾隱翅蟲
Carabidae 步甲科
Formicidae 蟻科
Polyrhachis sp. 多刺蟻
Asilidae 食蟲虻科
Bufonidae 蟾蜍科
Bufo b. gargarizans Vantor 大蟾蜍
Microhylidae 姬蛙科
Microhyla ornata (Dumer et Bibron) 飾紋姬蛙
Ranidae 蛙科
Rana adenopleura Boulenger 彈琴蛙
Rana j. japonica Guenther 日本林蛙
Rana nigromaculata Hallowell 黑斑蛙
Rana limnocharis Boie. 澤蛙
Scincidae 石龍子科
Sphenomarphus indicus (Gray) 銅石龍子
Caprimulgidae 夜鷹科
Carprimulgus indicus Latham 夜鷹
Hirundinidae 燕科
Hirando durica Linnaeus 金腰燕
Vespertilionidae 蝙蝠科
Pipistrellus abramus Temminck 普通伏翼
Soricidae 鼩鼱科
Suncus murinus 臭鼩鼱

32. **Odontotermes hainanensis** (Light) 海南土白蟻 (Chao, 1982:20; Huang, et al.1989:483; Li et al., 1988: 32-36)
Termes hainanensis Light, 1924:
寄 主：荔枝、橡膠樹、油桐等林木、果樹、甘蔗、甘薯、木薯、馬鈴薯、小麥。
分 佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南。

33. **Odontotermes quingdentatus** Pin et Xu 五齒土白蟻 (Zhu et al., 1992:56)
寄 主：與黑翅土白蟻相似。
分 佈：貴州。
附 註：巢中的菌圃長出白柄雞從菌 *Ternitomyces albiceps* He.。

34. **Odontotermes zunyiensis** Li et Pin 遵義土白蟻 (Zhu et al., 1992:55)
寄 主：類似黑翅土白蟻。
分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、四川、安徽。

35. **Pericapritermes parallelus** Li 平扁近歪白蟻 (Zhu et al.,1992:56)
寄 主：松樹根部。
分 佈：貴州、四川。

ORTHOPTERA 直翅目

Blattidae 蜚蠊科

36. **Blatta orientalis** Linnaeus 東方蜚蠊 (Zhang, 1987[ed.] 1:9)
寄 主：柑橘、茶、向日葵、甘蔗、廚房食物。
分 佈：江西。

37. **Periplaneta fuliginose** Serv. 黑胸大蠊 (Feng et Wu, 1992:39)
寄 主：果品、廚房食物。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、安徽、河北、遼寧；日本、美國。

Pseudomorpidae 姬蠊科

38. **Blattella germanica** (Linnaeus) 德國蜚蠊 (Ma et al., 1995:52; Wu et Feng, 1992:55; Zhang, 1987[ed.] :9)
Blattella germanica (Linnaeus, 1767:)
別 名：*德國小蠊*。
寄 主：柑橘、玉米、食品、油脂、菜餚、各種皮毛。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、上海、陝西、北京、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；世界廣布。

Acrididae 蝗蟲科 (Locustidae)

39. **Acrida chinensis** 中華蚱蜢 (Zhou et Zhang, 1995:38; Zhang, 1987[ed] :17)
寄 主：柑橘、梨、桃、李、香蕉、水稻、高粱、玉米、粟、花生、甘蔗、大豆、甘薯、棉花、煙草、蘿菜、向日葵、竹、泡桐等。
分 佈：江西、廣東。

40. **Acrida cinerea** Thunberg 中華劍角蝗 (Bi et al., 1992:79; Chi et Liu, 1997:132; Hun., 1992:70)
Acrida cinerea Thunberg, 1815:
寄 主：柑橘、桃、李、板栗、馬尾松、油茶、茶樹、楊、柳、榆、毛竹、泡桐、油桐等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏。

41. **Aiolopus tamulus** (Fabricius) 花脛綠紋蝗 (Bi et al., 1992:77; Huang, 1992:70; Zhang, 1987[ed] :19)
Aiolopus tamulus (Fabricius, 1798:)

寄 主：柑橘、稻、麥、高粱、玉米、粟、甘蔗、棉、蘆葦、竹、白茅等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧；日本、菲律賓、馬來西亞、印度。

42. **Atractomorpha lata** (Motschulsky) 長額負蝗 (ASZI, 1986, 1:69; Bi et al., 1992:73; Chang & Hung, 1986:5; Hun., 1992:51; Luo, 1991:83; Tsai, 1965:10)
=*Atractomorpha bedeli* Bolivar,
寄 主：懸鉤子類、草莓、桑、腰果、樟、赤楊、陸稻、甘蔗、豆類、棉、白菜、煙草、萵苣、蠶菜、落花生、蘿蔔、結球白菜、豆薯等。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、江蘇、上海、陝西、山東、河北、北京；朝鮮、日本、琉球群島。

43. **Atractomorpha sinensis** Bolivar 短額負蝗 (ASZI, 1986, 1:69; Bi et al., 1992:73; Chang & Hung, 1986:5; Huang, 1992:65; Huang et Cheng, 1997:127; Hu et Hu, 1993:128; Hun., 1992:51; Yunn., 1992:53, 62; Zhou et Zhang, 1995:38)
Atractomorpha sinensis Bolivar, 1905:
=*Atractomorpha ambigua* Bolivar,
寄 主：食性雜，柑橘、梨、桃、李、草莓、葡萄、鳳梨、香蕉、桑、茶、陸稻、甘蔗、蔬菜、雜糧、亞麻、黃麻、棉、甘薯、煙草、洋蔥、粉薯(葛鬱金)、七島藺、奎寧、竹、樟、楊、柳、烏桕等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、甘肅、青海；琉球、越南、美國、巴西、萊恩群島。

44. **Aularches miliaris scabiosae** Fabricius 黃星蝗 (Xiao, 1992:119)
寄 主：椰子、檳榔、檸果、木麻黃、柚木等多種農作物。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、貴州；印度、巴基斯坦。

45. **Catantops pinguis pinguis** (Stål) 紅褐斑腿蝗 (Huang, 1992:69; Huang et Cheng, 1997:126; Zhang, 1987[ed]:14)
Catantops pinguis (Stål, 1860:)
寄 主：桑、水稻、小麥、玉米、高粱、甘薯、茶、油茶、棉花等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅；日本、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

46. **Catantops** sp. 細線斑腿蝗 (Wang et al., 1994(4):40)
寄 主：柑橘。
分 佈：江西。

47. **Catantops** sp. 褐斑腿蝗 (Wang et al., 1994(4):40)
寄 主：柑橘。
分 佈：江西。

48. **Chondracris rosea rosea** (De Geer) 大青蝗 (ASZI, 1986, 1:62; Bi et al., 1992:74; Chao, 1982:10; Chang & Hung, 1986:5; Chen et al., 1996, 18(4):(Suppl.):11-13; Huang, 1992:68; Huang et Cheng, 1997:124; Hun., 1992:53; Liu et al., 1995, 11(2):34-41; Liu et al., 1998, 20(3):97-105; Liu et al., 1999, 21(3):97-106; Luo, 1991:83; Luo et al., 1996:52; Su et al., 1979, (3):171-177; Tsai, 1965:10; Xiao, 1992:126; Yunn., 1987:42, 60; Zhang, 1987[ed]:14)

別 名：*臺灣大青蝗*，*棉蝗*。

寄 主：雜食性，柑橘、橡果、可可、香蕉、腰果、甘蔗、花生、苧麻、水稻、大豆、雞蘿、棉花、竹類、甘薯、木豆、茶、木麻黃、杉木、相思樹、柚木、刺槐、棕櫚等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、內蒙古；朝鮮、日本、越南、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、爪哇。

天 敵：真菌
單枝蟲霉屬
抱瘟病
Namatoda 線蟲
蠅蜋
麻蠅
家禽

49. **Frubstorferiola viridifemorata** (Caudell) 綠腿腹露蝗 (Bi et al., 1992:75; Zhang, 1987[ed] :15)

寄 主：梨、無花果、馬鈴薯、四季豆、莧菜、芝麻、向日葵、菊芋、白菜、扁豆、小紅豆、西瓜、河柳、胡枝子、黃荊、大青、楊、法國梧桐、樟、泡桐、楓楊、紫藤等。

分 佈：江西、湖南、浙江、安徽、湖北。

50. **Gastrimargus marmoratus** (Thunberg) 雲斑車蝗 (Bi et al., 1992:77; Huang, 1992:71; Huang et Cheng, 1997:129; Hua., 1992:66; Zhang, 1987[ed.] :19)

Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815:)

寄 主：柑橘、馬尾松等松類、油茶、桉樹、水稻、玉米、高粱、小麥、粟、花生、大豆、芋、甘蔗、禾本科雜草等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、甘肅；朝鮮、日本、菲律賓、越南、泰國、緬甸、印度、克什米爾、印尼、巴布亞新幾內亞、非洲。

51. **Gesonia punctifrons** Stål 琉球蝗 (Tsai, 1965:11)

寄 主：香蕉、稻、粟、甘蔗、芋等。

分 佈：臺灣、華南；琉球。

52. **Gesonula punctifrons** (Stål) 芋蝗 (Lao et Jin, 1995:84)

寄 主：酪梨(枝)、芋、水稻、玉米、甘蔗等。

分 佈：臺灣、福建、江西、海南。

53. **Gonista bicolor** (Haan) 二色戛蝗 (Bi et al., 1992:79; Zhang, 1987[ed.] :18)

寄 主：柑橘、甘蔗、稻、玉米等。

分 佈：臺灣、江西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東、河北、甘肅；朝鮮、日本、馬來西亞。

54. **Locusta migratoria manilensis** (Meyen) 東亞飛蝗 (Huang, 1992:70; Huang et Cheng, 1997:128; Qin et al., 1954, 4(4):383-398; Zhang, 1987[ed.] :19; Zhang et Li, 1996, 22(4):49; Zhao et al., 1997:191)

Locusta migratoria manilensis (Meyen, 1835:)

寄 主：棉、水稻、玉米、高粱、粟、大麥、小麥、燕麥、黑麥、黍、大豆、油菜等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏；菲律賓、馬來半島、印度、印尼。

55. **Locusta migratoria migratoria** Linnaeus 亞洲飛蝗 (Huang et Liu, 1996:41)

Locusta migratoria migratoria Linnaeus, 1758:

寄 主：雜食。

分 佈：甘肅、新疆、內蒙古、東北；朝鮮、蒙古、中亞、外高加索。

56. **Locusta migratoria tibetensis** Chen 西藏飛蝗 (Huang, 1992:70; Huang et Liu, 1996:41)

Locusta migratoria tibetensis Chen, 1963:

寄 主：雜食。

分 佈：西藏、青海。

57. **Oedaleus manjius** Chang 紅脛小車蝗 (Bi et al., 1992:77; Huang et Cheng, 1997:128; Hun., 1992:64; Zheng, 1995:70)

寄 主：柑橘、火炬松、水稻、小麥、玉米、高粱、甘蔗、禾本科植物、大豆、棉、亞麻、馬鈴薯等。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西。

58. **Oxya chinensis** (Thunberg) 中華稻蝗 (Bi et al., 1992:75; Chen et Gao, 1989, 15(5):17-18; Huang, 1992:66; Huang et Cheng, 1997:123; Hun., 1992:59; Luo, 1992, 29(4):193-195; Shen et al., 1988, 25(3):134-137; Wang et al., 1996, 22(4):3-5; Zhang, 1987[ed.]:16; Zhang et al., 1993, 16(4):453-457; Zhou et Zhang, 1995:37-41)

Oxya chinensis (Thunberg, 1815:)

寄 主：柑橘、桃、香蕉、油菜、茶、毛竹、泡桐、水稻、小麥、蕎麥、玉米、高粱、黍、甘薯、馬鈴薯、十字花科蔬菜、蘿菜、茭白、芋、豆類、大豆、甘蔗、苧麻、棉、蓖麻、竹等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、吉林；朝鮮、日本、蘇聯、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、巴基斯坦、印尼、已布亞新幾內亞、澳洲、新不列顛(大西洋)、毛里求斯、美洲。

59. **Oxya intricata** (Stål) 小稻蝗 (Bi et al., 1992:75; Huang et Cheng, 1997:122; Tsai, 1965:11; Zhang, 1987[ed.]:16)

Oxya intricata (Stål, 1861:)

=*Oxya insularis* Willemse,

=*Oxya universlis* Willemse,

寄 主：可可椰子、稻、甘蔗、甘薯、玉米、麥、黍、甘薯、茭白、芋、蔬菜、大豆、七島藺、竹等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、甘肅；日本、琉球、菲律賓、婆羅洲、西里伯、爪哇、蘇門答臘、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

60. **Oxya japonica** Willemse 短翅稻蝗 (Chang & Hung, 1986:5; Huang et Cheng, 1997:123)

寄 主：柑橘類。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川、湖北；朝鮮、日本。

61. **Oxya velox** Fabricius 長翅稻蝗 (Chang & Hung, 1986:5; Tsai, 1965:12; Zhang, 1987[ed.]:16)

寄 主：柑橘類、鳳梨、稻、麥、玉米、甘薯、棉、禾本科植物、七島藺等。

分 佈：臺灣、江西、中國大陸；朝鮮、日本、印度。

62. **Patanga japonica** Boliver 土蝗 (Chao, 1982:11; Chang & Hung, 1986:5; Luo et al., 1996:52; Tsai, 1965:12; Zhang, 1987[ed.]:16)

別 名：*日本黃脊蝗*、*橘黃脊蝗*。

寄 主：柑橘類、檬果、茶、甘蔗、水稻、杉木等。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、山東、甘肅；朝鮮、日本、印度、錫金。

63. **Patanga succincta** (Linnaeus) 背條土蝗 (ASZI, 1986, 1:63; Huang, 1992:68; Tsai, 1965:12; Yunn., 1987:60; Zhang, 1987[ed.]:16)

別 名：*印度黃脊蝗*。

寄 主：柑橘、椰子、桑、水稻、高粱、小麥、黍以及其他栽培的和野生的植物等。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川；巴基斯坦、印度、馬來群島。

64. **Shirakiacris shiraki** (Bolivar) 長翅素木蝗 (Bi et al., 1992:74; Huang et Cheng, 1997:127; Zheng, 1995:70)

寄 主：多種果樹、茶、杉木等。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅、吉林；日本。

65. **Stenocatantops splendens** Thunberg 長角直斑腿蝗 (Bi et al., 1992:74; Hun., 1992:53; Luo et Jin, 1995:84)

別 名：*線斑翅蝗*，*細線斑蝗*。

寄 主：檜、酪梨(枝、葉)、桑、茶、毛竹、油桐、油茶、杉木、相思、油棕、棕櫚等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、河南；越南、印度、錫金、尼泊爾。

66. **Tonkkincris sinensis** Chang 中華越北蝗 (Hun., 1992:56)

寄 主：核桃、桑、泡桐、毛竹、叢竹、水竹等。

分 佈：湖南、廣西、貴州、四川、雲南；越南。

67. **Trilophidia annulata** (Thunberg) 疣蝗 (Bi et al., 11992:78; Chang & Hung, 1986:6; Huang, 1992:72; Huang et Cheng, 1997:128; Hun., 1992:64; Tsai, 1965:13)

Trilophidia annulata (Thunberg, 1815:)

寄 主：桑、甘蔗、甘薯、苦竹、雜木等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、泰國、緬甸、印度、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、爪哇、非洲。

68. **Trilophidia annulata mongolica** Saussure 蒙古疣蝗 (Zhang, 1987[ed.]:20)

寄 主：桑、水稻、大麥、小麥、甘薯、甘蔗、玉米、高粱、粟、棉、白菜、甘藍、

苧麻、芋、綠肥作物、蓖麻等。
分 佈：江西。

Gryllidae 蟋蟀科

69. **Callyptotrypus hibinonis** Matsumura 淡綠樹蟋 (Zhang, 1987[ed.]:23)
寄 主：柿、梨、杏、桃、李、棗、洋槐等。
分 佈：江西。

70. **Cardiodactylus novaeguineae** (Haan) (Yang, 1999:164)
Platydactulus novaeguineae Haan, 1842:
寄 主：檳榔(葉片)。
分 佈：臺灣；菲律賓、印度半島、澳洲。

71. **Dianemobius fascipes** (Walker) 斑腿雙色針蟋 (Xia et Liu, 1992:104; Yang, 1999:162)
Dianemobius fascipes (Walker, 1869:)
棲 所：果園、短草地。
寄 主：果樹幼苗等。
分 佈：臺灣、四川、湖北；菲律賓、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

72. **Gryllocles hemelytrus** Saussure 斗蟋蟀 (Chen et al., 1993:99; Hu et Hu, 1993:128)
寄 主：蘋果、梨、草莓、柿、棗及作物幼苗等。
分 佈：江蘇、長江及黃河流域。

73. **Gryllus bimaculata** (De Geer) 雙斑蟋 (ASZI, 1986, 1:100; Chao, 1982:6; Tsai, 1965:14; Wang et Wu, 1994:371; Wu et Zheng, 1992:Yang, 1999:160; Yuan., 1987:70)
Acheta bimaculatus De Geer, 1773:
別 名：*黑蟋蟀*，*甘蔗黑蟋蟀*，*蔗芽蟋蟀*。
寄 主：雜食，柑橘、梨、桃、沙果、梅、李、鳳梨、稻、甘蔗、甘薯、瓜類、棉、亞麻、瓜類、茶樹、松、杉、楊等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、浙江；日本、琉球、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、土耳其、南歐。
天 敵：Godius sp. 線蟲(寄生成蟲)
Trembidium sp. 紅螨(寄生若蟲及成蟲)
Liris aurata Fabricius 泥蜂(捕食若蟲)
Larra sp. 泥蜂(捕食若蟲)

74. **Gryllus chinensis** Weber 中華蟋 (Hun., 1992:71)
寄 主：松類等林木幼苗等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河北。

75. **Gryllus testaceus** Walker 南方油葫蘆 (ASZI, 1986, 1:98; Chen et al., 1993:97; Liu, 1982[ed.]:173-174; Zhao et al., 1997:193; Zhang, 1987[ed.]:24)
別 名：*黃褐油葫蘆*，*油葫蘆*。
寄 主：棕、桃、李、棗、鳳梨(果實)、大豆、綠豆、芝麻、花生、甘薯、馬鈴薯、蘿蔔、蔬菜、茭白、小米、玉米、高粱、蓖麻、棉、麥、蕎麥、甘蔗、茶、

油茶、松、柏、杉、楊、柳等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽、河南、陝西、河北、寧夏；日本、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

76. **Loxoblemmus doneitzi** Stein 大扁頭蟋 (ASZI, 1986, 1:100; Chen et al., 1993:98; Chen et al., 1995:78; Hu et Hu, 1993:128; Hua., 1992:73; Wang et Wu, 1994:371; Xia et Liu, 1992:103)

別 名：*棺頭蟋蟀*，*德氏棺頭蟋*。

寄 主：草莓、棗、松、杉嫩苗及玉米、花生等。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、北京；日本。

77. **Pteronemobius chibae** (Shiraki) (Yang, 1999:162)

Nemobius chibae Shiraki, 1911:

棲 所：果園幼苗、蕉田、短草地等。

寄 主：

分 佈：臺灣、中國大陸；日本。

78. **Tarbomskiellus portentosus** (Lichtenstein) 大蟋蟀 (ASZI, 1986, 1:100; Beijing FC., 1980[ed.]:148-149; Chang, 1987:40; Chang & Hung, 1986:6; Chao, 1982:5; Chen, 1959:15-17; Chen et al., 1993:96; Chen et al., 1995:77; Heilongjiang Mudinggjiang FS., 1988[ed.]:174-175; Huang, 1990[ed.] 2:388-390; Hua., 1992:71; Liu, 1982[ed.]:174-175; Luo, 1991:83; Suzhou CS., 1985:247; Tsai, 1965:14; Wang, 1987[ed.]:346-347; Wang et Wu, 1994:371; Xiao, 1992:115; Yang, 1999:160; Yunn., 1987:70; Zhang, 1987[ed.] :23; Zheng, 1982:247)

=*Brachytrupes portentosus* Lichtenstein, 1796:

別 名：*臺灣大蟋蟀*，*花生大蟋蟀*，*華南大蟋蟀*，*大頭蟋蟀*，*大土狗*。

寄 主：鳳梨、柑橘、沙果、梨、桃、李、梅、柿、棗、木瓜、咖啡、桑、腰果、松、茶、杉幼苗、棉花、花生、豆類、馬鈴薯、白楊、橡膠等果樹類、蔬菜類、纖維作物類及大葉桉、檸檬桉等樹木的苗木。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江；馬來西亞、新加坡、印尼、印度、巴基斯坦。

79. **Teleogryllus mitratus** (Burmeister) 南方油葫蘆 (ASZI, 1986, 1:98; Hu et Hu, 1993:128; Tsai, 1965:15; Wang et Wu, 1994:371; Wu et Zheng, 1992:95; Yang, 1999:160)

Gryllus mitratus Burmeister, 1838:

=*Gryllus occipitalis* Serville,

別 名：*閻魔蟋蟀*，*北京油葫蘆*。

[Oriental garden criket]

寄 主：雜食，鳳梨、草莓、陸稻、粟、稗、甘蔗、亞麻、棉、茶、煙草、麥、甘薯、菜豆、豆薯、豌豆等豆類及綠肥作物等。

分 佈：臺灣、海南島、廣西、貴州、雲南、西藏、浙江、江蘇、上海、安徽、河南、山東、山西、河北、北京；日本、菲律賓、馬來西亞群島、爪哇、馬六甲、尼泊爾。

天 敵：*Gordius* sp. 線蟲(寄生若蟲及成蟲)

Trombidium sp. 紅蠕(寄生若蟲及成蟲)

80. **Truljalia hibinonis** (Matsumura) 梨蛄蛉 (ASZI, 1986, 1:101; Wang et Wu, 1994:371; Xia et Liu, 1992: 107)

別 名：*綠蛄蛉*，*梨蟋*。

寄 主：梨、蘋果、桃、杏、山楂、櫻桃、葡萄、棗、柿等，嚙食葉、芽、花、果實及種子；在華中及西南區則爲害行道樹。

分 佈：四川、江蘇、山東；日本。

81. **Xenogryllus marmoratus** (Haan) (Yang, 1999:163)
Phalangsis marmoratus Haan, 1842:
寄 主：荔枝(葉片，產卵於植株組織中)。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、印度、斯里蘭卡。

Gryllotalpidae 螻蛄科

82. **Gryllotalpa africana** Palisot et Beauvois 非洲螻蛄 (ASZI, 1986, 1:102; Beijing FC., 1980[ed.]:150-151; Chao, 1982:7; Chang & Hung, 1986:6; Chen et al., 1993:95; Heilongjiang Mudingjiang FS.,1988[ed.]:173-174; Huang, 1990[ed.] 2:386-388; Hun.,1992 :75; Luo, 1991:84; Liu, 1982[ed.]:165-167; Suzhou CS., 1985:243-245; Tsai, 1965:16; Wang, 1987[ed.]:344-345; Zhang et al., 1985, 2(3/4):269-280; Zhao et al., 1997:192; Zheng, 1982:243-245)
=*Grylotalpa ornata* Walker,
=*Grylotalpa fossor* Scudder,
=*Grylotalpa orycter* Scudder,
別 名：*螻蛄*、*小螻蛄*。
寄 主：柑橘類、榛、棗苗、桑、腰果、松、杉、蓽寧、油茶、楊、榆、油桐等苗木、小麥、水稻、玉米、高粱、棉花、麻、煙、甜菜、馬鈴薯蔬菜苗、甘藷、亞麻、甘藷、白菜、大豆、芥菜、花椰菜、蔥、韭、瓜類等農作物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、寧夏；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡、澳洲、新西蘭、夏威夷、非洲。

83. **Gryllotalpa formosana** Shiraki 臺灣螻蛄 (Beijing FC., 1980[ed.]:149; Suzhou CS., 1985:243-245; Zheng, 1982:243-245)
Gryllotalpha formosana Shiraki,
寄 主：苗圃、甘藷等。
分 佈：臺灣、福建。

84. **Gryllotalpa gryllotalpa** Linnaeus 普通螻蛄 (Beijing FC., 1980[ed.]:149; Suzhou CS., 1985:243; Zheng, 1982:243-245)
Gryllotalpha gryllotalpa Linnaeus,
寄 主：苗圃等。
分 佈：新疆；中亞、歐洲。

85. **Gryllotalpa orientalis** Burmeister 東方螻蛄 (Chen et al., 1995:78; Xiao, 1992:117)
寄 主：食性雜，松、落葉松、杉(幼苗)、多種農作物、煙草、蔬菜苗期主要地下害蟲。
分 佈：全國，臺灣、福建、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、遼寧發生較嚴重；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、澳洲、新西蘭、非洲。

86. **Gryllotalpa unispina** Saussure 華北螻蛄 (Beijing FC., 1980[ed.]:150-151; Chen et al., 1993:93; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:173-174; Huang, 1990[ed.] 2:386-388; Liu, 1982[ed.]:165-167; Suzhou CS., 1985:243-245; Wang, 1987[ed.]:344-345; Xiao, 1992:118; Zheng, 1982:243-245)
寄 主：食性雜，棗苗、桑苗、松、落葉松、杉(幼苗)、多種農作物、煙草、蔬菜苗期主要地下害蟲。
分 佈：我國北緯 32° 以北地區，江蘇(北部)、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林；西伯利亞、土耳其。

Tettigoniidae 螽蟖科

87. **Callimenellus ferrugineus** Brunner et Wattenwyl 可可黃褐樹螽 (Meng, 1960:14-15)
寄 主：可可(樹皮)、草扣仁、益智、白背桐、紅莖的麻稈野生的皮層。
分 佈：海南。

88. **Conocephalus maculatus** (LeGuillou) 斑翅草螽 (Liu et Jin, 1997:166; Zhang, 1987[ed.]:22)
Conocephalus maculatus (LeGuillou, 1841:)
寄 主：梨、柿、棉花、甘蔗、玉米、高粱、粟、水稻、大豆等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、貴州、雲南、四川、浙江、上海、湖北、河北、北京。

89. **Ducestia japonica** (Thunberg) 日本管樹螽 (Hun., 1992:77)
=Locusta quinqueneris
=Steirodon lanceolatum
=Phaneroptera neochlora
=Privata aliena
=Ducetia adspersa
寄 主：蘋果、梨、柑橘、葡萄、杏、桃、李、梅、枇杷、無花果、核桃、桑、蔬菜類等。
分 佈：全國均有分佈除西藏外；亞洲、南歐、非洲、大洋洲。

90. **Ducetia thymifolia** Fabricius 青螽蟖 (Chao, 1982:4)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

91. **Gampsocleis buergeri** de Haan 鈍頭螽 (Zhang, 1987[ed.]:22)
寄 主：柑橘、桃、玉米等。
分 佈：江西。

92. **Gampsocleis ussuriensis** Adelung 烏蘇里鳴螽 (ASZK, 1986, 1:54)
寄 主：桃及瓜類等。
分 佈：陝西、內蒙古、烏蘇里江流域；蘇聯。

93. **Holochlora japonica** Brunner von Wattenwa 日本綠樹螽 (Chang et al., 1960:194; Chao, 1982:4; Hun., 1992:78; Tan, 1980:258; Tasi, 1965:13; Xia et Liu, 1992:92; Zhang, 1987[ed.]:23)
別 名：*綠螽蟖*，*紡織娘*。
寄 主：柑橘、蘋果、梨、沙果、杏、桃、李、梅、櫻桃、枇杷、棗、柿、葡萄、無花果、核桃、咖啡、桑等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、湖北、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本、東南亞、夏威夷群島。
天 敵：*Anastatus* sp. 旋小蜂(卵)(寄生率達 32-51 %)

94. **Holochlora nawae** Matsumura et Shiraki 綠螽蟖 (Chao, 1982:4)
寄 主：柑橘、桑。
分 佈：福建。

95. **Isopsera brevissima** Shiraki 短額蟲蟴 (Tasi, 1965:14)
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣。

96. **Isopsera denticulata** Ebner 細齒平背蟲 (Liu et Jin, 1997:154; Xia et Liu, 1992:89)
Isopsera denticulata Ebner, 1939:
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；日本。

97. **Isopsera spinosa** Ingrisch 刺平背蟲 (Liu et Jin, 1997:155)
Isopsera spinosa Ingrisch, 1990:
寄 主：
分 佈：雲南、四川、湖北；印度北部。

98. **Mecopoda elongata** (Linnaeus) 桑褐蟲蟴 (Chang & Hung, 1986:6; Xia et Liu, 1992:93; Zhang, 1987[ed.]:23)
寄 主：桃、桑、玉米、南瓜、絲瓜、棉花等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、山東、山西；朝鮮、日本。

99. **Phaneroptera falcata** (Poda) 薄翅樹蟲 (Hua., 1992:77)
=*Locusta lilifolia*
寄 主：葡萄、櫟樹、油桐、大豆等。
分 佈：除西藏、青海外、各省(區)均有分佈；朝鮮、日本、蘇聯、伊朗、歐洲。

100. **Phaula gracilis** Matsumura et Shiraki 橘蟲 (Chao, 1982:4; Luo, 1991:84; Luo et Jin, 1997:71; 74; Luo et al., 1996:53; Tasi, 1965:14)
寄 主：柑橘、檬果、人心果、波蘿蜜、臘果等。
分 佈：臺灣、福建、海南。

101. **Sympaestria truncatolobata** Brunner von Wattenwa 平片蟲 (Tsai, 1965:16; Xia et Liu, 1992:91; Zheng, 1995:75)
別 名：*截葉并脛蟲*。
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽；日本、東南亞。

102. **Xiphidiopsis howardi** Tinkham 賀氏劍蟲 (Liu et Jin, 1997:160; Xia et Liu, 1992:99)
Xiphidiopsis howardi Tinkham, 1956:
寄 主：獼猴桃。
分 佈：福建、湖南、廣東、四川、浙江、河南、陝西。

PHASMIDA 竹節蟲目

Phasmatidae 竹節蟲科

103. **Entoria bobaiensis** Chen 博白長肛棒 (Xiao, 1992:135)
寄 主：馬尾松、紅椎。

分 佈：廣西。

THYSANOPTERA 纓翅目

Thripidae 薊馬科

104. **Anaphothrips (Neophysopus) sudanensis** Trybom 栗帶薊馬 (Han, 1997:542; Han et Cui, 1992:421; Wang, 1994:369, 1997:347; Wang et Mound, 1995:352)
Anaphothrips sudanensis Trybom, 1911:
別 名：*蘇丹呆薊馬*。
寄 主：柑橘類、印度棗、煙草、番茄、水稻、小麥、高粱、玉米、甘蔗、棉花、牽牛花、月桃、淡竹葉、蟋蟀草、狗尾草等。
分 佈：臺灣；印尼、印度、中東、非洲、澳洲、中美洲。

105. **Anisopilothrips venustulus** (Priesner) 腹瘤薊馬 (Lu, 1993:43; Wang, 1994:229)
別 名：*麗網紋薊馬*，*異毛針薊馬*。
寄 主：桑、鴨母樹、牛奶榕、榕樹、大葉楠、風藤、荖藤、山葡萄、鵝掌柴、臺灣山香圓、雞蛋花、月桃、菲島桐，國外尚爲害可可、綠福拉、線葉鐵莧、椰子等。
分 佈：臺灣；美國、西印度群島。

106. **Astrothrips chisinliaoensis** Chen 七星寮額突薊馬 (Lu, 1993:43; Wang, 1994:231)
寄 主：葡萄、桑、茄科、水金京、灌木叢等。
分 佈：臺灣。

107. **Ayyaria chaetophora** Karny 棉紋薊馬 (Lu, 1993:11; Wang, 1993:314)
Ayyaria chaetophora Karny, 1926:193.
=*Parafrankliniella fasciatus* Kurosawa, 1937:271.
別 名：*豇豆毛薊馬*。
寄 主：梨、棉、刀豆、大豆、毛豆、菜豆、四季豆、豆科等。
分 主：臺灣。

108. **Bathrips melanicornis** (Shumsher Singh) 黑角貝薊馬 (Lu, 1993:12; Wang, 1993:314; 1997:352)
Taeniothrips melanicornis Shumsher, 1945:166, 179.
Bathrips melanicornis, Bhatti, 1962:34.
別 名：*稀毛薊馬*。
寄 主：桑、茉莉、大麗花、馬纓丹、雞草、甘薯、牽牛花、綠豆等。
分 佈：臺灣；緬甸、印度。

109. **Caliothrips fasciatus** (Pergande) 豆帶巢針薊馬 (ASZI, 1986, 1:139; Chang, 1979:32; Chao, 1982:34; Luo et al., 1987:36)
Hercothrips fasciatus Pergande.
別 名：*豆薊馬*，*褐條網紋薊馬*。
寄 主：柑橘類、梨、桃、柿、葡萄等。
分 佈：福建、廣東；夏威夷、美國、墨西哥。

110. **Chaetanaphothrips orchidii** (Moulton) 藍黃薊馬 (Chang, 1979:32; Wang, 1994:372)
Euthrips orchidii Moulton, 1907:43, 52.

Euthrips marginemtorquens Karny, 1914:362.
別 名：*香蕉銹薊馬*。
寄 主：柑橘類，在南美洲爲害香蕉，溫帶地區溫室內爲害蘭花及觀賞植物。
分 佈：臺灣、華南；全世界。

111. **Chaetanaphothrips theiperdus** (Karny) 茶淡薊馬 (Lu, 1993:13; Wang, 1993:315)
Anaphothrips theiperdus Karny, 1921:69.
=*Chaetanaphothrips taiwanus* Sakimura, 1974:319.
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

112. **Craspedothrips minor** (Bagnall) 微毛角薊馬 (Wang, 1997:364)
Physothrips minor Bagnall, 1921:393, 394.
=*Physothrips thunbergiae* Karny, 1923:302-305.
=*Toxothrips vicnus* Bhatti, 1967:16, 17.
=*Tsengothrips plumosa* Chen, 1975:107-109.
寄 主：李、椰子、茄苳等。
分 佈：臺灣；菲律賓、印度、印尼。

113. **Danothrips trifasciatus** Sakimura 三帶淡薊馬 (Wang, 1997:368)
Danothrips trifasciatus Sakimura, 1975:125.
寄 主：桑、榕、樟、大葉楠、九重葛、薑、山薑、斑葉芋、相思樹、雀稗等。
分 佈：臺灣；夏威夷。

114. **Dendrothripoides innoxius** (Karny) 旋花微刺薊馬 (Wang, 1994:235; 1994:348)
Euthrips innoxius Karny, 1914:359-360.
=*Dendrothripoides ipomoeae* Bagnall, 1923:624, 625.
=*Tryphactothrins mediostignatus* Karny, 1925:34-37.
=*Tryphactotrhips mundus* Karny, 1926:190.
Dendrothripoides innoxius, Bhatti, 1978:10-12.
別 名：*旋花擬棍薊馬*。
寄 主：馬拉巴栗、空心菜、野牽牛，國外寄主尚有：萬苣、煙草、*Ipomoea* 屬多種植物、地黃、雙刺卡梨、稗、薯芋等。
分 佈：臺灣；印度、日本、關島、夏威夷、巴西。

115. **Dendrothrips minowai** Priesner 茶棍薊馬 (Wang, 1994:374, 456)
Dendrothips minowai Priesner, 1935:
別 名：*茶樹薊馬*。
寄 主：柿、茶等。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本。

116. **Docidothrips imitans** Priesner 仿薊馬 (Lu, 1993:14)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

117. **Elixothrisps brevisetis** (Bagnall) 短刺薊馬 (Lu, 1993:44; Wang, 1994:234; 1994:350)
Tryphactothrips brevisetis Bagnall, 1919:257.
=*Tryphactothrips rutherforde* (Bagnall), Moulton, 1936:263.
=*Asterothrips angulatus* Hood, 1925:50.
=*Dinurothrips guamensis* Moulton, 1942:7.

Elixothrips brevisetis, Stannard et Mitri, 1962:203.
別 名：*短鬃網紋薊馬*。
寄 主：桑、鵝母樹、牛奶榕、鵝掌柴、月桃、變葉木、石栗、曇華、機樹、牽牛花屬及雜草等。
分 佈：臺灣；菲律賓、太平洋諸島嶼。

118. **Frankliniella intonsa** (Trybom) 花薊馬 (ASZI, 1986, 1:127; Chiu et al., 1991:310-316; Fang, 1992:355; Fang et al., 1993:211-225; Han, 1992:246; Han et Cui, 1992:422; Hun., 1992:332; Li et al., 1992:4; Lu, 1993:15; Luo et al., 1987:35; Pingtung AC., 1986:85-86; Tang, 1971:184-185; Tsai, 1965:19; Wang, 1993:316; 1994:383; Wang et Mound, 1995:354; Wang et Zhang, 1997(3):58; Wang et al., 1987:429; Zhang, 1987[ed.] 1:117; Zhao et al., 1997:192)
=*Physapus ater* De Geer, 1744:6.
=*Thrips physapus*, Mulller, 1776:96.
=*Thrips vulgatissima*, Blanchard, 1850:217.
Thrips intonsa Trybom, 1895:182, 188.
=*Thrips pallida* Karny, 1907:49.
=*Physapus brevistylis* Karny, 1908:278.
=*Franklíniella breviceps* Bagnall, 1911:2, 10.
=*Franklinella formosae* Moulton, 1928:291, 324.
別 名：*臺灣花薊馬*。
寄 主：柑橘、蘋果、桃、梨、杜梨、楊、刺梅、荔枝、楊桃、蓮霧、龍眼、草莓、荷蘭草莓、檸果、香蕉、百香果、葡萄、檳榔、桑、油松(雄花)、甘蔗、水稻、小麥、落花生、豆類、玉米、棉、甘薯、蒜、蘆筍、菊花木(洋紫荊)、射干、芥藍、油菜、花椰菜、美人蕉、番椒、雞冠花、夜來香、茼蒿、菊花、波斯菊、西瓜、甜瓜、南瓜、絲瓜、胡瓜、苦瓜、仙克萊、大麗花、曼陀羅、康乃馨、天人菊、梔子花、非洲菊、煙草、紫雲英、蘭花、豆薯、唐菖蒲、大豆、毛豆、蝴蝶蘆、菜豆、四季豆、豌豆、蠶豆、石竹、萵苣、金針花、洋繡球、空心菜、茉莉花、蒿苣、夏日紅、紫薇、大花紫薇、扁蒲、百合、丁香、野牡丹、含羞草、薔薇、玫瑰、月季、非洲菫、紅皮(赤尾仔)、萬壽菊、雛鼠菊、紫藤、紫穗槐、榆葉梅、五色梅、木槿、雪柳、偃伏紅瑞木、榆樹、木棉、白刺花等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、俄羅斯(西伯利亞)、印度、土耳其、歐洲、格陵蘭(北極)。

119. **Helionothrips aino** (Ishida) 黑體網紋薊馬 (Han, 1992:245; Wang, 1993:311; 1994:239)
Heliothrips aino Ishida, 1931:34.
=*Helionothrips compressus* Hood, 1954:192.
=*Helionothrips antennatus* Kurosawa, 1968:15-46.
Helionothrips aino, Jacot-Guillarmod, 1971:260.
寄 主：香蕉、獼猴桃、櫻、木蘆子、馬兜鈴、早熟禾和三葉草之花部、杉木、甕菜、芋、雜草、樟、薤香、玉蘭等。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南；日本。

120. **Helionothrips brunneipennis** Bagnall 褐翅薊馬 (Lu, 1993:44)
寄 主：桃、櫻類、芋、煙草等。
分 佈：臺灣。

121. **Helionothrips communis** Wang 普通網紋薊馬 (Wang, 1994:243)
Helionothrips communis Wang, 1993:4-6.

寄 主：香蕉、芋、茄子、月桃、甕菜、杜鵑等。
分 佈：臺灣。

122. **Helionothrips compressus** Hood 凹胸網紋薊馬 (Lu, 1993:44; Wang, 1993:311)
Helionothrips compressus Hood, 1954:192.
寄 主：櫻類、佩羅特木等。
分 佈：臺灣。

123. **Helionothrips errans** (Williams) 桃網紋薊馬 (ASZI, 1986, 1:140; Lu, 1993:47; Wang, 1994:244)
Heliothrips errans Williams, 1916:243.
Helionothrips errans Priesner, 1936:208.
別 名：*游顎片針薊馬*，*黃頂網紋薊馬*。
寄 主：咖啡、桃、櫻屬、蘭類、蓖麻、翠菊、非洲楝、樟科、佩羅特木、變葉新木薑子等。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南；日本、蘇聯、肯亞、英國、美洲。

124. **Heliothrips haemorrhoidalis** (Bouché) 變葉木薊馬 (ASZI, 1986, 1:140; Chao, 1982:34; Hun., 1992:336; Lu, 1993:45; Luo et al., 1987:36; Luo et al., 1996:56; Wang, 1994:237, 352; Wang et Mound, 1995:348)
Thrips haemorrhoidalis Bouché, 1833:42.
=*Heliothrips adonidum* Haliday, 1836:443.
Heliothrips haemorrhoidalis; Burmeister, 1838:412.
=*Heliothrips semiaureus* Girault, 1928:1.
=*Dinurothrips rufiventris* Girault, 1929:1.
別 名：*溫室薊馬*，*溫室網紋薊馬*。
寄 主：柑橘、柚、桃、李、柿、檬果、番石榴、咖啡、腰果、葡萄、椰子、檳榔、桑、楊梅、櫻類、奎寧、茶、相思樹、青楓、槭樹、榆、山葡萄、樹杞、秋海棠、鵝脂樹、樟樹、變葉木、彩葉草、柳杉、大點香杉、仙克萊、大麗花、常綠榕、稜果榕、黃枝花、曼蕾果、大頭茶、巴豆、樟、棉花、雞草、山龍眼、孤挺花、鳶尾、圓柏、楓香、楠木、紅皮、臺灣山桂花、野桐、筆筒樹、石栗、青紫木、三腳蘭、山龍眼、山豬肉、煙草、蘭科、蓼科、蕨類、栓皮櫟、牡鵑花、柳、烏桕、山欖、烏皮九芎、棕櫚、臺灣山香圓、非洲楝、萬壽菊、雞蛋花、龍柏、木薑子、煙草、芋等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、雲南；越南、印度、斯里蘭卡、非洲、溫帶地區溫室內亦有發現、世界各地。

125. **Hydatothrips liquidambara** Chen 楓樹板背薊馬 (Lu, 1993:38; Wang, 1993:313; 1994:462)
Hydatothrips liquidambara Chen, 1977:145-147.
寄 主：小葉桑、楓香、雜草等。
分 佈：臺灣。

126. **Lefroyothrips lefroyi** (Bagnall) 褐帶薊馬 (Chang, 1979:32; Hun., 1992:334; Luo et al., 1987:35)
寄 主：枇杷、桃、柑橘類、荔枝、檬果、茶、山茶、偶爾發現于月季花、玫瑰、茶花等花卉的花內。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西；日本、印度。

127. **Megalurothrips distalis** (Karny) 端大薊馬 (Han, 1992:246; 1997:546; Luo et al., 1987:35; Shi et al., 1989-1990:80)
Taeniothrips distalis Karny, 1913:122.
Megalurothrips distalis (Karny, 1913:22)

寄 主：柑橘、柚、荔枝、龍眼、檬果、桃、梨、獼猴桃、水稻、大豆、小麥、玉米、苜蓿、紫雲英、苕子、豬屎豆、三葉豆、月季、油茶、何首烏、紫藤、洋紫荊、紫穗槐、刺槐、金合歡、木芙蓉、臘樹屬、槐藍屬、珍珠梅、垂枝胡枝子、短梗胡枝子、鹽膚木、苦楝、五色梅、苦刺等。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、ym上海、湖北、河南、北京；朝鮮、日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、印尼、大洋洲。

天 敵：*Orius similis* Zheng 南方小花蝽。

128. **Megalusothrips sjostadti** (Trybom) 絲帶蓟馬 (Luo et al., 1987:35)

寄 主：梨、柚、豆科。

分 佈：福建。

129. **Megalurothrips typicus** Bagnall 豆蓟馬 (Lee et Wen, 1982:179-187; Lu, 1993:20; Wang et al., 1987:)

Megalurothrips typicus Bagnall, 1915:590.
=*Taeniothrips varicornis* Moulton, 1928:292.
=*Taeniothrips centrispinosus* Priesner, 1938:474, 511, 525.
=*Taeniothrips setipennis*, Priesner, 1938:510, 511, 526.

別 名：*檬果花蓟馬*。

寄 主：檬果、酪梨、落花生、白菜、大豆、毛豆、朱槿、扶桑、虎爪豆、豆薯、紅豆、綠豆、菜豆、四季豆、絲瓜、瓜類等。

分 佈：臺灣；印度、印尼、關島。

130. **Megalurothrips usitatus** (Bagnall) 豆花蓟馬 (Chiu et al., 1991:310-316; Han, 1997:548; Wang et Mound, 1995:353; Wang et al., 1987:430)

Physothrips usitatus Bagnall, 1913:
=*Frankliniella nigricornis* Schmutz, 1913:
=*Frankliniella obscuricornis* Schmutz, 1913:
=*Physothrips usitatus* var. *cinctipennis* Bagnall, 1916:
=*Taeniothrips longistylus* Karny, 1922:

寄 主：柑橘、苦瓜、絲瓜、大豆、綠豆、紅豆、蠶豆、花生等。

分 佈：臺灣、香港、海南、湖北；日本、越南、菲律賓、印度、爪哇、澳洲。

131. **Microcephalothrips abdominalis** (Crawfrord) 菊花蓟馬 (Liu et al., 1994:554)

寄 主：*Areca catechu* 檳榔

分 佈：臺灣、中國大陸；日本、菲律賓、印度、印尼、澳洲、阿根廷、古巴、美國、加拿大。

132. **Mycterothrips auratus** Wang (Wang, 1999:232)

Mycterothrips auratus Wang, 1999:232-234.

寄 主：桑。

分 佈：臺灣。

133. **Mycterothrips glycines** (Okamoto) 豆雙毛蓟馬 (Han et Cui, 1992:425; Lu, 1993:21; Wang, 1993:319)

Euthrips glycines Okamoto, 1911:221.

別 名：*豆喙蓟馬*。

寄 主：桑、馬尾松、大豆、豌豆、菜豆、青瓜、白刺花等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本。

134. **Mycterothrips ravidus** Wang (Wang, 1999:236)
Mycterothrips ravidus Wang, 1999:236.
寄 主：百香果、桑。
分 佈：臺灣。

135. **Perissothrips parviceps** Hood 微長胸薊馬 (Han et Cui, 1992:422)
Perissothrips parviceps Hood, 1919:
寄 主：海南懸鉤子、華南毛柃、高腳羅傘、大葉柳等。
分 佈：廣東、海南、雲南；印度。

136. **Phibalothrips peringueyi** (Faure) 腰果網紋薊馬 (Zhang, 1980:78)
Phibalothrips peringueyi (Faure, 1925:)
寄 主：腰果(嫩葉)。
分 佈：海南；印度、南非。

137. **Pseudodendrothrips bhatti** Kudo 巴氏僞棍薊馬 (Zhang &Tong, 1988:276)
Pseudodendrothrips bhatti Kudo, 1984:
寄 主：蕉(*Musa nana* Lour.)心葉內、榔榆(*Ulmus parvifolia* Jacq.)；日本記錄爲害桑樹
分 佈：廣東、浙江；日本。

138. **Pseudodendrothrips fumosus** Chen 觀音山薊馬 (Lu, 1993:22; Wang, 1993:313; 1994:457)
Pseudodendrothips fumosus Chen, 1980:
別 名：*灰僞棍薊馬*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、福建(武夷山)。

139. **Pseudodendrothrips lateralis** Wang 側僞棍薊馬 (Wang, 1993:253; 1994:458)
Pseudodendrothrips lateralis Wang, 1993:253-254.
寄 主：桑、相思樹。
分 佈：臺灣。

140. **Pseudodendrothrips mori** (Niwa) 桑薊馬 (Hun,, 1992:333; Liu, 1995:39-40; Lu, 1993:22; NZWDI, 1981:1111; Suzhou CS., 1985:216-218; Wang, 1993:313; 1994:396, 459; Zhang, 1987[ed.] 1:117; Zheng, 1982:216-218)
Belothrips mori Niwa, 1908:180.
Pseudodendrothrips mori, Umeya et Omi, 1930:157.
寄 主：桑、蘆筍等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、遼寧；朝鮮、日本、美國。

141. **Rhipiphorothrips cruentatus** Hood 腹鈎薊馬 (Chang, 1987:40; Chiu, 1984:365-378; Chiu et Huang, 1983:76; Lee et Wen, 1982:179-187; Lu, 1993:48; Luo et al., 1996:86; Pingtung AC., 1986:13, 20-21; Wang 1994:253; 1994:357; Wen, 1989:100-103)
Rhipiphorothrips cruentatus Hood, 1919:94.
=*Rhipiphorothrips karna* Ramakrishna, 1928:245, 252.
別 名：*淡紅斷紋薊馬*
寄 主：釋迦、楊桃、橄欖、柚、檸檬、葡萄柚、椪柑、甜橙、柿、蓮霧、肖氏蒲

桃、龍眼、橄果、荔枝、番石榴、梨、杏、葡萄、腰果、茄苳、烏桕、千葉紅、臭牡丹、雜草、枸杞、番茄、爬牆虎、玫瑰、欖仁、大葉桉、蘆花、雜草等。

國外寄主尚有蒲桃、牛角瓜屬、腰果、石榴、可可椰子等。

分 佈：臺灣、海南；印度、巴基斯坦、阿富汗、斯里蘭卡。

142. **Rhipiphorothrips pulchellus** Morgan 茄冬薊馬 (Wang, 1994:254)

Rhipiphorothrips pulchellus Morgan, 1913:17.

=*Retithrips bicolor* Bagnall, 1913:290.

別 名：*麗色皺紋薊馬*。

寄 主：茶、茄苳；國外寄主尚有葡萄、孟加拉榕、大果枯里珍、雞屎樹。

分 佈：臺灣；菲律賓、印尼、斯里蘭卡。

143. **Salpingothrips aimotofus** Kuto 長吻薊馬 (Lu, 1993:22; Wang, 1993:320)

Salpingothrips aimotofus Kuto, 1972:230-233.

寄 主：桑等。

分 佈：臺灣；日本。

144. **Scirtothrips dorsalis** Hood 小黃薊馬 (ASZI, 1986, 1:123; Chen et Chang, 1995:457; Chiu et al., 1991:310-316; Han, 1997:537; Han et Cui, 1992:421; Hua et Su, 1993:351; Lee et Wen, 1982:179-187; Lu, 1993:22; Luo et Li, 1998:51; Luo et al., 1987:36; Luo et al., 1996:57; Niu, 1997:28-29; Pingtung AC., 1986:13; Wang, 1993:320; 1994:398; Wang et Mound, 1995:351; Wen et Lee, 1982:288; 1984:85; Xiao,1992:355; Xie, 1987, 14(1):7-8, 27; Zhang, 1985[ed.]:179-181)

Scirtothrips dorsalis Hood, 1919:90.

=*Heliothrips minutissimus* Bagnall, 1919:260.

=*Anaphothrips andreae* Karny, 1925:24, 25.

=*Anaphothrips oligochaetus*, Ramakrishna, 1925:871.

=*Neophysopus fragariae* Girault, 1927:1.

別 名：*黃薊馬*，*茶黃薊馬*。

寄 主：葡萄、草莓、釋迦、日本板栗、檸檬、文旦、葡萄柚、椪柑、柳丁、柑橘類、柿、蓮霧、橄果、龍眼、荔枝、無花果、荷蘭草莓、銀杏、胡桃、百香果、酪梨、高沙梅、桃、李、櫻類、棗、印度棗、香蕉、咖啡、想思樹、槭樹、野莧菜、山葡萄、蘆筍、射干、黃蝴蝶、重瓣山茶、千葉紅、茶、山茶、花生、番椒、烏敏梅、菊花、匍莖葡萄、大麗花、曼陀羅、蚊母樹、大葉黃楊、油茶、非洲菊、大豆、毛豆、棉、雜草、朱槿、扶桑、假黃楊、細葉冬青、甘薯、牽牛花、茉莉花、臺灣樸樹、山萵苣、馬纓丹、枸杞、番茄、山豬肉、蘭花、刺格、綠豆、四季豆、臺灣馬醉木、海桐、羅漢松、虎杖草、蕎麥、馬齒莧、青剛櫟、杜鵑花、篦麻、玫瑰、櫟樹、茄子、欖仁、珊瑚樹、綠豆、蟛蜞菊、白胡椒、玉米等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、安徽、河南；日本、馬來西亞、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印尼、新幾內亞、澳洲(昆士蘭)、非洲。

145. **Selenothrips rubrocinctus** (Giard) 赤帶薊馬 (ASZI, 1986, 1:141; Chang, 1979:32; Chen, 1981:53; Han, 1992:245; 1997:536; Hun., 1992:336; Lu, 1993:49; Luo, 1991:86; Luo et Jin, 1995:86; Luo et Li, 1998:52, 82; Luo et al., 1987:36-37; Luo et al., 1996:57; Ma et Huang, 1988:217-218; Wang, 1994:255; 1994:359; Wang et Mound, 1995:348; Xiao, 1992:356)

Physopus rubrocinctus Giard, 1901:264.

=*Selenothrips mendax* Schmutz, 1913:994.

=*Borachyurothrips indicus* Bagnall, 1926:98.

別 名：*紅帶網紋薊馬*，*紅帶滑胸針薊馬*，*荔枝網紋薊馬*。

寄 主：柑橘類、橄欖(新梢嫩葉背面)、檬果、荔枝、龍眼、桃、柿、板栗、番石榴、咖啡、可可、葡萄、柿、板栗、蒲桃、蓮霧、稜角蒲桃(扁櫻桃)、酸棗、酪梨、腰果、櫻類、山茶、油茶、橡膠、油桐、梧桐、石栗、泡桐、金合歡、臺灣赤楊、臺灣相思、榆、栓皮櫟、山葡萄、臍脂樹、變葉木、破布子、杜英、倒蛋葉饅頭果、饅頭果、楓香、栓皮櫟、牡鵑花、烏桕、水柯仔、烏皮九芎、臺灣山香圓、山葡萄、臍脂樹、臺灣鵝耳、側柏、唐杜鵑、圓葉血桐、樟木、杜英、水金京、酸棗、二球懸鈴木、漆樹、木荷等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、長江以南各省(區)；菲律賓、東南亞一帶、印度、斯里蘭卡、太平洋群島、澳洲、非洲、美洲、西印度群島、中南美洲各國。

146. **Stenchaetothrips biformis** (Bagnall) 稻薊馬 (Wang, 1993(1):35)

Thrips oryzae Williams

寄 主：柑橘(花瓣)、水稻。

分 佈：湖南。

147. **Thrips albipes** Bagnall 白腳薊馬 (Chao, 1982:35)

寄 主：枇杷、茶、薔薇、臭茉莉、菊等。

分 佈：福建。

148. **Thrips andrewsi** (Bagnall) 黑角薊馬 (Han et Cui, 1992:428; Hun., 1992:334; Luo et al., 1987:35; Yunn., 1987:503)

Thrips andrewsi (Bagnall, 1921:)

寄 主：檬果、柑橘類、咖啡、茶、泡桐、柳、羊耳朵樹、菊科等。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；日本、印度。

149. **Thrips carthami** Shumsher 紅藍菊蘇馬 (Han, 1997:553)

Thrips carthami Shumsher, 1946:

寄 主：枇杷、紅藍菊屬(菊科)、玫瑰等。

分 佈：四川；印度、不丹、克什米爾。

150. **Thrips coloratus** Schmutz 花色薊馬 (ASZI, 1986, 1:135; Han, 1992:247; 1997:553; Han et Cui, 1992:425; Hun., 1992:335; Luo et al., 1987:35; Wang 1993:323; Wang, 1994:403; Yunn., 1987:503; Zhang, 1987[ed.] 1:118)

Thrips coloratus Schmutz, 1913:1002, 1013.

=*Thrips japonicus* Bagnall, 1914:288.

=*Thrips florum* var. *colorata*, Karny, 1924:13, 14.

=*Thrips melanurus* Bagnall, 1926:111.

別 名：*日本薊馬*、*色薊馬*。

寄 主：枇杷、桃、梨、柑橘、柚、黃皮、荔枝、龍眼、檬果、番石榴、咖啡、獼猴桃、茶、山茶、水稻、竹、苦瓜、黃瓜、桂花、油茶、油桐、野桐、珍珠梅、夜來香、苦楝、鈎藤、大葉桃花心、西山蜀柳、木荷、金合歡、細葉桉及十字花科等植物的花內。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南；朝鮮、日本、菲律賓、文萊、寮國、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、爪哇、新幾內亞、澳洲。

151 **Thrips flavus** Schrank 淡色薊馬 (Chang, 1979:32; Han, 1992:247; Han et Cui, 1992:425; Hu & Li,

1984:120-121; Hun., 1992:247, 335; Luo et al., 1987:35; Wang, 1993:323; 1994:404; Wang et al., 1987:430; Wen et Lee, 1982:89-90; Yunn., 1987: 503; Zhang, 1987[ed.] 1:118)

Thrips flavus Schrank, 1776:31.
=*Thrips uelanopa* Schrank, 1781:298, 299.
=*Thrips urticae*, de Villers, 1789:566, 567.
=*Thrips ochraceus* Ruricola [Curtis], 1841:288.
=*Thrips lavidus* Bagnall, 1916:399.
=*Taeniothrips flavidulus* (Bagnall), Ramakrishnan, 1928:256.
=*Taeniothrips clarus* Moulton, 1928:287-289.
=*Taeniothrips flavidus* (Bagnall), Steinweden, 1933:282.
=*Taeniothrips sulfuratus* Priesner, 1935:358.
=*Thrips clarus* Moulton, 1935:294, 295.
=*Taeniothrips luteus* Oettingen, 1935:183.
=*Taeniothrips saussureae*, Ishida, 1936:70
=*Thrips rhopalantennalis* Schumsher Singh, 1946:166, 168, 181.

別 名：*亮薊馬，黃薊馬，橙黃薊馬，瓜亮薊馬，八節黃薊馬，黃帶薊馬。*

寄 主：蘋果、梨、野牡梨、桃、綠梅、咖啡、檬果、石榴、柑橘類、柚、黃皮、荔枝、龍眼、枇杷、山楂、棗、柚、黃皮、荔枝、柿、獼猴桃、油橄欖、香蕉、咖啡、桑、馬尾松、油茶、野葡萄、四季花、茉莉、玫瑰、薔薇、菊花、五爪金龍、豆科、油菜等十字花科蔬菜、芝麻、苜蓿、紫雲英、蠶豆、豌豆、扁豆、茄子、茄、番茄、西瓜、苦瓜、胡瓜、瓜類、茄、蔥、小麥、青稞、玉蘭花、野茉莉、日照花、夜來香、珍珠梅、白薔薇、婆婆針、咸豐草、重瓣山茶、茶、蒿苣、雞角刺、臭牡丹、棉、甘薯、馬纓丹、百合、含羞草、芒、水仙、小百合、蓼科、光葉石柄、木蘭、瓊木藍、中國槐、刺槐、三葉豆、豬屎豆、胡枝子、偃伏紅瑞木、丁香、文冠果、紫荊、木蓮、厚朴、苦楝、檜柏、杜鵑、玉蘭、苦刺、白刺花、槐藍屬之一種、金合歡、羊耳朵樹、迎春花、海桐、柳、栗、柏、珍珠梅、白鼠擺、紅豆、紫花地丁、玉米等植物花內。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、東南亞、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、歐洲、美洲。

152. **Thrips fusca** Moulton 褐薊馬 (ASZI, 1986, 1:137; Chang, 1979:32; Luo et al., 1987:35; Luo et al., 1996:57; Zhang, 1980:84; Zhang, 1987[ed.] 1:119)

寄 主：荔枝、龍眼花、檬果、柑橘、鳳梨、甘蔗、白蘭花、女貞等。

分 佈：福建、江西、廣東、海南；菲律賓。

153. **Thrips hawaiiensis** (Morgan) 黃胸薊馬 (ASZI, 1986, 1:136; Chen, 1981:53; Chen et Lo, 1987:317-326; Chiu et al., 1991:310-316; Han, 1992:248; 1997:554; Han et Cui, 1992:429; Ho, 1987:17-23; Hun., 1992:336; Lee et Wen, 1982:179-187; Lu, 1993:31; Luo et al., 1987:35; Pingtung AC., 1986:13; Su et al., 1981:283; Tsai, 1995:48-49; Wang, 1993:323; 1994: 405; Wang et Mound, 1995:350; Wang et al., 1987:431; Yunn., 1987:503; Zhang, 1979:32; Zhang, 1987[ed.] 1:119)

Euthrips hawaiiensis Morgan, 1913:3.
=*Thrisp longalata* Schmutz, 1913:1002, 1009.
=*Thrips nigriflava* Schmutz, 1913:1002, 1012.
=*Thrips sulphurea* Schmutz, 1913:1002, 1012.
=*Thrips albipes* Bagnall, 1914:25.
=*Physothrips pallipes* Bagnall, 1916:400.
=*Thrips versicolor* Bagnall, 1926:108.
=*Taeniothrips eriobotryae* Moulton, 1928:302, 326.
=*Taeniothrips rhodomyrti* Priesner, 1938:492, 520, 524, 526.
=*Thrips leucaenae* Moulton, 1942:9.

別 名：*花薊馬，香蕉花薊馬。*

[Flower thrips, Banana flower thrips]

寄 主：檬果、酸杷、楊桃、檸檬、柑橘類、柚、黃皮、柿(嫩葉)、桃、梨、枇杷、梅、草莓、桑、無花果、荔枝、龍眼、百香果、番石榴、蓮霧、蒲桃、桃金孃、日本樫樹、葡萄、獼猴桃、咖啡、香蕉、珍珠梅、車輪梅、金合歡、羊蹄甲之一種、厚朴、野桐、石楠、白玉蘭、油茶、油桐、珊瑚、木蓮、櫟樹、梔子花、牽牛花、瓜類、十字花科蔬菜、豆科、豬屎豆、芸香科、茄科、菊科、黃秋葵、刺槐、中國槐、酸巴、相思樹、紫花霍香薊、龍牙草、軟枝黃蟬、蔥、金魚草、臺灣欒木、牛蒡、艾、麵包樹、菊花木、苧麻、油菜、花椰菜、黃蝴蝶、金盞花、杜紅花(山檳榔)、重瓣山茶、茶、萬苣、菊科、雞角刺、西瓜、臭牡丹、大波斯菊、甜瓜、胡瓜、南瓜、大麗花、野山菜、鵲豆(肉豆)、稗、無節雀稗斛、年飛蓬、大葉黃楊、黃枝花、夜來香、黃槐類、唐昌蒲、大豆、毛豆、洋紫荊、大頭茶、棉、塊莖日葵、月橘、山龍眼、山芙蓉、朱槿、扶桑、木槿、孤挺花、洋繡球、細葉冬青、鳳仙花、甘薯、牽牛花、空心菜、素馨、茉莉花、萬苣、扁蒲、白花紫薇(夏日紅)、大花紫薇、鳳花、馬纓丹、都胡桂子、銀合歡、日本女貞、心葉百合、百合、絲瓜、番茄、野桐、野牡丹、玉蘭花、紫茉莉、芒、苦瓜、水仙、夾竹桃、煙草、紅萼月見、蘭花、芍藥、罌粟、梧桐、款冬、防風、皇帝豆、四季豆、臺灣檳榔、大井毛蓮菜、豌豆、海桐、緬梔、夜來香、蕎麥、睫穗藜、蒜香藤、蘿蔔、大劍木、牡鵑花、臺灣海薔薇、玫瑰、酸模、甘蔗、蒴瞿、虎尾蘭、松蟲草、馬鈴薯、菠菜、紅皮、白草藤、藤類、紅三葉草、白翅搖、蠶豆、稜嘴豇豆、反曲玉蘭、玉米、百日花等各種植物的花內。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新几內亞、澳洲、新西蘭、夏威夷、歐洲、牙買加、墨西哥。

154. **Thrips japonicus** Bagnall 枇杷薊馬 (Chao, 1982:35; Chang, 1979:32)

別 名：*日本薊馬*。

寄 主：枇杷、柑橘類、茶、苦瓜、紫雲英等。

分 佈：福建、廣東。

155. **Thrips palmi** Karny 棕櫚黃薊馬 (Chen et Chang, 1992:355; Chu et Wang, 1990:79-87; Han, 1992:249; 1997:555; Han et Cui, 1992:430; Huang, 1986:420; Huang et Su, 1997:281-287; Lu, 1993:38; Mo et al., 1985, 6:46-47; Su et al., 1985:101-118; Wang, 1993:324; 1994:408; Wang et Chu, 1986:133-143; 407-411; 1987:165; 1990:125-132; Wang et Mound, 1995:351; Wang et al., 1987:431; 1989:251-261; Wu et Liang, 1996, 18(3):112-115; Wu et al., 1995, 17(2):51-54;Wu et al., 1996, 23(1):13-16; Yan, 1987:291-321; Yunn., 1987:504; Zhang et al., 1985, 23(3):110-111; Zhu et al., 1988, 1:44-46)

Thrips palmi Karny, 1925:10.

=*Thrips nilgiriensis* Ramakrishna, 1928:245, 262.

=*Thrips leucadophilz* Priesner, 1936:91-92.

=*Thrips gossypicola* (Priesner), Ramakrishna & Margabandhu, 1939:153.

=*Thrips gracilis* Ananthakrishnan & Jagadish, 1968:361.

別 名：*南黃薊馬*，*棕櫚薊馬*。

寄 主：梅、桃、李、梨、蘋果、咖啡、椪柑、百香果、葡萄、印度棗、火巴果(紅龍)、桑、黃秋葵、蔥、芹菜、牛蒡、冬瓜、白菜、茶、番椒、萬苣、菊花、節瓜、西瓜、甜瓜、胡瓜、南瓜、大麗花、胡蘿蔔、康乃馨、石竹、非洲菊、大豆、毛豆、紅豆、四季豆、豌豆、扁豆、豆科藤本植物、韭菜、棉、向日

葵、薔薇、朱槿、扶桑、甘薯、牽牛花、蒿草、扁蒲、絲瓜、枸杞、番茄、西瓜、苦瓜、煙草、九層塔、酢醬草、紫蘇、蕎麥、蘿蔔、芝麻、茄子、馬鈴薯、菠菜、白甜搖、蠶豆、綠豆、白胡椒、玉米、節骨木、苦刺、白刺花、木棉、洋槐、小舌菊屬之一種、槐藍屬之一種、柏、青杵槭、刺槐等。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、長江以南諸省(區)；朝鮮、日本、菲律賓、文萊、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、巴基斯坦、非洲、歐洲部份地區、美國、南美洲、夏威夷、關島、澳洲。

156. **Thrips tabaci** Lindeman 煙薊馬 (ASZI, 1986, 1:137; Han, 1997:558; Han et Cui, 1992:430; Han et Xu, 1982:188; Hun., 1992:336; Liu et al., 1994:554; Lu et Lee, 1985:223-227; 1987:118-124; Wang, 1994:411; Wang et Mound, 1995:351; Wang et al., 1987:432; Yum., 1987:504; Zhao et al., 1996(3):43;)

=*Thrips solanaceorum* (Widgalm), Portschinsky, 1883:44-53.
Thrips tabaci Lindeman, 1888:61, 72.
=*Thrips allii* Gillette, Simine & Lowe, 1894:680-683.
=*Thrips bicolor* Karny, 1907:21, 48.
=*Limothrips tritici* (Fitch), Webster, 1894:206.
=*Thrips communis* Uzel, 1895:37, 55, 176.
=*Thrips flava* var. *obsoleta* Uzel, 1895:187, 188.
=*Thrips solanaceorum* (Widgalm), Schtscherbakow, 1907:914.
=*Thrips bremneril* Moulton, 1911:14, 23.
=*Thrips adamsoni* Bagnall, 1923:58.
=*Thrips debilis* Bagnall, 1923:60.
=*Thrips obsoletus* Uzel, John, 1925:21.
=*Thrips frankeniae* Bagnall, 1926:654.
=*Thrips dorsalis* Bagnall, 1927:576.
=*Thrips hololeucus* Bagnall, Moulton, 1928:327.
=*Thrips dianthi* Moulton, 1936:104.
=*Thrips evestigatus* Oettingen, 1944:41.
=*Ramaswamiahiella kallarensis* Ananthakrishnan, 1960:564.

別 名：*煙薊馬*，*薊馬*。

寄 主：荔枝、荔枝、煙草、棉花、大豆、馬鈴薯、油茶、蒜、蔥、韭類石蒜科植物、蔬菜、瓜類、檳榔、果樹等各種植物。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、新疆、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、東南亞、印度、世界各大洲。

天 敵：*Aeolothrips fasciatus* (Linnaeus) 橫紋薊馬
Scolothirps takahashii Priesner 塔六點蓟馬
Orius minutus (Linnaeus) 小花蝽
Nabis sinoferus Hsiao 華野姬猎蝽

157. **Thrips victriensis** Moulton 威島薊馬 (Luo et al., 1987:35; Luo et al., 1996:57; Zhang, 1980:84)

Thrips victriensis Moulton, 1936:

寄 主：檬果，千日紅等。

分 佈：福建、廣東、海南；菲律賓。

Phlaeothripidae 管薊馬科

158. **Apterygothrips** sp. (Liu et al., 1994:554)

棲 息：檳榔葉。

分 佈：臺灣。

159. **Elaphrothrips falcatus** Karny 菠蘿蜜管薊馬 (Lu, 1993:65)
寄 主：菠蘿蜜、番石榴、蘋婆等。
分 佈：臺灣。

160. **Elaphrothrips spiniceps** Bagnall 刺額管薊馬 (Lu, 1993:65)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

161. **Gynaikothrips uzeli** Zimmerman 榕管薊馬 (ASZI, 1986, 1:143; Shi, 1998, 21(3):36)
別 名：*榕母管薊馬*。
寄 主：無花果、榕樹、橄果。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南；日本、印尼、印度、埃及、阿爾及利亞、西班牙、北美、墨西哥。

162. **Haplothrips aculeatus** Fabricius 稻管薊馬 (Han, 1992:248; Wang, 1993(1):35)
寄 主：柑橘(花瓣)、梨、水稻、麥類、玉米、高粱、粟、稷、甘蔗、看麥娘、稗、狗尾草、鴨茅、鵝冠草、白茅、狼尾草、菅、荊三稜、螢蘭、咸草、茭白、大豆、蠶豆、豌豆、紫雲英、煙草、小過路黃、夏枯草、毛茛、紫穗槐、糠槐、羊蹄甲等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、河北；朝鮮、日本、歐洲、北美。

163. **Haplothrips** (s. str.) **chinensis** Priesner 中華管薊馬 (Han, 1992:248; 1997:655; Han et Cui, 1992:431; Luo et al., 1998?:36;Tuan et Li, 1995:211; Wang et al., 1987:432; Zhang, 1984:17; Zhang, 1984:87-89; Yunn., 1987:505)
Haplothrips (s. str.) *chinensis* Priesner, 1933.
寄 主：蘋果、桃、李、梨、綠梅、刺梅、珍珠梅、枇杷、橄果、柑橘類、月橘、龍眼、荔枝、番石榴、板栗、桑、橄欖、果樹、茶、油茶、金合歡、柏、豆類、豬屎豆、絲瓜、蔥、十字花科蔬菜、馬鈴薯、茉莉、山茶、百合、菊、三裂繡線菊、蜀葵、棉、甘藷、水仙、水芹、何首烏、葛、霍香薊、紫雲英、薊、雀幣、酢醬草、毛葉丁香、一枝黃花、紫花柴胡、薔薇、木蓮、野桐、金櫻子、苦楝、鹽膚木、及多種野生植物的花內。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、河北、新疆、寧夏、吉林；朝鮮、日本、東南亞。

164. **Haplothrips** (s. str.) **gowdeyi** (Franklin) 菊管薊馬 (Hun., 1992:338; Lu, 1993:58)
別 名：*瘤狀毛薊馬*。
寄 主：鬼懸鉤子、懸鉤子、咖啡花、菊花、紅花山茶、南風草、蔥、芹菜、馬蘭、傷食草、婆婆針、咸豐草、雞冠花、茼蒿、菊科、雞角刺、臭牡丹、莎草丹、葉下紅、棉、剪刀股、馬纓丹、咖啡、野牡丹、芒、水芹、銀桂、茅草、玉米等多種禾本科植物的心葉或花內，偶爾亦于莎草科植物的花內發現。
分 佈：臺灣、福建、浙江、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川；日本、印尼(爪哇)、印度。

165. **Haplothrips subtilissmue** (Haliday) 柑橘皮薊馬 (Luo et al., 1987:36)
寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

166. **Haplothrips vernoniae** Priesner 春管蓟馬 (Lu, 1993:59)
寄 主：柿、杜紅花、雞冠花、胡瓜、棉、甘薯、白花紫薇、野牡丹、臺灣何首烏、臺灣葛藤、薑荷等。
分 佈：臺灣。

167. **Hoplandrothrips obescametae** Chen 扁管蓟馬 (Lu, 1993:69)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

168. **Haplothrips subtilissimus** (Haliday) 柑橘皮蓟馬 (Chao, 1982:34)
寄 主：柑橘、榕樹、紫苑花、月季、竊衣屬(*Torilis*)等。
分 佈：福建。

169. **Karnyothrips melaleucus** (Bagnall) 黑亮管蓟馬 (Lu, 1993:60)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

170. **Leeuwenia ramakrishnae** Ananthakrishnan 長尾蓟馬 (Luo et al., 1996:86)
寄 主：蓮霧。
分 佈：海南。

171. **Liothrips piperinus** Priesner 長刺滑蓟馬 (Hun., 1992:338; Luo et al., 1987:36)
寄 主：柑橘(葉)、榕樹、細葉桉等。常發現與榕管蓟馬共生于榕樹葉瘿內。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南；日本。

172. **Liothrips terminallae** Moulton 端管蓟馬 (Lu, 1993:61)
寄 主：枇杷、欖仁。
分 佈：臺灣。

173. **Manothrips fortis** Priesner 強寬蓟馬 (Luo et al., 1987:36)
寄 主：柿。
分 佈：福建；印尼。

174. **Neoheegeria macarangai** Moulton 褐長吻蓟馬 (Zhang, 1984:18)
Neoheegeria macarangai Moulton, 1928.
寄 主：腰果、芒草心葉。
分 佈：臺灣、海南。

175. **Nesothrips brevicollis** (Bagnall) 短角管蓟馬 (Lu, 1993:66)
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

176. **Rhaebothrips lativentris** Karny 大腹管蓟馬 (Lu, 1993:66)
寄 主：小葉桑、葡萄、琉球松、相思樹、山葡萄、茶、雜草、枯枝、大葉楠、樹

薯、臺灣雷藤、雞屎藤、葛藤、山麻黃、紅子仔等。
分 佈：臺灣。

177. **Rhynchothrips** sp. 腰果皮薊馬 (Luo, 1991:86)
寄 主：腰果。
分 佈：海南。

178. **Scotothrips claripennis** (Moulton) 明翅管薊馬 (Lu, 1993:67)
寄 主：文旦、櫻、豬腳楠。
分 佈：臺灣。

179. **Scotothrips virgulae** Chen 細條管薊馬 (Lu, 1993:67)
寄 主：桑、山麻黃。
分 佈：臺灣。

180. **Smerinthothrips vitivorus** Priesner 葡萄管薊馬 (Lu, 1993:64)
別 名：*三葉葡萄薊馬*。
寄 主：三葉葡萄、葡萄、三腳虌。
分 佈：臺灣。

181. **Strepterothrips orientalis** Ananthakrishnan 東洋管薊馬 (Lu, 1993:64)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

182. **Xylaplothrips palmerae** Chen 椰管薊馬 (Lu, 1993:64)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

HETEROPTERA 半翅目

Plataspidae 龜蝽科(平腹蝽科)

183. **Coptosoma munda** Bergroth 孟達圓龜蝽 (Luo, 1991:85)
寄 主：腰果。
分 佈：海南。

184. **Coptosoma nigricolor** Montandon 黎黑圓龜蝽 (Luo, 1991:85)
寄 主：腰果。
分 佈：海南。

185. **Coptosoma siamicum** Walker 豆平腹蝽 (Tsai, 1965:27)
別 名：*豆盾椿象*。
寄 主：無花果、桑、榕樹、扶桑花、芙蓉、臺灣天仙果、牛乳榕、菜豆、大紅心、烏桕、豆醬、豌豆、豆類等。
分 佈：臺灣、華南；越南、泰國、緬甸、印度。

186. **Coptosoma variegata** Herich-Schaeffer 多變圓龜蝽 (Luo, 1991:85; 1996:55; Zhang et Lin, 1992:107)
Coptosoma variegata Herich-Schaeffer, 1844:
寄 主：腰果、檬果。
分 佈：福建、江西、海南、貴州、雲南、四川。

187. **Megacopta cribraria** (Fabricius) 篩豆平腹蝽 (Hsiao et al., :22; Zhang, :34; Zhang et Lin, 1992: 108)
Megacopta cribraria (Fabricius, 1798:)
寄 主：桑、大豆、葛藤、刺槐、菜豆、綠豆、扁豆、美麗胡枝子、昆明雞血藤等，以大豆、葛藤等，美麗胡枝子上較多。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西、河北、山西；朝鮮、日本、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

188. **Megacopta distanti** (Montandon) 狄豆龜蝽 (Lin et Zhang, 1992:183)
寄 主：大豆、合歡、核桃等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、河北；印度。

Scutelleridae 盾蝽科

189. **Cantao ocellatus** (Thunberg) 角盾蝽 (Yunn.,1987:117; Zhang, :47; Zhang et Lin, 1992:108)
Cantao ocellatus (Thunberg, 1784:)
寄 主：梨、核桃、桃、李、番石榴、油桐、油茶、血桐、枸樹、杜鵑等。
分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏；琉球、菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸、印度、印尼、大洋洲北部。

190. **Chrysocoris grandis** (Thunberg) 麗盾蝽 (ASZI, 1986, 1:367; Hsiao et al., 1977:57; Hun., 1992:219; Luo et Jin, 1995:85; Tsai, 1965:26; Yunn., 1987:115; Zhang, 1985:41; Zhang, 1987[ed.] 1:81; Zhang et Lin, 1992:108)
Chrysocoris grandis (Thunberg, 1783:)
別 名：*油桐大椿象*。
寄 主：梨、桃、柑橘、板栗、枇杷、番石榴、酪梨、雲南松、思茅松、茶、八角、油桐、油茶、苦楝、椿等果樹和經濟林木。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、河南；日本、越南、寮國、印尼、泰國、緬甸、印度、不丹。

191. **Chrysocoris javanus** Westwood 咖啡麗盾蝽 (Hsiao et al., 1977:57)
寄 主：咖啡。
分 佈：廣東、廣西；印尼。

192. **Chrysocoris stalii** (Wolff) 紫蘭麗盾蝽 (Luo et al., 1996:55)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

193. **Poecilocoris dissimilis** Martin 斜紋寬盾蝽 (Hun., 1992:220; Zhang et Lin, 1992:109)
Poecilocoris dissimilis Martin, 1902:
寄 主：華山松、雲南松、木姜子、油茶等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川。

194. **Poecilocoris druraei** (Linnaeus) 桑寬盾蝽 (Hun., 1992:221; Zhang, 1987[ed.] 1:81)

寄 主：桑、茶樹、油茶等。
分 佈：臺灣、福建、江西、浙江、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、雲南；緬甸、印度。

195. **Poecilocoris latus** Dallas 油茶寬盾蝽 (Xiao, 1992:349; Yunn., 1987:116; Zhang, 45; Zhang et Lin, 1992:109)
Poecilocoris latus Dallas, 1848:
別 名：*油茶蝽*。
寄 主：橘、板栗、茶、油茶、油桐、木荷等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、浙江； 越南、寮國、印尼、緬甸、孟加拉、印度。

196. **Poecilocoris lewisi** (Distant) 金綠寬盾蝽 (ASZI, 1986, 1:367; Hsiao et al., 1977:58; Hun., 1992:221; Lin et al., 1992:168; Yunn.,1987:116; Zhang, 42; Zhang, 1987[ed.] 1:81; Zhang et Lin, 1992:109)
Poecilocoris lewisi (Distant, 1883:)
別 名：*松蝽*。
寄 主：松、葡萄、石榴、刺梨、橘、板栗、黃山松、側柏、荊條、櫟、茶、油茶、茶油桐、木荷等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、越南、寮國、緬甸、印度。

197. **Poecilocoris rufigenis** Dallas 黃寬盾蝽 (Yunn., 1987:115; Zhang et Lin, 1992:109)
Poecilocoris rufigenis Dallas, 1851:
寄 主：板栗、油茶、油桐等。
分 佈：廣東、廣西、貴州、雲南；緬甸、印度、孟加拉、不丹。

198. **Poecilocoris sanzesignatus** Yang 山字寬盾蝽 (Lin et al., 1992:169; Zhang, 43; Zhang et Lin, 1992: 109)
Poecilocoris sanzesignatus Yang, 1934:
寄 主：山桃、雲南松、女貞、栓皮櫟、 楹木、洋槐、花椒、冬瓜、蒿等。
分 佈：湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川。

199. **Poecilocoris splendidus** Esaki 大蝽斑寬盾 (Hun., 1992:222)
寄 主：茅栗、白栗、青岡。
分 佈：湖南、貴州；朝鮮、日本。

200. **Scutellera perplexa** (Westwood) 長盾蝽 (Hsiao et al., 1977:61; Yunn.,1987:117; Zhang, 47)
寄 主：橘、雲南松、油茶、油橄欖、油桐、水冬瓜、赤桉等。
分 佈：福建、廣東、雲南、四川、河南；馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

201. **Sollenostethium chinensis** Stål 華溝盾蝽 (Hun., 1992:222; Tsiao et al., :56; Zhang, 41; Zhou, 1993(2):36)
別 名：*棉盾蝽*、*溝盾蝽*。
寄 主：柑橘、棉花、油茶、辣椒等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南；越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、緬甸、泰國、印度。

202. **Solenostethium rubropunctatum** (Guerin) 橘溝盾蝽 (Hsiao et al., 1977:56; Yunn., 1987:114)
寄 主：柑橘。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南；越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度。

Tessarotominae 荔蝽亞科

203. **Eurostus validus** Dallas 碩蝽 (ASZI, 1986, 1:368; Bu et Zheng, 1997:187; Bu et al., 1995:125; Chang et Jin, 1980:228-231; Hun., 1992:223; Lin et al., 1992:169; Xiao, 1992:347; Zhang, : 50; Zhang et Lin, 1992:110)
Eurostus validus Dallas, 1851:
=*Eusthenes pratti* Distant,
別 名：*大臭蝽*。
寄 主：板栗、梨、烏桕、茅栗、麻栗、苦櫧、白欒、麻欒、泡桐、油桐、梧桐、胡椒等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林，東部沿海各省，但長江以南山區較常見；越南、寮國、緬甸。

204. **Eusthenes cupreus** (Westwood) 異色巨蝽 (Bu et Zheng, 1997:187; Hun., 1992:223; Zhang et Lin, 1992:110; Zia, 1957:435)
Tessaratoma cupreus Westwood, 1837:27.
別 名：*綠蝽*。
寄 主：板栗、麻欒、油桐、油茶、烏桕等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、 安徽、陝西、甘肅；越南、寮國、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、不丹、錫金、尼泊爾、斯里蘭卡。

205. **Eusthenes femoralis** Zia 斑緣巨蝽 (Bu et al., 1995:125; Hun., 1992:224; Zia, 1957:431)
Eusthenes femoralis Zia, 1957::431.
寄 主：板栗、油茶、冬青等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、浙江。

206. **Eusthenes robustus** (Lepeletier et Serville) 巨蝽 (Hun., 1992:224; Yunn., 1987:120; Zhang, :53; Zhang et Lin, 1992:110; Zia, 1957: 433)
Tessaratoma rubustus Lepeletier et Serville, 1828:591.
寄 主：核桃、鵝掌柴(*Schefflea octophylla*)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川；越南、印度、不丹、斯里蘭卡、印尼。

207. **Mattiphus splendidus** Distant 瑰蝽 (Yunn., 1987:119; Zia, 1957:438)
Mattiphus splendidus Distant, 1921:166.
寄 主：桃、麻欒。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、雲南；寮國。

208. **Tessaratoma papillosa** (Drury) 荔蝽 (Cai et al., 1998(4):15; Chan, 1982:44; Chen et al., 1994:57;Chen et al., 1999(3):29; He et al., 1994(1):40; Hsiao, et al., 1977:66; Huang, 1990[ed.] 2:271-273; Huang et Gao, 1996:212; Lee et Jin, 1995:86, Liu, 1965, 5(4):329-339; Lin, 1986[ed.]:337-339; Lin, 1986[ed.]:337-339; Liu et Gu, 1999, 26(4):333-337; Liu et Zhang, 1998, 20(2):75-80; Liu et al., 1986, 2(2):54-58; Liu et al., 1995, 17(4):177-178; Luo et al., 1996:55; NZWDI, 1981:1968; Pu, 1962, 1(3):301-306; Qiu et al., 2000(1):30; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Yunn., 1987:118; Zhang, 1987ed.(1):83; Zhang, 1997:198-203; Zhu et al., 1998(4):25; Zia,1957:427)
Cimex papillosus Drury, 1770:96.
Tessaratoma papillosa, Kirkaldy, 1909:350.

別 名：*荔枝蝽*，*石柜*，*甘蠣*。
寄 主：荔枝、龍眼、檬果、柑橘、梅、梨、桃、橄欖、香蕉等果樹，無患子科的無患子和欒樹，另爲害四季橘，金橘，柚，檸檬、梅、梨、桃、番木瓜、酪梨、咖啡、茄、刀豆等 20 多種作物。
分 佈：金門、福建、江西、廣東、海南、貴川；越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。
附 註：能傳播龍眼鬼帚病(成蟲及若蟲)。
天 敵：*Hirodola palellifera* Som. 螳螂
黃掠蟻
Penicillum lilacinum Thom. 荔蝽菌
Ooencyrtus corbetii Ferriere 荔枝蝽卵跳小蜂
Ooencyrtus malayensis Ferriere 馬來黃腹卵跳小蜂
Ooencyrtus smaragdina Fabricius 荔蝽黃足卵跳小蜂
Anastatus sp. 平腹小蜂
鳥類：白頭婆，白眼圈，紅尾四。

209. **Tessaratoma quadrata** Distant 方肩荔蝽 (Chao, 1982:44; Hsiao, 1977:65; Yunn., 1987:118; Zhang, 1985:48; Zia, 1957:427)
Tessaratoma quadrata Distant, 1902:258.
寄 主：荔枝、龍眼、柑橘、欖類等。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、貴州；越南、印度、斯里蘭卡、尼泊爾。
天 敵：螳螂
Anastatus sp. 平腹小蜂
荔枝黃足小蜂
Ooencyrtus corbetii Ferriere 荔枝蝽卵跳小蜂
Ooencyrtus malayensis Ferriere 馬來黃腹卵跳小蜂
Ooencyrtus smaragdina Fabricius 荔蝽黃足卵跳小蜂
Telenomus sp. 荔枝蝽黑卵蜂
螞蟻

Dinidorinae 兜蝽亞科

210. **Aspongopus chinensis** Dallas 九香蟲 (Bu et al., 1995:124; Chao, 1982:44; Hua, 1992:225; Tsai, 1965:26; Yunn., 1987:122; Zhang, 1985:53; Zhang, 1987[ed.] 1:83)
寄 主：柑橘、桑、瓜類、稻、玉米、芋麻、茄、豆角、大豆等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南島、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、浙江、江蘇、河南；越南、寮國、緬甸、印度、錫金。

211. **Aspongopus fuscus** Westwood 背九香 (Chao, 1982:44)
別 名：*棕兜蝽*。
寄 主：柑橘、梧桐。
分 佈：福建。

212. **Aspongopus nigriventris** Westwood 黑腹兜蝽 (Yunn., 1987:121)
寄 主：梨、柑橘、雲南松、油茶、三角楓、檜木、夜來香、欖類等。
分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、四川、雲南、西藏；越南、印尼、印度。

213. **Aspongopus sanguinolentus** Westwood 紅邊兜蝽 (Yunn., 1987:121; Zhang, 1985:54)
寄 主：柑橘、雲南松、檜木、竹、魚尾葵(棕櫚科)等。
分 佈：海南、雲南、青海祁連；越南、印尼、緬甸、印度。

214. **Cyclopelta obscura** (Lepeletier-Serville) 大皺蝽 (Bu et Zheng, 1997:188; Bu et al., 1995:124; Zhang, 1985:54)
Cyclopelta obscura (Lepeletier-Serville, 1828:)
寄 主：咖啡、刺槐、紫荊、菜豆、四季豆、洋豆(矮子豆)、扁豆(刀豆)、黃豆等。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江(天目山)；菲律賓、越南、緬甸、印度、印尼。

Phyllocephalinae 短喙蝽亞科

215. **Megarrhamphus hastatus** (Fabricius) 棱蝽 (Chao, 1982:45; Hun.,1992 :226; Yunn., 1987:125)
別 名：*棱形蝽*，*長赤椿象*。
寄 主：柑橘、水稻、甘蔗。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、安徽、浙江、江蘇、河南；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、泰國、印度。

216. **Metonymis glandulosa** (Wolff) 大臭蝽 (Hun., 1992:227; Yunn., 1987:123; Zhang, 1985:62)
別 名：*臭大蝽*。
寄 主：板栗、柑橘、風景樹、水稻、蘆葦、禾本科雜草等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、安徽、浙江、江蘇、河南、山東、甘肅、遼寧；印尼、印度、斯里蘭卡。

Pentatominae 蝽亞科

217. **Aelia nasuta** Wagner 華麥蝽 (Hsiao et al., 1977, 1:136)
寄 主：梨、水稻、麥類等。
分 佈：江西、浙江、江蘇、湖北、山西、北京、甘肅、陝西、山東、遼寧、吉林、黑龍江。

218. **Agonoscelis nubilis** (Fabricius) 雲蝽 (Chao, 1982:46; Hun., 1992:232; Zhang, 1985:70; Zhang, 1987[ed.] 1:86; Zhang et Lin, 1992:114)
Agonoscelis nubilis (Fabricius, 1775:)
別 名：*雲斑毛蝽*。
寄 主：柑橘、油桐樹、茶、木麻黃、玉米、豆類、小麥、茴香等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江；日本、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

219. **Amyntor obscurus** (Dallas) 長葉蝽 (Lin et al., 1992:173; Zhang, 1985:80; Zhang et Lin, 1992:114)
Amyntor obscurus (Dallas, 1849:)
寄 主：山桃、核桃、懸鉤子、槭、大豆等。
分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、甘肅；印度、斯里蘭卡。

220. **Antestia cruciata** (Fabricius) 十字麗蝽 (Hsiao et al., 1977:169)

寄 主：咖啡。
分 佈：雲南；緬甸、印度、斯里蘭卡、錫金。

221. **Antestia palchra** Dallas 花麗蝽 (Hsiao et al., 1977:148)
寄 主：咖啡、水稻。
分 佈：雲南、青海；越南、緬甸、不丹、錫金。

222. **Bagrada hilaris** (Burmeister) 菘蝽 (Yann., 1987:138)
寄 主：桃、蘋果。
分 佈：雲南、四川、西藏；印度、斯里蘭卡。

223. **Belepis unicolor** Distant 必蝽 (Yann., 1987:143)
寄 主：板栗。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

224. **Brachynema germari** (Kolenati) 蒼蝽 (Zheng et Ren, 1996:51)
Brachynema germari (Kolenati, 1864:)
寄 主：沙棗、枸杞、水稻、玉米、小麥、高粱、向日葵、錦雞兒、紅柳、白花丁香、沙蒿、駱駝蓬等。
分 佈：河北、寧夏、新疆、內蒙古；古北界荒漠地區廣布。

225. **Cappaea taprobanensis** (Dallas) 柑橘格蝽 (Chao, 1982:46; Hsiao, 1977:153; Lin et al., 1992:173; Tsai, 1965:26; Yann., 1987:145; Zhang, 1987[ed.] 1:87)
別 名：*柑橘小格象*、*橘蝽*、*灰褐橘格象*。
寄 主：柑橘、黃果、梁王茶、油茶、麻櫟、橙木等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

226. **Carpocoris purpureipennis** (De Geer) 紫翅果蝽 (Hsiao et al., 1977:151)
寄 主：梨。
分 佈：陝西、山西、吉林、黑龍江；古北區、南歐、克什米爾。

227. **Cyclopelta obscura** Vollenhoven 咖啡蝽 (Tsai, 1965:27)
寄 主：咖啡、刺桐。
分 佈：臺灣、東南亞洲。

228. **Dalpada concinna** (Westwood) 溝腹岱蝽 (Yunn., 1987:141)
寄 主：板栗、雲南松、思茅松、油茶、烏飯等。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

229. **Dalpada jugatoria** Lethierry 長葉岱蝽 (Yunn., 1987:141)
寄 主：蘋果、桃、板栗、雲南松、女貞、油桐、麻櫟、樟等。
分 佈：廣東、廣西、貴州、四川、雲南、西藏；緬甸、印度、錫金。

230. **Dalpada smargina** (Walker) 綠岱蝽 (Bu et Zheng, 1997:195; Lin et al., 1992:174; Zhang, 1987[ed.] 1:88)
Dalpada smargina (Walker, 1868:)

寄 主：柑橘、桑、茶、油茶、油桐、黃荊等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、甘肅、河南、陝西、黑龍江。

231. **Dalpada oculata** (Fabricius) 岱蝽 (Chao, 1982:47; Hua., 1992:234; Hsiao et al., 1977:118)
=*Dalpada nodifera* Walker,
別 名：*雲南橘蝽*。
寄 主：柑橘、油茶、泡桐、杉等。
分 佈：福建、海南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、浙江、江蘇、陝西。

232. **Dalpada smaragdina** (Walker) 綠岱蝽 (Chao, 1982:47; Hsiao et al., 1977:118; Tsai, 1965:27; Zhang, 1985:78)
別 名：*綠背蝽*。
寄 主：柑橘類、桑、油桐、油茶、紫薇、大青、枸樹、楸樹等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、安徽。

233. **Dolycoris baccarum** (Linnaeus) 斑須蝽 (Bu et Zheng, 1997:196; Bu et al., 1995:123; Chao, 1982:47; Hsiao et al., 1977:105; Hua., 1992:234; Xu et Jiang, 1999:29; Yunn., 1987:148; Zhang, , 1985:68; Zhang, 1987[ed.] 1:88; Zhang et Lin, 1992:115; Zhao et al., 1997:189)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1761:)
別 名：*細毛蝽*、*斑角蝽*。
寄 主：蘋果、桃、梨、榛、柑橘、葡萄、雲南松、稻、麥、稗、高粱、玉米、粟、甘蔗、狼尾草、大豆、蠶豆、各種豆類、蔬菜、棉花、煙草、芝麻、蔥、胡蘿蔔、苦菜、亞麻、柳、森林等。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、寧夏、甘肅、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯、古北區、日本、印度北部、巴基斯坦、土耳其、敘利亞、埃及。
天 敵：*Trissolcus* sp. 蝽卵蜂(卵)

234. **Dolycoris indicus** Stål 雲南斑須蝽 (Yunn., 1987:148; Zhang et Lin, 1992:115)
Dolycoris indicus Stål, 1876:
寄 主：蘋果、雲南松、櫟類、豆科植物等。
分 佈：江西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、河南；印度。

235. **Erthesina fullo** (Thunberg) 麻皮蝽 (ASZI, 1986, 1:373; Bu et Zheng, 1997:196; Bu et al., 1995:123; Chao, 1982:47; Chen et Wang, 1987:134; Chen et al., 1993:59; Hsiao et al., 1977:138; Kou et Chow, 1987:416; Kou et al., 1989:310; Li, 1986, 13(4):276; Lin et al., 1992:174; Song et Wang, 1993:225-228; Tsai, 1965:27; Wang, 1998(4):18; Wang et al., 1993:24-24; Xu et Jiang, 1999:29; Yunn., 1987:140; Zhang, 1985:76; Zhang, 1987[ed.] 1:88; Zhang et Lin, 1992:116; Zhao et al., 1997:189; Zhao et al., 1998(4):28)
Erthesina fullo (Thunberg, 1783:)
別 名：*黃斑椿象*、*黃斑蝽*、*麻紋蝽*、*黃玫蝽*。
寄 主：食性極雜，梨、蘋果、柑橘、沙果、李、榛、梅、桃、杏、櫻桃、山楂、棗、柿、石榴、荔枝、龍眼、桑、咖啡、可可樹、松、奎寧、烏桕、甘蔗、棉、蓖麻、樟、相思樹、楝樹、白楊等幾十種果樹和林木。
分 佈：南起海南島，北迄內蒙古、遼寧，東達沿海各省和臺灣，西至陝西、四川、雲南，但黃河以南密度較大；日本、緬甸、印度、阿富汗、斯里蘭卡、安達

曼群島、印尼。

天 敵：*Trissolcus dricus* Kozlov et Le 麻皮蝽溝卵蜂(卵)
Trissolcus flavipes (Thomson) 黃足溝卵蜂(卵)

236. **Eusarcoris ventralis** 黑腹蝽 (Zhou et Zhang, 1995:38)

寄 主：香蕉。

分 佈：廣東。

237. **Eysarcoris guttiger** (Thunberg) 二星蝽 (Bu et Zheng, 1997:206; Chao, 1982:50; Hun., 1992:236; Tsai, 1965:27; Zhang, 1985:86; Zhang et Lin, 1992:124)

Eysarcoris guttiger (Thunberg, 1783:

=*Eysarcoris potanini* Jakovlev,

別 名：*圓白斑椿象*。

寄 主：雜食性。無花果、桑、茶，主要爲害水稻、小麥、大麥、高粱、玉米、甘藷、大豆、芝麻、花生、棉花、黃麻、茄、四季豆、扁豆、榕樹、泡桐、小竹、美麗胡枝子、桔梗、蘇葉和老鸛草等幾十種植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、河北、甘肅；朝鮮、日本、越南、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

238. **Eysarcoris montivagus** (Distant) 錨紋二星蝽 (Bu et Zheng, 1997:207; Hun., 1992:236; Zhang et Lin, 1992:124)

寄 主：桑、樟、茶等。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南；越南、緬甸、印度、錫金、阿富汗。

239. **Gonopsis affinis** (Uhler) 谷蝽 (Lin et al., 1992:170)

寄 主：馬尾松、華山松、水稻、甘蔗、茶、杉等

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本。

240. **Graphosoma rubrolineata** (Westwood) 赤條蝽 (Bu et Zheng, 1997:197; Hsiao et al., 1977:117; Zhang et Lin, 1992:117)

Graphosoma rubrolineata (Westwood, 1837:)

寄 主：黃菠蘿、櫟、榆、胡蘿蔔、白菜、蘿蔔、小茴香、蔥、洋蔥等蔬菜。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

241. **Halyomorpha halys** (Stål) 茶翅蝽 (ASZI, 1986[1]:378; Bu et Zheng, 1997:1197; Bu et al., 1995:123; Chen et al., 1993:61; Chu, 1994(3):46; Huang, 1990[ed.] 2:114-115; Hun., 1992:237; Li, 1996, 13(4):276; Ma et Luo , 1998:40; Song et Wang, 1993:225-228; Sun, 1997(2):45; Xu et Jiang, 1999:29; Yunn., 1987:147; Zhang, 1985:103; Zhang, 1987[ed.] 1:89; Zhang, 1994:37-38; Zhang et Lin, 1992:117; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zhao et al., 1998(4):28)

Halyomorpha halys (Stål, 1855:)

=*Halyomorpha picus* Distant,

寄 主：梨、蘋果、桃、山楂、石榴、棗、桑、海棠、黃果、紅橘、無花果、大豆、菜豆、甜菜、向日葵、枸杞、榆、梧桐、茶、油茶、刺槐、泡桐等，我國北方之梨樹受害較嚴重，其中以含糖及水份較多之鴨梨、雪梨受害較重，而黃

梨、紅肉梨、酸梨等含水較少，皮質較粗厚，含糖少的品種受害較輕。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、越南、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

242. **Halyomorpha picus** (Fabricius) 柑橘格蝽 (Chen et Wang, 1987: ; Hsiao et al.,1977:152)
別 名：*茶翅蝽*，*橘蝽*。
寄 主：柑橘、梨、蘋果等多種果樹、甜菜、油菜、大豆、菜豆。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南島、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、江西、浙江、上海、安徽、陝西、山西、河南、河北、遼寧；日本、越南、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Trissolcus flavipes* (Thomson) 黃足澤卵蜂(卵)。

243. **Homologonia crocemaculata** Chen 橘斑全蝽 (Chen, 1983:44; Zhang et Lin, 1992:117)
Homologonia crocemaculata Chen, 1983:44.
寄 主：華山松。
分 佈：貴州、雲南、四川。

244. **Homalogonia obtusa** (Walker) 全蝽 (Lin et al., 1992:176; Zhang et Lin, 1992:117)
Homalogonia obtusa (Walker, 1868:)
寄 主：油松、胡枝子、大豆、櫟等。
分 佈：福建、江西、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、日本、印度。

245. **Homalogonia pinicola** Lin et Zhang 松全蝽 (Hun., 1992:237)
寄 主：馬尾松。
分 佈：江西、廣西。

246. **Hoplistodera pulchra** Yang 紅玉蝽 (Hun., 1992:238; Lin et al., 1992:176)
寄 主：草莓、敗醬、白花前胡等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、甘肅。

247. **Laprius varicornis** (Dallas) 廣蝽 (Bu et Zheng, 1997:200; Bu et al., 1995:123; Hun., 1992:238; Lin et al., 1992:177)
Laprius varicornis (Dallas, 1851:)
寄 主：雲南松、泡桐、閩楊、蒲公英等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北；日本、菲律賓、越南、緬甸、印度、巴基斯坦。

248. **Lelia decempunctata** Motschulsky 彎角蝽 (Hsiao et al., 1977:109; Hun., 1992:239; Zhang, 1985:72; Zhang et Lin, 1992:118)
Lelia decempunctata Motschulsky, 1859:
別 名：*十點蝽*。
寄 主：葡萄、板栗、糖槭、胡桃楸、醋栗、梓、榆、楊、大豆等。

分 佈：江西、湖南、西藏、四川、浙江、安徽、陝西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

249. **Menida formosa** (Westwood) 黑斑曼蝽 (Yunn., 1987:135)

寄 主：蘋果、櫟類。

分 佈：臺灣、江蘇南部、江西、廣東、廣西、貴州、雲南。

250. **Menida histrio** (Fabricius) 稻赤曼蝽 (ASZI, 1986, 1:372; Chao, 1982:48; Yunn., 1987:135; Zhang, 1985:74; Zhang, 1987[ed.] 1:90)

別 名：*稻赤蝽*，*小赤蝽*。

寄 主：柑橘、桑、水稻、小麥、玉米、花生、甘蔗、亞麻、油桐等，並發現捕食鱗翅目幼蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、雲南、西藏；越南、印尼、緬甸、印度。

251. **Menida lata** Yang 寬曼蝽 (Hun., 1992:239; Lin et al., 1992:177)

別 名：*菜豆蝽*。

寄 主：板栗、長葉凍綠、雲南雞血藤、水稻、蠶豆、菜豆等。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、湖北、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南。

252. **Menida scotti** Puton 北曼蝽 (Lin et al., 1992:177)

寄 主：梨、玉米、高粱、榆、柳等。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、陝西、山西、河北、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

253. **Menida violacea** Motschulsky 紫藍曼蝽 (Bu et Zheng, 1997:201; Chao, 1982:48; Hun., 1992:240; Lin et al., 1992:177; Zhang, 1985:75; Zhang et Lin, 1992:119)

Menida violacea Motschulsky, 1861:

別 名：*紫藍蝽*。

寄 主：梨、榆、樟、水稻、小麥、大豆、玉米、蠶豆、菜豆、馬鈴薯、紅子(*Pyracantha* spp.)、油茶、其他果樹等。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

254. **Nezara viridula** (Linnaeus) 稻綠蝽 (Bu et Zheng, 1997:201; Chao, 1982:49; Hun., 1992:240; Luo, 1991:85; Luo et Jin, 1995:86; Luo et al., 1996:55; Tsai, 1965:28; Zhang, 1987[ed.] 1:91; Zhang et Lin, 1992:119)

Nezara viridula (Linnaeus, 1758:)

別 名：*青翅蟲*，*綠點蝽*，*稻綠蝽全綠型*。

寄 主：柑橘、梨、橡果、香蕉、酪梨、腰果、茶、稻、小麥、高粱、玉米、甘蔗、粟、印度田菁、黃麻、棉、胡麻、木藍、蓖麻、虎爪豆、太陽麻、十一葉馬棘、煙草、大豆、菜豆、豌豆、落花生、灑地松、竹、油桐等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、寧夏；朝鮮、日本、馬來半島及群島、印度、中亞、非洲、歐洲、北美南部、南美洲、澳洲、全世界。

255. **Nezara viridula** forma **aurantiaca** Costa 稻綠蝽點斑型 (Chao, 1982:48; Yunn.,1987:134; Zhang, 1985:100)

別 名：*點斑稻綠蝽*、*點綠蝽*。

寄 主：柑橘、茶、水稻、大豆、芝麻、甘藷、櫟類等。

分 佈：福建、江西、湖北、廣西、雲南、貴州、四川。

256. **Nezara viridula** forma **smaragdula** (Fabricis) 稻綠蝽全綠型 (Bu et al., 1995:123; Chao, 1982:49; Lin et al., 1992:177; Yunn., 1987:135)

寄 主：柑橘、雲南松、白臘樹、梧桐、蓖麻等。

分 佈：福建、江西、湖南、湖北、廣東、廣西、貴州、四川；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來亞、印尼、斯里蘭卡、歐洲、馬達加斯加、南非、澳洲、新西蘭、委內瑞拉、圭亞那、古巴。

257. **Nezara viridula** forma **torquata** (Fabricius) 稻綠蝽黃肩型 (Bu et al., 1995:123; Chao, 1982:49; Lin et al., 1992:178; Yunn., 1987:134)

別 名：*黃肩稻綠蝽*、*黃肩綠蝽*。

寄 主：蘋果、柑橘、華山松、雲南松、茶、梧桐、櫟類、水稻(穗)、甘藷、芝麻、菜豆、綠豆等。

分 佈：福建、江西、廣西、雲南、貴州、四川。

258. **Palomena unicolorella** Kirkaldy 尖角碧蝽 (Yunn.,1987:145; Zhang et Lin, 1992:120)

Palomena unicolorella Kirkaldy, 1909:

寄 主：核桃、華山松、木姜子、檫木、櫟類等。

分 佈：貴州、雲南、西藏、四川；印度、孟加拉。

259. **Pentatoma japonica** Distant 日本真蝽 (Hsiao et al., 1977:125; Hun., 1992:243; Lin et al., 1992:179; Zhang, 1985:81; Zhang et Lin, 1992:121)

Pentatoma japonica Distant, 1882:

寄 主：梨、榆、白樺、蒙古柞等果樹。

分 佈：福建、湖南、貴州、雲南、浙江、湖北、陝西、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞東部。

260. **Pentatoma rufipes** (Linnaeus) 紅足真蝽 (Hsiao et al., 1977:127; Zhang, 1985:82; Zhang et Lin, 1992: 122)

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758:)

別 名：*栗蝽*。

寄 主：梨、杏、山楂、海棠、酸棗、椿等。

分 佈：西藏、四川、陝西、青海、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

天 敵：*Trissolcus kozlovi* Rjachovsky　考氏澤卵蜂(卵)

261. **Pentatoma semiannulata** (Motshulsky) 褐真蝽 (Bu et Zheng, 1997:203; Hsiao et al., 1977:126; Hun., 1992:244; Lin et al., 1992:179; Zhang, 1985:81)

Pentatoma semiannulata (Motshulsky, 1859:)

=*Pentatoma armandi* Fallou,

別 名：*朱綠蝽*。

寄 主：梨、樺樹等。

分 佈：江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、河北、

北京、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、西伯利亞。

262. **Placosternum** sp. 葬蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:92)
寄 主：桑、無花果、橙等。
分 佈：江西。

263. **Plautia crossota** (Dallas) 珀蝽 (Chao, 1982:49; Hun., 1992:244; Lin et al., 1992:179; Yunn., 1987:378; Zhang, 1985:104; Zhang, 1987[ed.] 1:92; Zhang et Lin, 1992:122)
=*Plautia fimbriata* Stål,
=*Plautis stali* Scott,
別 名：*朱綠蝽*，*克羅蝽*，*橘赤斑蝽*。
寄 主：柑橘、龍眼、梨、桃、李、柿、核桃、葡萄、桑、馬尾松、雲南松、茶、油茶、杉、鹽膚木、苦楝、油桐、泡桐、樟樹、楊梅、杉、水稻、大豆、玉米、高粱、芝麻、豌豆、蘆筍等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、陝西、河北、黑龍江，國內除吉林、內蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆外，各省區都有分佈；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡、阿富汗、馬達加斯加、岡比亞、西非及東非。

264. **Plautia stali** Scott 柿蝽 (Tsai, 1965:28)
寄 主：柿。
分 佈：臺灣。

265. **Priassus spiniger** Haglund 尖角普蝽 (Bu et Zheng, 1997:205; Hun., 1992:245; Lin et al., 1992:180; Yunn., 1987:137)
Priassus spiniger Haglund, 1868:
寄 主：梨、桃、櫻桃、板栗、海州常山等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北；印尼、緬甸、印度。

266. **Poecilocoris druraei** Linnnaeus 突來桑蝽 (Tsai, 1965:28)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、中國大陸；緬甸、印度。

267. **Prionca tonkinensis** Distant 鋸蝽 (Yunn., 1987:137)
寄 主：桃、雲南松。
分 佈：雲南、貴州；中南半島。

268. **Rhaphigaster nebulasa** Poda 沙棗潤蝽 (Hsiao et al., 1977:107; Zhang, 1985:70)
別 名：*沙棗蝽*。
寄 主：沙棗、李、沙果、柳、楊、槭樹、刺槐等。
分 佈：內蒙古、甘肅、寧夏、新疆；蒙古、小亞細亞、伊朗、中歐、南歐、亞爾及利亞。

269. **Rhychocoris humeralis** (Thunberg) 棲蝽 (ASZI, 1986, 1:372; Chao, 1982:49; Chiu, 1960:46-50; Chiu et al., 1985:1-8; Hu et Li, 1995(4):27; Huang, 1990[ed.] 2:221-223; Hun., 1992:246; Hsiao et al., 1977:110; NZWDI, 1981:1876; Tao et Wu, 1989:143-144; Yunn., 1987:134; Zhang, 1987[ed.] 1:92)

別 名：*角肩椿象*、*柑橘椿象*、*大綠椿象*、*柑橘綠蝽*、*柑橘大綠蝽*、*長吻蝽*、*青椿象*。

[Citrus stink bug]

寄 主：柑橘類及其他芸香科植物、梨、蘋果、沙果、板栗等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、浙江、江蘇、山東；菲律賓、越南、寮國、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。

天 敵：蜘蛛

Mantidae 螳螂科

Oecephylla smargdina Fabricius 黃柑蟻

Anastatus colemani Crawford 旋小蜂

Anastatus formosanus Crawford

Anastatus japonicus Ashmead

Tetrastichus gardneri Ferrière 嗜小蜂

Trissolcus sp. 黑細蜂

Telenomus latisulcus Crawford

270. **Rhynchocoris nigridens** Stål 黑角棱蝽 (Hsiao et al., 1977:111)

寄 主：柑橘類及其他芸香科果樹。

分 佈：福建、廣東、海南、雲南。

271. **Rubiconia intermedia** (Wolff) 珠蝽 (ASZL, 19861:376; Hun., 1992:246; Hsiao et al., 1977:143; Zhang, 1985:96)

別 名：*同邊白*。

寄 主：蘋果、棗、梨、毛竹、麥類、水稻、豆類、狗尾草、小槐花、大青、老鸛草、柳葉菜、火芹菜等。

分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、河南、陝西、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

272. **Scotinophara lurida** (Burmeister) 稻黑蝽 (Chao, 1982:50; Zhang, 1985:84; Zhou et Zhang, 1995)

別 名：*黑椿象*。

寄 主：主害水稻，也爲害柑橘、香蕉等果樹及小麥、粟、甘蔗、玉米、豆、馬鈴薯等農作物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、安徽、浙江、江蘇、山東、河北；日本、馬來半島、印度、斯里蘭卡。

273. **Solenostethium chinense** Stål 秦柑蝽 (Tsai, 1965:29; Zhang, 1987[ed.] 1:82)

寄 主：柑橘、棉。

分 佈：臺灣、江西、中國大陸。

274. **Stenozygum speciosum** (Dallas) 彩蝽 (Yunn., 1987:138)

寄 主：蘋果、油茶。

分 佈：廣西、雲南、四川；緬甸、印度、斯里蘭卡。

275. **Stollia montivatus** (Distant) 錨紋蝽 (Chao, 1982:50)

Eysarcoris montivatus Distant,
寄 主：無花果、桑、水稻、小麥、高粱、玉米、大豆、甘藷、茄、棉、榕等。
分 佈：福建。

276. **Stollia rosaceus** (Distant) 紅角二星蝽 (Yunn., 1987:131)
寄 主：柑橘、竹、樸類等。
分 佈：廣西、雲南；越南、緬甸。

277. **Udonga spinidens** Distant 突蝽 (Hsu., 1992:247; Yunn., 1987:143)
寄 主：核桃、馬尾松、油橄欖、麻櫟、小麥、小黑麥、玉米等。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、湖北、陝西；越南。

278. **Vitellus orientalis** Distant 豐蝽 (Hsiao et al., 1977:110)
寄 主：柑橘。
分 佈：廣東、廣西、雲南；印度。

Acanthosomatidae 同蝽科

279. **Acanthosoma denticauda** Jakovlev 細盾同蝽 (Hsiao et al., 1977:177; Zhang, 1985:106)
寄 主：梨、山楂、落葉松等。
分 佈：陝西、北京、山西、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞。

280. **Acanthosoma distinctum** Dallas 顯同蝽 (Hsu., 1992:249)
寄 主：落葉松、木姜子等。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、西藏、浙江、湖北、山東；日本、印度。

281. **Acanthosoma spinicolle** Jakovlev 泛刺同蝽 (Liu, 1992:132; Yunn., 1987:154; Zhang, 1985:106)
寄 主：柑橘、梨樹、華山松、雲南松、漆樹等的花。
分 佈：雲南、西藏、四川、湖北、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、東西伯利亞。

282. **Elasmostethas interstinctus** (Linnaeus) 直同蝽 (Hsiao et al., 1977:161; Liu, 1992:130)
Elasmostethas interstinctus (Linnaeus, 1758:)
寄 主：梨。
分 佈：廣東 (沿海島嶼)、雲南、湖北、山西、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲、北美。

283. **Elasmostethus membranaceus** Shiraki 小綠蝽 (Tsai, 1965:27)
別 名：*小綠椿象*。
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣。

284. **Elasmucha yunnana** Liu 滇匙同蝽 (Yunn., 1987:150)
寄 主：核桃。
分 佈：雲南。

285. **Sastragala esakii** Hasegawa 伊錐同蝽 (Bu et Zheng, 1997:211; Bu et al., 1995:125; Hun., 1992:251)
Sastragala esakii Hasegawa, 1959:
寄 主：栗、櫟、野漆等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、陝西、北京；日本。

286. **Sastragala kunmingensis** Liu 桃錐同蝽 (Yunn., 1987:153)
寄 主：桃。
分 佈：雲南。

Urostylidae 異蝽科

287. **Tessaromerus maculatus** Hsiao et Ching 斑華異蝽 (Zhang et Lin, 1992:124)
Tessaromerus maculatus Hsiao et Ching, 1977:
寄 主：
分 佈：雲南、四川、甘肅。

288. **Tessaromerus tuberlosus** Hsiao et Ching 寬腹華異蝽 (Zhang et Lin, 1992:125)
Tessaromerus tuberlosus Hsiao et Ching, 1977:
寄 主：
分 佈：四川。

289. **Urochela flavoannulata** (Stål) 黃壯異蝽 (Xiong, 1992:207)
寄 主：
分 佈：湖南、四川、陝西、山西、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

290. **Urochela lutovaria** Distant 花壯異蝽 (Chao, 1982:52; Chen et Wang, 1987:133-134; Huang, 1990[ed.] 2:113-114; Hun., 1992:261; Li, 1995:31-32; Mao et Wu, 1947:8-12; Ren, 1997:293; Sun, 1984:367-368; Zhang, 1985:110; Zhang, 1987[ed.] 1:96)
Urochela lutovaria Distant, 1881:
寄 主：梨、蘋果、檳沙果、桃、李、杏、櫻桃、棠梨、海棠等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、陝西、河北、山西、青海、甘肅、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

291. **Urochela pollescens** (Jakovlev) 無斑壯異蝽 (Xiong, 1992:207)
寄 主：
分 佈：湖南、雲南、四川、山西、甘肅。

292. **Urochela sordida** Li 污壯異蝽 (Li, 1981:320; Zhang et Lin, 1992:125)
Urochela sordida Li, 1981:320-321.
寄 主：梨、薔薇(*Rosa omeiensis*)。
分 佈：四川(康定)。

293. **Urolabida histrionica** Westwood 橢盾盲異蝽 (Yunn., 1987:159)
寄 主：毛柿。
分 佈：雲南；緬甸、印度北部、錫金。

294. **Urostylis furcatis** Ren 芒突蟌異蝽 (Ren, 1984:419; 1997:295)

Ursotylis furcatis Ren, 1984:419.
寄 主：華山松。
分 佈：雲南、湖北。

295. **Urostylis striicornis** Scott 匙突蟌異蝽 (Hun., 1992:262; Ren, 1997:296)
Urostylis striicornis Scott, 1874:
寄 主：橘、柚。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、陝西、遼寧；日本。

296. **Urostylis yangi** Maa 淡蟌異蝽 (Hun., 1992:263; Lian et Zhu, 1993:146; Xiao, 1992:352; Yuan et Luo, 1984:160-161; Zhang, 1985:110; Zhang et Lin, 1992:126; Zhao et Shu, 1989:221-223)
寄 主：板栗、茅栗。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、安徽、河南。
天 敵：白僵菌

297. **Urostylis** sp. 蟌異蝽 (Xiong, 1992:207)
寄 主：
分 佈：貴州。

Coreidae 緣蝽科

298. **Acanthocoris scaber** (Linnaeus) 縮緣蝽 (Liu et Zheng, 1997:220; Ren, 1992:138; Zhang, 1987[ed.] 1:98)
Acanthocoris scaber (Linnaeus, 1763:)
寄 主：桑、辣椒、茄、番茄、蠶豆、甘薯、馬鈴薯、蔓陀羅。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東；馬來西亞、印度。

299. **Anoplocnemis binotata** Distant 斑背安緣蝽 (Hun., 1992:254; Ren, 1992:138; Zhang, 1987[ed.] 1:96)
Anoplocnemis binotata Distant, 1918:
寄 主：赤松、紫穗槐、大豆等豆科物。
分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、山東；印度。

300. **Anoplocnemis phasiana** Fabricius 紅背安緣蝽 (Luo et al., 1996:55; Ren, 1992:138; Yunn., 1987:164; Zhang, 1987[ed.] 1:96)
Anoplocnemis phasiana Fabricius, 1781:
寄 主：柑橘、番石榴、橡果、桃、百香果、桑、華山松、雲南松、泡桐、水冬瓜、秧青、合歡、大豆、花生、豆類、瓜類、竹、棉、葫蘆、木槿、絲瓜、葛藤、貓尾木、豆類及山螞蟥等。
分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川。

301. **Clavigralla horrens** Dohrn 小棒緣蝽 (Luo, 1991:85; Luo et al., 1996:56)
寄 主：腰果、橡果。
分 佈：海南。

302. **Clavigralla spinofemoralis** Shiraki 粗腿針緣蝽 (Tsai, 1965:29)
寄 主：桑。

分 佈：臺灣。

303. **Cletus punctiger** Dallas 稻刺緣蝽 (Bu et al., 1995:127; Liu et Zheng, 1997:224; Luo et al., 1996:56; Yunn., 1987:175; Zhou et Zhang, 1995:38)

寄 主：柑橘、檬果、香蕉、雲南松、水稻、麥、玉米、高粱、粟、甘薯、茭白、甘蔗、棉花、煙草、苧麻、芝麻、豆類、瓜類、茶、油茶、油桐、泡桐、櫟類和禾本科雜草。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西’河北。

304. **Cordysceles turpis** Hsiao 怪緣蝽 (Yunn., 1987:166)

寄 主：板栗、豆科植物。

分 佈：雲南。

305. **Derepteryx fuliginosa** (Uhler) 褐奇緣蝽 (Ren, 1992:135; Zhang, 1985:112)

Derepteryx fuliginosa (Uhler, 1860:)

寄 主：懸鉤子、楓香、鹽膚木、蜂斗菜 (*Petasites* sp.)、莓葉委陵菜(*Potentilla fargarioides* L.)等植物。

分 佈：福建、江西、四川、浙江、江蘇、河南、甘肅、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞。

306. **Derepferyx hardwickii** White 哈奇緣蝽 (Yunn.,1987:163)

寄 主：核桃、板栗、茶樹、水冬瓜、櫟。

分 佈：雲南、西藏；緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

307. **Dereferyx lunata** (Distant) 月肩奇緣蝽 (Bu et al., 1995:127; Ren, 1992:135; Yunn., 1987:163; Zhang, 1985:111)

Dereferyx lunata (Distant, 1900:)

寄 主：棠梨、山桃、西南杭子梢[*Campylotropis delavayi* (Franch.) Schindl.]、懸鉤子。

分 佈：福建、江西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河南。

308. **Eohydara fulviclava** Bergroth 猶希緣蝽 (Luo, 1991:85)

寄 主：腰果。

分 佈：海南。

309. **Gonocerus longicornis** Hsiao 長角崗緣蝽 (Zhang, 1987[ed.] 1:99)

寄 主：馬尾松。

分 佈：江西。

310. **Gonocerus yunnansis** Hsiao 雲南崗緣蝽 (Chai et Liang, 1989:298-300; Liu et Zheng, 1997:224; Ren, 1992:140; Xiao, 1992:239; Yunn. 1987: 174)

Gonocerus yunnansis Hsiao, 1964:

寄 主：桃樹、華山松、雲南松、思茅松、馬尾松、女貞、油茶、馬鞭草、櫟類。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北。

311. **Homococerus (Anacanthocoris) cletoformis** Hsiao 顯脈同緣蝽 (Yunn., 1987:169)

寄 主：板栗、算盤子樹。
分 佈：雲南。

312. **Homoeocerus (Anacanthocoris) concoloratus** Uhler 一色同緣蝽 (Hisao, 1962:69)
Anacanthus concoloratus Uhler, 1860:
寄 主：柑橘、豆類。
分 佈：廣東、四川、安徽、江蘇、長江流域等地。

313. **Homoeocerus (s. str.) dilatatus** Horvath 廣腹同緣蝽 (Hsiao et al., 1977:231; Hun., 1992:256; Liu et Zheng, 1997:222)
Homoeocerus dilatatus Horvath, 1879:
寄 主：柑橘、豆類作物。
分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、湖北、河南、河北、北京、吉林；朝鮮、日本、俄羅斯。

314. **Homoeocerus (Anacanthocoris) humeralis** Hsiao 闊肩同緣蝽 (Yunn., 1987:171)
寄 主：毛柿、樸類。
分 佈：雲南。

315. **Homoeocerus (s. str.) marginellus** Herrich-Schaffer 小點同緣蝽 (Bu et al., 1995:127; Ren, 1992:139; Zhang, 1987[ed.] 1:99)
Homoeocerus (s. str.) *marginellus* Herrich-Schaffer, 1812:
寄 主：柑橘、水稻、大豆、豆科植物、甘薯、胡枝子、苧麻。
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、四川、浙江；爪哇。

316. **Homoeocerus (Anacanthocoris) stricornis** Scott 紋須同緣蝽 (Bu et al., 1995:128; Hsiao et al., 1977:235; Hun., 1992:257; Liu et Zheng, 1997:222; Ren, 1992:139; Yunn., 1987:169; Zhang, 1985:125)
Homoeocerus stricornis Scott, 1874:
寄 主：檬果、柑橘、雲南松、茶、油茶、樸類、合歡、紫莖花、茄科及豆科植物。
分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、北京、河北、甘肅；日本、印度、錫金、斯里蘭卡。

317. **Homoeocerus (Ancanthocoris) walkerianus** Lethierry et Severin 瓦同緣蝽 (ASZI, 1986, 1:382; Hsiao et al., 1977:238; Hun., 1992:257; Liu et Zheng, 1997:221; Ren et Xiong, 1992:189; Xiao, 1992:340; Zhang, 1985:127; Zhang, 1987[ed.] 1:100)
Homoeocerus walkerianus Lethierry et Severin, 1894:
寄 主：板栗、桃、柑橘、桑、栗、松、茶、油茶、油桐、棉、稻、甘蔗、合歡、楓香、麻櫟、糯米條、黃檀、樟等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、甘肅。

318. **Homoeocerus (Ancanthocoris) walkeri** Kirby 合歡同緣蝽 (Luo et Jin, 1995:86; Luo et al., 1966:56)
寄 主：酪梨、檬果。
分 佈：海南。

319. **Hygia (s. str.) opaca** Uhler 暗黑緣蝽 (ASZI, 1986, 1:381; Bu et al., 1995:128; Liu et Zheng, 1997:221)
寄 主：桃、桑、馬尾松、刺桐、南瓜、蠶豆、苧麻。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、湖北、河南、山西；日本。

320. **Hygia (s. str.) touchei** Distant 環胫黑緣蝽 (Hun.,1992:256; Liu et Zheng, 1997:221; Ren, 1992:138; Yunn., 1987:172)

Hygia touchei Distant, 1901:

寄 主：核桃、辣椒、樟類。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；錫金。

321. **Leptocorisa acuta** (Thunberg) 異稻緣蝽 (Chen, 1992:328-331; Luo, 1991:85; Zhang, 1987[ed.] 1:102)

寄 主：柑橘、腰果、水稻、茅草、芒、游草、馬唐、稗草、三棱草、下山虎、黃藤(*Daemonorops margaritae* (Hance) Becc.、露葉藤、胡椒、露兜樹(*Pandanus sectorius*)、竹、木麻黃、鐵芒萁(*Dicranopteris linearis* (Burmt.) Vnoderw 等多種植物。

分 佈：江西、海南。

天 敵：蟻、蜘蛛、瓢蟲、甲蟲。
蝽黑卵蜂

322. **Leptocorisa chinensis** Dallas 華稻緣蝽 (Bu et al., 1993:128; Liu et Zheng, 1997:231; Luo et al., 1996:86; Luo et al., 1996:56; Zhang, 1987[ed.] 1:102; Zhao et al., 1997:189)

Leptocorisa chinensis Dallas, 1852:

寄 主：棟、蓮霧、橄果、水稻、玉米、高粱、甘蔗、苧麻、花生、粟、小麥、芝麻。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河北；日本。

323. **Leptocorisa varicornis** (Fabricius) 異稻緣蝽 (Zhang, 1983:139; Zhang, 1987[ed.] 1:102; Zhou et Zhang, 1995:38)

寄 主：柑橘、桃、棗、香蕉、桑、水稻、麥類、玉米、粟、高粱、大豆、花生、交白、芝麻、棉花、甘蔗、煙草、茶、蔬菜等多種經濟作物和禾本科雜草及木麻黃(廣東)。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南；東南亞、南太平洋諸島、大洋洲。

324. **Leptoglossus membranaceus** Fabricius 翼腿緣蝽 (Tsai, 1965:30)

寄 主：百香果、棉、冬瓜、胡瓜、南瓜等瓜類。

分 佈：臺灣、海南；琉球、馬來群島、印度、澳洲、非洲。

325. **Mictis serina** Dallas 黃經米緣蝽 (Liu et Zheng, 1997:219; Zhao et al., 1997:189)

Mictis serina Dallas, 1852:

寄 主：棟、木姜子。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江。

326. **Mictis tenebrosa** (Fabricius) 曲經米緣蝽 (ASZI, 1986, 1:379; Hsiao et al., 1977:211; Hun., 1992:253; Liu et Zheng, 1997:219; Yunn., 1987:164; Zhang, 1985:114; Zhang, 1987[ed.] 1:97)

Mictis tenebrosa (Fabricius, 1787:)

寄 主：梨、柿子、板栗、毛栗、油茶、黃杞、算盤子、白櫟、麻櫟、苦櫧、花生、油菜、豆科植物。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、湖北。

327. **Ochrochira ferruginea** Hsiao 銹赭緣蝽 (Yunn., 1987:162)

寄 主：柑橘、板栗、蘋果、桑、華山松、雲南松、水冬瓜、油茶。

分 佈：雲南、西藏、四川。

328. **Ochrochira fusca** Hsiao 黑赭緣蝽 (Luo et al., 1996:56; Yunn., 1987:162)
寄 主：柑橘、檬果、樸類。
分 佈：海南、雲南。

329. **Paradasynus longirostris** Hsiao 吻副黛緣蝽 (Luo et Jin, 1995:86)
寄 主：酪梨。
分 佈：海南。

330. **Pendulinus nmicobarensis** Meyer 紅角緣蝽 (Tsai, 1965:30)
寄 主：柑橘、番石榴、稻。
分 佈：臺灣、中國大陸；緬甸、印度。

331. **Physomerus grossipes** (Fabricius) 菲緣蝽 (Yunn., 1987:166)
寄 主：羅望子、油茶、苦楝、化香、香椿、五加皮、倒吊筆。
分 佈：雲南；馬來半島、緬甸、印度、斯里蘭卡。

332. **Riptortus linearis** Fabricius 條蜂緣蝽 (Chao, 1982:56; Liu et Zheng, 1997:233; Luo et al., 1996:56; Ren, 1992:145; Yunn., 1987:179; Zhang, 1985:142)
Riptortus linearis Fabricius, 1775:
別 名：*紋緣蝽*，*棒蜂緣蝽*。
寄 主：檬果、柑橘、茶、早冬瓜、秧青、黃豆、四季豆、蠶豆、水稻、麥類、高粱、玉米、黃粟、紅藷、棉花、甘蔗、絲瓜、狗尾草、小巢草等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、河北；菲律賓、馬來西亞、緬甸、泰國、印度、印尼。

333. **Riptortus parvus** Hsiao 小蜂緣蝽 (Liu et Zheng, 1997:233; Luo et Jin, 1995:86)
Riptortus parvus Hsiao, 1964:
寄 主：酪梨、田菁、綠豆。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、湖北。

334. **Trematocoris insignis** (Hsiao) 無斑特緣蝽 (Yunn., 1987:165)
寄 主：板栗。
分 佈：雲南。

Pyrrhocoridae 紅蝽科

335. **Antilochus nigripes** (Burmeister) 黑足頸灣蝽 (Luo et al., 1996:56)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

336. **Dysdercus cingulatus** (Fabricius) 離斑棉紅蝽 (Hsiao et al., 1981:235; Luo, 1991:85; Luo et Jin, 1995:86; Luo et al., 1996:56; Yunn., 1987:193)
別 名：*棉紅蝽*。
寄 主：柑橘、檬果、腰果、甘蔗、棉。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、四川、雲南；菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡、澳洲。

337. **Dysdercus evanescens** Distant 細斑棉紅蝽 (Liu, 1992:164; Yunn., 1987:192)
Dysdercus evanescens Distant, 1902:
寄 主：柑橘、豆類。
分 佈：雲南、西藏；緬甸、印度、孟加拉、錫金。

338. **Physopelta gutta** (Burmeister) 突背斑紅蝽 (ASZI, 1986, 1:391; Dong et Zheng, 1997:251; Liu, 1992:163; Yunn., 1987:189)
Physopelta gutta (Burmeister, 1834:)
寄 主：柑橘、板栗。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、湖北；日本、緬甸、孟加拉、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Lygaeidae 長蝽科

339. **Gastrodes chinensis** Zheng 中國松果長蝽 (Li et al., 1992:4; Xiao et al. 1981, 2:145)
Gastrodes chinensis Zheng, 1981:145.
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果)
Pinus massoniana Lambert 馬尾松(松果)
分 佈：廣西、湖北、陝西、山西。

340. **Gastrodes crassifemur** Zheng 巨股松果長蝽 (Zheng, 1979:62)
Gastrodes crassifemur Zheng, 1979:62.
寄 主：松果。
分 佈：雲南。

341. **Gastrodes grossipes** (De Geer) 歐亞松果長蝽 (Zheng, 1979:61)
寄 主：松果(*Pinus*)、冷杉(*Abies*)、雲杉(*Picea*)、黃杉(*Pseudotsuga*)屬等。
分 佈：歐洲、亞洲(舊北區)。

342. **Gastrodes grossipes ssp. japonicus** (Stål) 日本松果長蝽 (Zheng, 1979:61)
寄 主：松果。
分 佈：華北、東北地區可能會發生；日本。

343. **Gastrodes piceus** Zheng 暗黑松果長蝽 (Hun., 1992:272)
Gastrodes piceus Zheng, 1979:63.
寄 主：松果、杉。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇。

344. **Gastrodes pilifer** Zheng 立毛松果長蝽 (Zheng, 1979:61)
Gastrodes pilifer Zheng, 1979:61.
寄 主：馬尾松松果。
分 佈：廣西、湖北。

345. **Gastrodes remotus** Usinger 黑胸松果長蝽 (Zheng, 1979:61)
Gastrodes remotus Usinger, 1942:

寄 主：松果。
分 佈：廣東沿海島嶼。

346. **Oxycarenus laetus** Kiroy 尖長蝽 (Luo et al., 1996:56)
寄 主：檬果(花枝)。
分 佈：海南。

347. **Paeudopachy brachius guttus** 圓眼長蝽 (Zhou et Zhang, 1995:38)
寄 主：香蕉。
分 佈：廣東。

348. **Sinorsilus piliferus** Usinger 杉木扁長蝽 (Bu et al., 1995:131; Hsu., 1992:267, Xiao, 1992:335)
寄 主：松球果、杉。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、湖北。

349. **Stigmatonotum rufipes** (Motschulsky) 小遠綴長蝽 (Bu et al., 1995:132; Hsiao et al., 1981: 164; Zheng et Zou, 1992:157)
寄 主：懸鉤子(*Rubus palmayuspes* (Thunberg))、金絲桃科的田基黃(*Hypericum japonicum* Thunberg)。
分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、四川、湖北、黑龍江；日本、小笠原群島、俄羅斯(遠東地區)。

350. **Tropidothrax elegans** (Distant) 紅脊長蝽 (Bu et al., 1995:131; Luo et al., 1966:56)
寄 主：檬果(花枝)。
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、河南、河北；日本。

Berytidae 跷蝽科

351. **Gampsocoris pulchellus** (Dallas) 駝跷蝽 (ASZI, 1986, 1:393; Xiao, 1992:336; Zhang, 1985:145)
別 名：*泡桐跷蝽*。
寄 主：蘋果、桃、泡桐、大豆、小麥、木芙蓉、蒲瓜。
分 佈：雲南、西藏、四川、廣西、廣東、江西、浙江、湖北、陝西、河南、山東、河北；印度北部。
附 註：亦能捕食蚜蟲、棉鈴蟲、銀紋夜蛾的幼蟲。

352. **Yemmma signatus** (Hsiao) 錘脊跷蝽 (ASZI, 1986:393; Xiao, 1992:337; Zhang, 1985:147)
寄 主：蘋果、桃、泡桐、芝麻、大豆、小麥、白菜、蘿蔔。
分 佈：江西、四川、西藏、浙江、河南、陝西、山東、河北、北京。
附 註：常與駝跷蝽混生。

Miridae 盲蝽科

353. **Adelphocoris suturalis** Jakovlev 中黑盲蝽 (Hu et Hu, 1993:128; Lu et Zheng, 1997:280; Sun, 1993:103-104)
Adelpphocoris suturalis Jakovlev, 1882:
寄 主：草莓、苕子、馬鈴薯、茄、椒、南瓜、豌豆、菜豆、玉米、大麻、洋麻、

棉(刺股葉、嫩芽、嫩果)、苜蓿、草木樨。此外還爲害錦葵科、豆科、菊科、傘形花科、十字花科、蓼科、唇形花科、大戟科 忍冬科、玄參科、石竹科、莧科、桑科、旋花科、藜科、胡麻科、紫草科等 17 科近 40 種植物。

分 佈：江西、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯。

天 敵：寄生蜂(卵)、蜘蛛、瓢蟲、草蛉、花蝽、姬蝽。

354. **Campylomma chinensis** Schuh 中國刺盲蝽 (Luo et al., 1966:56)

寄 主：橄果。

分 佈：海南。

355. **Eumecotarsus breviceps (Kerzhner)** 短頭修跗盲蝽 (Zheng et Ren, 1996:48)

Plagiognathus ? breviceps Reuter, 1878:82-84.

Eumecotarsus breviceps Kerzhner, 1962:374-325.

寄 主：水柏枝屬(*Myricaria*)、柳屬、山楂屬、十字花科植物和蔴麻的花序上。

分 佈：新疆；蒙古、中亞。

356. **Eurystylus costalis** Stål 潔綠厚盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:282)

Eurystylus costalis Stål, 1870:

寄 主：棗(花)。

分 佈：雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北；菲律賓、印尼(爪哇、蘇門答臘)、美國(關島)。

357. **Eurystylus luteus** Hsiao 灰黃厚盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:282)

Eurystylus luteus Hsiao, 1941:

寄 主：龍眼、大戟科土密屬(*Bridelia* spp.)。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、雲南、四川、浙江、安徽、湖北；朝鮮。

358. **Helopeltis antonii** Signoret 安妥角盲蝽 (Feng et al., 1989:337-338; Luo, 1991:85; Zhang, 1985:203)

別 名：*紅黑角盲蝽*。

寄 主：腰果、番石榴、可可樹、茶樹、胡椒。

分 佈：海南；印度、斯里蘭卡。

359. **Helopeltis bradyi** Waterhouse 布氏角盲蝽 (Luo et Li, 1998:75)

寄 主：腰果。

分 佈：海南。

360. **Helopeltis cinchonae** Mann. 奎寧盲蝽 (Tsai, 1965:32)

寄 主：可可樹、奎寧、茶、苧麻、木蠟樹、扶桑花、甘薯、黃枝花、野牡丹、九芎(果實)及其他約 30 種植物。

分 佈：臺灣；越南、馬來亞、爪哇、印度。

361. **Helopeltis fasciaticollis** Poppius 茶角盲蝽 (Luo, 1991:83; Tsai, 1965:32; Zhang, 1985:203)

別 名：*錘角盲蝽、茶角盲椿象、腰果角盲蝽*。

寄 主：可可樹、咖啡、柑橘、腰果、紅毛榴槤、番石榴、洋蒲桃、茶樹、奎寧、苧麻、扶桑花、黃枝花、野牡丹、木蠟樹等 20 多種植物。

分 佈：臺灣、海南、廣西；越南、馬來亞、爪哇、印度、斯里蘭卡。

362. **Helopeltis theivora** Waterhouse 腰果角盲蝽 (Luo et Li, 1998:43, 73, 80)
寄 主：腰果、番石榴、酪梨、可可(幼果)、紅毛榴槤、胡椒。
分 佈：海南、雲南。

363. **Helopeltis** sp. 角盲蝽 (Luo et Jin, 1995:86)
寄 主：酪梨、蓮霧。
分 佈：海南。

364. **Lygocoris (Apolygus) fujianensis** Wang et Zheng 福建麗盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:284)
Lygocoris (Apolygus) fujianensis Wang et Zheng, 1982:
寄 主：龍眼。
分 佈：福建、四川、湖北。

365. **Lygocoris** (s. str.) **pabulinus** (Linnaeus) 原麗盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:285)
Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761:)
寄 主：李、梨、懸鉤屬、蕁麻屬、濱藜屬、藜屬、旋花屬、楊、柳、松、雲杉、槭、山茱萸。
分 佈：四川、湖北、陝西、河北、甘肅、寧夏；朝鮮、日本、俄羅斯、菲律賓、印度、斯里蘭卡、歐洲、北美洲。

366. **Lygus lecorum** Meyer-Dur 小綠盲蝽 (Chen et al., 1993:62; Hu et Hu, 1993:128; Li et al., 1999(4):56; Niu et Chen, 1998:31; Xu et al., 1998(2):38; Zhao, 1993(3):37; Zhang, 1987[ed.] 1:115)
別 名：*綠盲蝽象*。
寄 主：柑橘、蘋果、桃、草莓、棗、棉花、木槿、馬鈴薯、茄、蕎麥、豆類、芝麻、高粱、粟、篦麻。
分 佈：江西、江蘇、山東、長江及黃河流域。

367. **Lygus pratensis** (Linnaeus) 牧草盲蝽 (ASZI, 1986, 1:400)
寄 主：蘋果、梨、桃、杏等果樹、草莓、苜蓿、棉花、豆類、水稻、小麥、白菜、蘿蔔、馬鈴薯、油菜、菠菜、麻類等。
分 佈：四川、江蘇、安徽、河南、陝西、青海、甘肅、寧夏、河北、北京、山西、內蒙古、新疆、遼寧、黑龍江等地區。

368. **Lygus saundersi** Reuter 東亞草盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:286)
Lygus saundersi Reuter, 1896:
寄 主：草莓、菊、甜菜、蒿屬、天藍苜蓿。
分 佈：四川、湖北、寧夏、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯。

369. **Paraletaba annulata** Ren et Huang 花角桂樹盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:189)
Paraletaba annulata Ren et Huang, 1987:
寄 主：柑橘樹上。
分 佈：福建、湖北。

370. **Psudoloxops guttatus** Zou 紫斑突額盲蝽 (Zou, 1987:390)
Pseudoloxops guttatus Zou, 1987:390-391.

寄 主：棗樹、桃樹。
分 佈：河南(安陽)、山東(泰山)。

371. **Tinginotum pini** Kulik 松網盲蝽 (Lu et Zheng, 1997:289)
Tinginotum pini Kulik, 1965:
寄 主：松 (*Pinus* spp.)。
分 佈：四川；朝鮮、日本、俄羅斯。

Tingidae 網蝽科

372. **Leptoypha capitata** (Jakovlov) 窄眼網蝽 (ASZI, 1986, 1:396)
寄 主：蘋果、梨、丁香。
分 佈：廣東、廣西、山西；日本、蘇聯。

373. **Monosteira unicostata** (Mulsant et Rey) 小板網蝽 (Xiao, 1992:324)
寄 主：梨、李、山楂、櫻桃、扁桃、白柳、小葉楊、箭杆楊、鈴天楊、銀白楊、群眾楊、北京楊、黑楊、新疆楊。
分 佈：甘肅、寧夏、新疆、內蒙古；蘇聯、南歐、北非。
天 敵：小灰蜘蛛(捕食越冬成蟲)
黑蟻(咬食若蟲)

374. **Stephanitis macaona** Drake 梓脊網蝽 (Luo et Jin, 1995:86; Luo et Li, 1998:80)
寄 主：酪梨、樟。
分 佈：福建、江西、廣東、海南。

375. **Stephanitis** (s. str.) **nashi** Esaki et Takeya 梨冠網蝽 (ASZI, 1986, 1:398; Bu et Chen, 1997:257; Chao, 1982:61; Chen, 1994(2):36; Chen, 1996(2):39; Chen, 1994(2):47; Chen, 1994, 11(3):177; Chen et Wang, 1987:132-133; Hsiao et al., 1981:355; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:111-113; Huang et Gao, 1996:238; Hun, 1992:280; Jiang, 1996(3):42; Li, 1993:29; NZWDI, 1981:1739; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sun, 1984:372; Wang, 1987[ed.]:268-269; Wang et al., 1993:24; Xi et al., 1989:125-126; Yu, 1995:43-44; Zhang, 1985:172; Zhang, 1987[ed.] 1:107; Zhao, 1994(2):33, 56; Zhao et al., 1997:189; Zhao et al., 1998(4):28; Zhao et al., 1999(3):18-19)
Stephanitis nashi Esaki et Takeya,
別 名：*梨網蝽*、*梨花網蝽*、*梨花網蟲*、*梨軍配蟲*。
寄 主：梨、蘋果、沙果、李、梅、杏、海棠、檳果、桃、櫻桃、山楂、榅桲、葡萄、木瓜屬(*Chaenomeles*)、棣棠花屬(*Kerria*)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、北平、遼寧。
天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama　晉草蛉
Stethoconus japonicus Schumacher　軍配盲蝽
Plexippus pykulli Audouin　白條跳蛛

376. **Stephanitis** (s. str.) **typica** (Distant) 香蕉冠網蝽 (ASZI, 1986, 1:398; Chen et al., 1984:210-212; Chien et Huang, 1965:126-134; Hsiao et al., 1981: 350; Huang, 1990[ed.] 2:292-293; Ko et Chu, 1966:163-167; Luo et Li, 1998:91; Pingtung AC., 1986:67; Tsai, 1965:32; Tsai, 1995: 42-43; Zhang, 1985:173; Zhou et Zhang, 1995:37-41)
Cadamutao typica Distant, 1903:
別 名：*香蕉花扁蟲*、*月桃軍配蟲*。
[Banana lacebug]
寄 主：香蕉、釋迦、菠蘿蜜屬 *Artocarpus*)、桑科及姜科的植物、月桃。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南；朝鮮、日本、菲律賓、巴布亞新幾內亞、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡。

天 敵：*Stethoconus* sp. 盲蝽

Myrmarachne innermichelis Bosenberg et Strand 黑蟻蛛(Salticidae)

377. **Stephanitis (Menodora) sondaica** Horváth 褐囊冠網蝽 (Hsiao et al., 1981: 350)

寄 主：芭蕉屬 (*Musa* spp.)。

分 佈：臺灣、四川。

378. **Stephanitis (Norba) suffusa** (Distant) 毛脊冠網蝽 (Hsiao et al., 1981: 345)

寄 主：酪梨屬 (*Persea*)。

分 佈：廣東、海南；印尼、緬甸、斯里蘭卡。

379. **Stephanitis** sp. 毛脊網蝽 (Luo et Jin, 1995:86)

寄 主：酪梨。

分 佈：海南。

380. **Uhlerites debilis** (Uhler) 褐角肩網蝽 (Xiao, 1992:329)

寄 主：板栗、尖齒槲櫟、短柄枹櫟、小葉櫟。

分 佈：安徽。

HOMOPTERA 同翅目

Cicadidae 蟬科

381. **Becquartina electa** Jacobi 虎斑蟬 (Chao, 1982:67; Hun., 1992:102)

別 名：*長翅斑蟬*。

寄 主：枇杷、梧桐、泡桐。

分 佈：湖南、貴州、雲南。

382. **Chremistica ochracea** Walker 赭蟬 (Chao, 1982:67)

寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

383. **Graptopsaltria tienta** Karsch 胡蟬 (Chao, 1982:67; Hun., 1992:101; Wang et Zhang, 1992:188)

Graptopsaltria tienta Karsch, 1894:57.

別 名：*噪綢蟬*。

寄 主：刺梨樹。

分 佈：福建、湖南、四川、河南、山東、河北、遼寧。

384. **Cryptotympana atrata** (Fabricius) 黑蚱蟬 (ASZI, 1986, 1:147; Chang et al., 1960:194; Chao, 1982:67; Chen et Wang, 1987:136-137; Chen et al., 1993:79; Cheng, 1959: 253-255; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang et Gao, 1996:173; Hun., 1992:98; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sung et al., 1994, 20(5):50; Wang et Zhang, 1992:121; 1992:188; Xiao, 1992:175; Xu et al., 1985:84; Yin et Yang, 1995:46; Zhang, 1987[ed.]:36; Zhong, 1999(5):24-25; Zhou, 1995(3):29)

Cryptotympana atrata (Fabricius, 1787)

=*Cryptotympana pustulata* Fabricius, 1787:266.

別 名：*蚱蟬*、*黑蚱*、*知了*。

寄 主：有 41 科 77 屬 144 種，包括蘋果、桃、李、梨、杏、櫻桃、山楂、梅、海棠、葡萄、柑橘、黃、桑、馬尾松、楊柳、櫟、刺槐、楊、楓楊、槐、相思、烏桕、苦楝、榆、懸鈴木、芙蓉、女貞、樟、竹、油桐、棉花等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東、河南、陝西、山西、河北、天津、北京、甘肅、內蒙古；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、加拿大、美國。

天 敵：成蟲：寄生菌、蜈蚣、蜘蛛、螳螂、蟻。

卵期：寄生蜂一種、瓢蟲、蟻。

若蟲：致病微生物、蜘蛛、蠼螋、螳螂、瓢蟲、蟻。

385. **Cryptotympana holsti** Distant 南蚱蟬 (Hun., 1992:98)

寄 主：刺梨樹、楊。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南。

386. **Cryptotympana mandarina** Distant 黃蚱蟬 (Hun., 1992:98; Wang et Zhang, 1992:121)

Cryptotympana mandarina Distant, 1892:86.

寄 主：柑橘、蘋果、桃、楊、柳、榆、槐等。

分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北。

387. **Huechys sanguinea** De Geer 黑翅紅蟬 (ASZI, 1986, 1:149; Chao, 1982:67, 68; Hun.,1992:104; Wang et Zhang, 1992:120; 1992:199; Zhang, 1987[ed.]:37)

Huechys sanguinea De Geer, 1773:221.

別 名：*紅蟬*，*紅娘子*，*褐翅血琦*。

寄 主：板栗、龍眼、石榴、桑、茶、油茶、苦楝、楓楊、刺槐、柞等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西；馬來西亞、印度、婆羅洲、印尼、愛琴海群島。

388. **Huechys sanguinea** var. **philaemata** Fabricius 齒黑蟬 (Tsai, 1965:33)

寄 主：番石榴、倒卵葉饅頭果、紫薇。

分 佈：臺灣、中國大陸；緬甸。

389. **Meimuna mongolica** (Distant) 蒙古寒蟬 (ASZI, 1986, 1:148; Chao, 1982:67; Xu et al., 1995:84; Zhang, 1987[ed.]:37)

寄 主：桑、槐、洋槐、白楊、柳、楓、合歡、油桐。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、河北。

390. **Meimuna opalifera** (Walker) 松寒蟬 (ASZI, 1986, 1:149; Chao, 1982:67; Hun., 1992:100; Xu et al., 1995:84)

Dundubia opalifera Walker, 1850:56.

寄 主：松、梧桐、柳、楊、果樹及森林樹木。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、浙江、山東、河北。

391. **Meimuna uraina** Kato 半腹寒蟬 (Zhang, 1987[ed.]:37)

寄 主：桃樹。

分 佈：江西。

392. **Mogannia hebes** Walker 草蟬 (ASZI, 1986, 1:149; Chao, 1982:68; Hun., 1992:103; Tsai, 1965:33; Wang et Zhang, 1992:121; 1992:190; Xu et al., 1995:85; Zhang, 1987[ed.]:37)

Mogannia hebes Walker, 1858:38.
別 名：*綠草蟬*、*茶扎*、*草蜩*、*茅蜩*、*草春蟬*。
寄 主：柑橘、柿、桑、甘蔗、水稻、黃豆、菜豆、茶、樟、擦、竹類及其他禾本科植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、內蒙古；朝鮮、日本。

393. **Oncotympana maculaticollis** (Motschulsky) 蛁蟟 (ASZI, 1986, 1:148; Chen et Wang, 1987:137; Hun., 1992:103; Wang et Zhang, 1992:121; 1992:189; Xu et al., 1995:85)
別 名：*鳴蟬*、*蛋鳴蟬*。
寄 主：蘋果、桃、李、梨、柑橘、核桃、柳、泡桐等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅；朝鮮、日本。

394. **Platypleura hilpa** Walker 黃花蛄蟬 (Wang et Zhang, 1992:119)
寄 主：蘋果、核桃、柿、桑、闊葉樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、四川、安徽、湖北；日本。

395. **Platypleura kaempferi** Fabricius 蟪蛄 (ASZI, 1986, 1:147; Chao, 1982:68; Chen et Wang, 1987:137; Hun., 1992:97; Wang et Zhan, 1992:119; Xu et a., 1995:84; Zhang, 1987[ed.]:38)
Platypleura kaempferi Fabricius, 1794:23.
別 名：*花蟬*、*南方蛄蟬*。
寄 主：蘋果、梨、梅、桃、李、核桃、柿、柑橘、桑、茶、松等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北；朝鮮、日本。

396. **Platypleura hilpa** Walker 黃蟪蛄 (Hun., 1992:97)
Platypleura hilpa Walker, 1850.
寄 主：柑橘、蘋果、梨、槐樹等。
分 佈：湖南、華南地區。

397. **Platypleura nobilis** (Gemar) 雅花蛄蟬 (Wang et Zhang, 1992:119)
寄 主：桑、鼠李、楝、榆、椴、梧桐、山毛櫸等。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、浙江、湖北；印度、印尼。

398. **Platyleura takasagona** Matsumura 高砂蟬 (Tsai, 1965:33)
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣。

399. **Pomponia fusca** (Oliver) 夏至蛄蟬 (Wang et Zhang, 1992:120; 1992:189; Zhang, 1987[ed.]:38; Zhao et al., 1997:190)
Pomponia fusca (Oliver, 1790:)
別 名：*橘蜩*。
寄 主：榛、柑橘、常綠林中。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、爪哇。

400. **Pomponia linearis** (Walker) 蠟蟬 (Hun., 1992:100)
寄 主：柑橘、雜灌木。
分 佈：湖南、貴州。

401. **Rihana ochracea** (Walker) 羽衣蟬 (Tsai, 1965:33; Wang et Zhang, 1992:188)
Rihana ochracea (Walker, 1850:)
別 名：*赭蟬*。
寄 主：柑橘、桑、相思樹。
分 佈：臺灣、雲南。

402. **Scieroptera splendidula** (Fabricius) 暗翅蟬 (Hun., 1992:104)
寄 主：板栗、樸類。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、四川、貴州。

403. **Suisha coreana** (Matsumura) 蟌蛄蟬 (Wang et Zhang, 1992:119)
寄 主：蘋果、梨、桃、柿、楊、柳、榆、槐等。
分 佈：湖南、湖北、河南、河北；日本。

Cercopidae 泡沫蟬科

404. **Clovia conifer** (Walker) 條紋柯泡沫蟬 (ASZI, 1986, 1:157; Yuan et al., 1992:235)
Clovia conifer (Walker, 1851:)
別 名：*錐形縫頭沫蟬*。
寄 主：咖啡、桑、紅桑、水稻、玉米、蓖麻。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、陝西、甘肅、黑龍江；菲律賓、馬來半島、新加坡、緬甸、印度。

405. **Cosmoscarta bispecularis** White 斑帶麗泡沫蟬 (ASZI, 1986, 1:155; Chao, 1982:69; Hun., 1992: 109; Liang, 1995:110; Luo et Jin, 1995:85; Zhang, 1987[ed.]:40; Zhao et al., 1997:189)
Cosmoscarta bispecularis White, 1844:
別 名：*桃沫蟬*、*桑黑斑沫蟬*。
寄 主：銀杏、桑、桃、榛、酪梨、栗、咖啡、茶、油茶、白玉蘭、滇楸、刺楸、三葉橡膠、鹽膚木、泡桐、紅椎、相思、楓香、火炬松、落羽杉、杉木、向日葵、苧麻、小赤麻、冷水花。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽；日本、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、錫金。

406. **Cosmoscarta dorsimacula** (Walker) 黑斑麗泡沫蟬 (ASZI, 1986, 1:155; Hun., 1992:108; Liang, 1992:128; 1997:315; Yuan et al., 1992:223; Yunn., 1987:300)
Cosmoscarta dorsimacula (Walker, 1851:)
別 名：*背斑隆沫蟬*。
寄 主：核桃、野葡萄、菊芋、艾。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、孟加拉、錫金、尼泊爾、印尼。

407. **Cosmoscarta exultans** (Walker) 紅基隆泡沫蟬 (ASZI, 1986, 1:156; Hun., 1992:108, Liang, 1992:128;

1995:103; Yuan et al., 1992:224)
Cosmoscarta exultans (Walker, 1858:)
別 名：*黑胸鼯沫蟬*，*紫胸鼯沫蟬*。
寄 主：核桃、無患子、玉米、向日葵。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北。

408. **Cosmoscarta mandarina** Distant 中國隆泡沫蟬 (Hun., 1992:109; Liang, 1992:128; 1997:316; Yunn., 1987:301; Zhang, 1987[ed.]:40)
別 名：*橘紅鼯沫蟬*。
寄 主：杏、刺梨、五角楓、箭竹、洋薑、玉米。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北；越南。

409. **Jembra pallida** Metcalf et Horton 淡白三脊沫蟬 (Liang, 1995:102; 1997:314)
Jembra pallida Metcalf et Horton, 1934:
寄 主：柑橘、茶、馬尾松。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西。

410. **Phymatostetha dorsivitta** (Walker) 紅背腫泡沫蟬 (Hun., 1992:109; Yuan et al., 1992:220)
Phymatostetha dorsivitta (Walker, 1851:)
寄 主：松樹、雜灌木。
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、陝西；印度、北部灣。

411. **Pleuceptyelus lacteisparsus** Jacobi 卵沫蟬 (Liang, 1995:102)
Pleuceptyelus lacteisparsus Jacobi, 1944:
寄 主：松。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、浙江。

Aphrophoridae 尖胸沫蟬科

412. **Aphrophora auracopilosa** Matsumura 歐納泡沫蟬 (Tsai, 1965:33)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

413. **Aphrophora costalis** Matsumura 柳尖胸沫蟬 (Xiao, 1992:172)
寄 主：蘋果、柳、小葉楊、榆、沙棘、紫花苜蓿、鵝冠草、菌陳蒿、硬質早熟禾等。
分 佈：青海、甘肅、陝西、河北、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

414. **Aphrophora flavipes** Uhler 松沫蟬 (Liu, 1982[ed.]:261-262; Xiao, 1992:173)
寄 主：赤松、油松、黑松、落葉松。
分 佈：山東、華東、河北、華北、遼寧、東北；朝鮮、日本。

415. **Aphrophora intermedia** Uhler 白帶尖胸泡沫蟬 (ASZI, 1986, 1:156; Hun., 1992:110; Yuan et al.,

1992:234)
寄 主：蘋果、桃、梨、櫻桃、棗、葡萄、桑、楊樹、柳、榆、柞樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、湖北、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、內蒙古(滿洲里)、黑龍江；朝鮮、日本。

416. **Aphrophora tsuruana** Matsumura 落葉松尖胸沫蟬 (Liang, 1992:127)
寄 主：落葉松。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、湖北。

417. **Trigophora obliqua** (Uhler) 小白帶三角沫蟬 (Yuan et al., 1992:241)
Trigophora obliqua (Uhler 1896:)
寄 主：蘋果、梨、桑、柳、榆、樟。
分 佈：陝西、山西、吉林；日本。

Machaerotidae 巢沫蟬

418. **Taihorina geisha** Schumacher 板栗巢沫蟬 (Chou et Zhong, 1986:16-18; Maa, 1963:38)
Taihorina geisha Schumacher, 1915:85.
=*Makiptyelus fasciatus* Kato, 1928:35.
=*Neuromachaerota becquarti* Liu, 1942:5.
=*Taihorina tomon* Matsumura, 1942:82.
=*Hindola robusta* Jacobi, 1944:24.
=*Aphromachaerota adusta* Lallemand, 1951:84.
寄 主：板栗、(*Quercus dentata* Thunb., *Quercus glauca* Thunb.)。
分 佈：臺灣、福建、貴州、浙江、江蘇、安徽、遼寧、吉林；朝鮮、越南、新幾內亞。

Membracidae 角蟬科

419. **Centrotyphus flexuosus** (Fabricius) 扭巨刺角蟬 (Yunn., 1987:291)
寄 主：橡果。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

420. **Elaphiceps cerrus** Buckton 鹿角蟬 (ASZI, 1986, 1:154; Yunn., 1987:294)
寄 主：板栗、雲南栲。
分 佈：臺灣、福 建、廣東、雲南。

421. **Gargara davidi** Pallas 角蟬 (Zhang, 1987[ed.]:39)
寄 主：柑橘、葡萄、烏桕。
分 佈：江西。

422. **Gargara genistae** (Fabricius) 黑圓角蟬 (ASZI, 1986, 1:150; Hun., 1992:106; Xu et al., 1995:85)
別 名：*桑拂角蟬*。
寄 主：桑、柿、柑橘、葡萄、烏桕、刺槐、國槐、毛栗、楓香、酸棗、枸杞、苜蓿、大豆、三葉錦雞兒、沙打旺、大麻、黃蒿。
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、陝西、山西、山東、寧夏；日本、歐洲、美國。

423. **Hypsauchenia hardwickii** Kirby 褐翅高冠角蟬 (Chou et Yuan, 1981:48; Yunn., 1987:290)
寄 主：檬果。
分 佈：海南、廣西、雲南、福建；印度、尼泊爾、錫金。

424. **Jingkara hyulipunctata** Chou 犀角蟬 (Hun., 1992:106; Yuan et Li, 1992:124)
寄 主：板栗、刺槐、泡桐、白樺、苦楮。
分 佈：江西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、陝西。

425. **Kotogargara parbula** (Lindberg) 微卡圓角蟬 (Yuan et al., 1997:305)
Kotogargara parbula (Lindberg, 1972:)
寄 主：胡頹子、狼牙刺、蕎花。
分 佈：福建、湖南、雲南、湖北、河南、陝西、山西、河北、黑龍江；俄羅斯(遠東地區)、越南。

426. **Leptobelus gazella** Fairmaire 羚羊矛角蟬 (Yuan et Li, 1992:125; Yuan et al., 1992:210; Yunn., 1987: 293)
Leptobelus gazella Fairmaire, 1846:
寄 主：蘋果、栗、冬瓜木、艾。
分 佈：臺灣、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；印度、錫金。

427. **Leptocentrus albolineatus** Funkhouser 白紋弧角蟬 (ASZI, 1986, 1:153; Luo et al., 1996:53; Yunn., 1987:295)
別 名：*白條弧角蟬*。
寄 主：檬果、可可、咖啡、紅桑、胡椒、余甘子(滇橄欖)、黃槿。
分 佈：海南、廣西、雲南、貴州、湖南。

428. **Leptocentrus vicarius** Stål 三刺角蟬 (Luo, 1991:84; Luo et al., 1996:85)
寄 主：腰果(葉)、蓮霧。
分 佈：海南。

429. **Machaerotypus camelliae** Chou et Yuan 茶花紅脊角蟬 (ASZI, 1986, 1:151; Yuan et al., 1992:193; Yunn., 1987: 293)
寄 主：蘋果、柿、板栗、雲南松、雲南茶花、杜鵑花。
分 佈：雲南。

430. **Machaerotypus mali** Chou et Yuan 蘋果紅脊角蟬 (ASZI, 1986, 1:151)
別 名：*蘋果細脊角蟬*。
寄 主：蘋果、杏、核桃、柳、花椒。
分 佈：陝西。

431. **Maurya nodosa** Funkhouser 瘤耳角蟬 (Yunn., 1987:289)
Maurya nodosa Funkhouser, 1940:145.
別 名：*瘤脈耳角蟬*。
寄 主：山楂、核桃、華山松。
分 佈：雲南、湖北、陝西、甘肅、山東、北京、遼寧、黑龍江。

432. **Maurya qinlingensis** Yuan 秦嶺耳角蟬 (Yuan, 1988:260)
Maurya qinlingensis Yuan, 1988:260.

寄 主：胡頹子(*Elaeagnus* sp.)、落葉松(*Larix gmelinii* (Rupr.) Litvin)。
分 佈：四川、陝西、甘肅、遼寧。

433. **Maurya rotundidenticula** Yuan 圓齒耳角蟬 (Yuan, 1988:263)
Maurya rotundidenticula Yuan, 1988:263.
寄 主：蘋果。
分 佈：陝西。

434. **Pantaleon dorsalis** (Matsumura) 背綠鋸角蟬 (Yuan & Chou, 1983; Yuan et al., 1992:193; Yuan., 1987:289;)
Centkrotus dorsalis Matsumura, 1912:18.
=*Pantaleon brunneus* Funkhouser, 1921:45-47.
寄 主：蘋果、茅莓(*Rubus parvifolius*)。
分 佈：臺灣、福建、江西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、陝西、湖北、河北。

Fulgoridae 蠟蟬科

435. **Fulgora candelaria** (Linnaeus) 龍眼雞 (Chao, 1982:76; Huang, 1990[ed.] 2:301; Huang et Gao, 1996:216, Hun., 1992:111; Luo et al., 1996:54; Zhang, 1987[ed.]:50)
寄 主：龍眼、荔枝、橡果、橄欖、柑橘、桑、臭椿、烏桕。
分 佈：金門、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川；印度、錫金。

436. **Lycorma delicatula** (White) 斑衣蠟蟬 (Chen et Wang, 1987:182; Chen et al., 1993:72; Huang, 1990[ed.] 2:365-366; Huang et Wang, 1992:318; Hun., 1992:112; Luo et al., 1996:54; Xiao, 1992:169; Zhang, 1987[ed.]:50)
寄 主：核桃、棗、葡萄、蘋果、梨、杏、李、桃、櫻桃、珍珠梅、海棠、橡果、向日葵、扁豆、臭椿、香椿、楊、苦楝、槐樹、梧桐、柳、女貞、油茶、刺槐、榆、竹、懸鈴木、漆樹、黃楊、泡桐、楓、櫟、化香、合歡等多種植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、陝西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京、東北；日本、越南、印度。
天 敵：*Anastatus japonicus* Ashmead 舞毒蛾卵平腹小蜂(卵)
Dryinus sp. 斑衣蠟蟬螯蜂(若蟲)

437. **Pyrops chinensis** Distant 中華鼻蠟蟬 (Yunn., 1987:283)
寄 主：椰子、大豆。
分 佈：廣東；雲南、四川、貴州。

438. **Saiva** sp. 錐頭蠟蟬 (Luo et Jin, 1995:85)
寄 主：酪梨。
分 佈：海南。

439. **Zanna chinensis** Distant 中華鼻蠟蟬 (Huang et Wang, 1992:3118)
Zanna chinensis Distant, 1893:
寄 主：椰子、大豆。
分 佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川；緬甸、印度。

Dictyopharidae 象蠟蟬科

440. **Dictyophara sinica** Walker 中華象蠟蟬 (Liang, 1995:105; Zhang, 1987[ed.]:55; Zhao et al., 1997:190)

寄 主：柑橘、榛、桑、水稻、玉米、高粱、甘蔗、大豆、粟、茭白、芋、甘薯、蕹菜、泡桐。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、四川、浙江、陝西；朝鮮、日本、泰國、印度、印尼。

441. **Dictyophara patruelis** (Stål) 象蠟蟬 (Chao, 1982:77; Liang, 1997:322; Zhao et al., 1997:190)

Dictyophara patruelis (Stål, 1859:)

別 名：*伯瑞象蠟蟬*。

寄 主：水稻、甘藷、榛、蘋果。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、東北；日本、馬來西亞。

442. **Orthonahophagus splendens** (Germar) 麗象蠟蟬 (Hun., 1992:112; Liang, 1995:10)

寄 主：桃、李、桑、柑橘、水稻、甘蔗等禾本科植物。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇、湖北、東北地區；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

443. **Udugama splendens** Germar 華麗長頭蠟蟬 (Zhang, 1987[ed.]:56)

寄 主：柑橘、桑、稻、甘蔗。

分 佈：江西。

Achilidae 額蠟蟬科

444. **Deferunda stigmatica** Distant 德額蠟蟬 (Wang, 218)

Deferunda sigmatica Distant, 1912:

寄 主：咖啡。

分 佈：廣東；孟加拉。

Flatidae 蛾蠟蟬科

445. **Atracis himalayana** Distant 喜馬菜蛾蠟蟬 (Luo et Jin, 1995:85)

寄 主：酪梨。

分 佈：海南。

446. **Geisha distinctissima** (Walker) 碧蛾蠟蟬 (Chao, 1982:80; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hun., 1992:113; Liang, 1995:105; Liang, 1997:321; Luo, 1991:85; Luo et Jin, 1995:85; 1997:74; Luo et al., 1996:53; Tsai, 1965:41; Zhang, 1985[ed.]:176-177; Zhang, 1987[ed.]: 52)

Geisha distinctissima (Walker, 1858:)

別 名：*青翅羽衣*、*青翅蛾蟬*。

寄 主：柑橘、蘋果、沙果、梨、桃、李、杏、梅、柿、葡萄、龍眼、橄果、蓮霧、楊梅、刺棗、酪梨、板栗、無花果、腰果、波羅蜜、桑、茶、西洋參、向日葵、油茶、烏桕、榆、樟、樸、楓香、白蠟樹、水稻、甘蔗、花生、菊等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、東北地區；日本。

447. **Lawana imitata** Melichar 紫絡蛾蠟蟬 (Chao, 1982:80; Huang, 1990[ed.] 2:220-221; Huang et Gao, 1996:174;

Hun., 1992:113; Luo, 1991:85; Luo et Jin, 1997:74; Luo et Li, 1998:48; Luo et al., 1996:53; NZWDI, 1981:1879; Yunn., 1987:284; Zhan, 1997, 20(4):25)

別 名：*玉翅蛾蟬*，*白蛾蠟蟬*，*青翅羽衣*，*可可白蛾蠟蟬*。

寄 主：柑橘、橙、黃皮、龍眼、荔枝、檬果、菠蘿蜜、人面果、蒲桃、番石榴、梨、梅、李、桃、無花果、咖啡、可可、腰果、澳洲核桃、茶、胡椒、木豆、豬尿豆、田青、棵麻、木麻黃、銀樺、米仔蘭等。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州；日本。

448. **Salurnis marginellus** (Guerin) 綠緣蠟蟬 (Chao, 1982:81; Huang et Gao, 1996:175; Hun., 1992:114; Liang, 1997:321; Zhang, 1987[ed.]:52)

Salurnis marginellus (Guerin, 1830:)

別 名：*青緣蠟蟬*。

寄 主：柑橘、刺梨、咖啡、茶、油茶、迎春花、女貞、喜樹、木荷、榆。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；馬來西亞、印度、錫金、印尼。

Ricanidae 廣翅蠟蟬科

449. **Euricania clara** Kato 透明疏廣翅蠟蟬 (Hun., 1992:115)

寄 主：桑、枸杞、刺槐、皂王刺、樸類。

分 佈：江西、湖南、貴州、四川、陝西；日本。

450. **Euricania fascialis** Walker 帶紋廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:82; Chou & Lu, 1977:315; Zhang, 1987[ed.]:50)

寄 主：柑橘、桑、茶、水稻、洋槐。

分 佈：福建、江西、廣東、貴州、浙江、江蘇、上海、南京。

451. **Euricania ocellus** Walker 眼紋廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:81; Chou & Lu, 1977:315; Liang, 1997:320; Zhang, 1987[ed.]:50; Zhao et al., 1997:190)

寄 主：榛、柑橘、桑、茶、洋槐、油茶、油桐、蓖麻。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河北；日本、越南、緬甸、印度、錫金。

452. **Flatoides fascialis** Melicher 帶紋廣翅蠟蟬 (Zhao et al., 1997:190)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

453. **Geisha distinctissima** Walker 碧蛾蠟蟬 (Huang et Gao, 1996:175; Yunn., 1987:284)

寄 主：柑橘、蘋果、梨、杏、桃、李、梅、榲桲、龍眼、楊梅、無花果、葡萄、桑、茶、油茶、向日葵、花生、甘蔗、棉。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、陝西、浙江、江蘇、山東、東北；日本。

454. **Pochazia discreta** Melichar 眼斑廣翅蠟蟬 (Liang, 1995:105; Luo et al., 1996:86)

寄 主：蓮霧、鈎藤。

分 佈：海南、廣東、浙江。

455. **Pochazia guttifera** Walker 圓眼寬廣蠟蟬 (Luo et Jin, 1995:85; Luo et al., 1996:54)

寄 主：酪梨、檬果。
分 佈：海南。

456. **Pochazia zizzata** Chou et Lu 電光廣翅蠟蟬 (Chou & Lu, 1977:316; Huang et Wang, 1992:318)
Pochaxia zizzata Chou et Lu, 1977:316.
寄 主：桑。
分 佈：四川、甘肅。

457. **Ricania cacaonis** Chou et Lu 可可廣翅蠟蟬 (Chou & Lu, 1977:315)
Ricania cacaonis Chou et Lu, 1977:315, 317.
寄 主：可可、酪梨。
分 佈：海南。

458. **Ricania japonica** Melichar 琥珀廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:81; Chou & Lu, 1977:315; Zhang, 1987[ed.]:51)
寄 主：蘋果、梨、柑橘、桑、茶、油茶、苧麻、月季花、豆科及禾本科作物。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江、東北；日本。

459. **Ricania marginalis** Walker 緣紋廣翅蠟蟬 (Chou & Lu, 1977:315)
寄 主：桃、咖啡、油茶。
分 佈：廣東、浙江、湖北。

460. **Ricania pulverosa** Stål 粉黛廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:81; Chou & Lu, 1977:315; Hun., 1992:115)
寄 主：柑橘、可可、咖啡、油梨、女貞、白蠟樹、野牡丹、禾本本科雜草。
分 佈：臺灣、福建、廣東、貴州、湖南、浙江。

461. **Ricania shantungensis** Chou et Lu 山東廣蠟蟬 (Cao et Peng, 1993:23; Chou & Lu, 1977:315)
Ricania shantungensis Chou et Lu, 1077:315, 317.
寄 主：柿、山楂。
分 佈：山東。

462. **Ricania simulans** Walker 鉤紋廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:81; Chou & Lu, 1977:315; Zhang, 1987[ed.]:51; Zhao et al., 1997:190)
Ricania simulans Walker,
=*Ricania episcopus* Walker,
=*Ricania episcopalis* Stål,
寄 主：蘋果、梨、榛、桃、柑橘、桑、茶、苧麻。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、浙江、山東、黑龍江。

463. **Ricania speculum** (Walker) 八點廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:82; Chen, 1981:49; Chen et al., 1993:72; Chou & Lu, 1977:314; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang et Gao, 1996:177; Huang et Wang, 1992:317; Hun.,1992:115; Liang, 1997:320; Luo, 1991:85; Luo et al., 1996:54; Yunn., 1987:284; Zhang, 1987[ed.]:51)
Ricania speculum (Walker, 1851:)
=*Flatoides tenebrosus* Walker,
別 名：*八點蠟蟬*。
寄 主：蘋果、沙果、梨、桃、李、杏、梅、櫻桃、山楂、柑橘、檬果、蓮霧、棗、柿、板栗、腰果、桑、咖啡、可可、茶、油茶、大豆、向日葵、棉、苧麻、黃麻、玫瑰、迎春花、臘梅、桂、樟、油桐、楊、柳、女貞、榆、刺槐、苦楝、烏桕。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山西；菲律賓、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

464. **Ricania sublimbata** Jacobi 柿廣翅蠟蟬 (Chao, 1982:82; Chou & Lu, 1977:315; Hun., 1992:115; Luo et Jin, 1995:85; Luo et al., 1996:54; Xu et Zhong, 1988:93-95; Ying, 1999(6):18; Zhang, 1987[ed.]:51; Zhang et Tian, 1999(2):20;)

寄 主：柿、山楂、榛、柑橘、橡果、酪梨、咖啡、油橄欖、女貞、黃楊、樟樹、梔子。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、湖北、山東、黑龍江。

天 敵：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉
Chrysopa shansiensis Kuwayama 晉草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephen) 中華草蛉
Orius similis Zheng 小花蝽
Sirthenea sp. 獵蝽
Chlaenius sp. 步甲
Leis axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Aranea ejusmodi 大腹圓蛛
Neoscona doenitzi 黃褐新圓蛛
Theridion octomaculatum Boes. et Str. 八斑球腹蛛
Misumenops tricuspidaus (Fabricius) 三突花蛛
Plxippus paykulli 黑色蠅虎

465. **Ricania taeniata** Stål 褐帶廣翅蠟蟬 (Chou & Lu, 1977:315; Zhang, 1987[ed.]:51)

寄 主：柑橘、水稻、玉米、甘蔗、禾本科雜草、油桐、野桐。

分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西。

466. **Ricania** sp. 柑橘廣翅蠟蟬 (Huang et Gao, 1996:176; Wang, 1993, 19(3):12-13)

寄 主：柑橘。

分 佈：福建、廣西。

467. **Salurnis margmellus** (Guerin) 青銹蠟蟬 (Zhao et al., 1997:190)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

468. **Seliza ferruginea** Walker 銹澀銳蠟蟬 (Yuan., 1987:285)

寄 主：咖啡、腰果、山楂。

分 佈：雲南、四川、貴州、廣東、湖南；印度。

Issidae 圓蠟蟬科

469. **Gergithus variabilis** Bulter 圓蠟蟬 (Tsai, 1965:40)

寄 主：梨、柿、臺灣蘋果。

分 佈：臺灣；日本。

470. **Tonga fusiformis** Walker 寬圓蠟蟬 (Tsai, 1965:41)

寄 主：桑。

分 佈：臺灣、中國大陸；印度。

Derbidae 袖蠟蟬科

471. **Diostrombus politus** Uhler 紅袖蠟蟬 (Chao, 1982:76; Hun., 1992:116)
寄 主：柑橘、柚子。
分 佈：臺灣、福建、雲南、貴州、湖南、湖北、浙江、安徽及東北地區。

Delphacidae 草蠟蟬科

472. **Oser dimidiata** Motschulsky 裂蠟蟬 (Tsai, 1965:39)
寄 主：柑橘、桑。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本。

Cixiidae 菱蠟蟬科

473. **Oliarus apicalis** Uhler 黑頭菱蠟蟬 (Zhang, 1987[ed.]:55)
寄 主：桑、水稻、玉米、高粱、粟、茭白、甘蔗。
分 佈：江西。

Tropiduchidae 扁蠟蟬科

474. **Mesepora** sp. 扁蠟蟬 (Luo et Jin, 1995:85)
寄 主：酪梨。
分 佈：海南。

475. **Tambinia debilis** Stål 軟扁蠟蟬 (Chen, 1981:48; Tsai, 1965:40)
寄 主：柑橘、蓮霧、桑、咖啡、可可樹、茶、樟、蓖麻、棉、茄子、釜瓜、水黃皮。
分 佈：臺灣、華南；日本、馬來亞、印度、斯里蘭卡。

Cicadellidae 葉蟬科

476. **Agnesiella juglandis** Chou et Ma 核桃帶小葉蟬 (Ge, 1992:303; Zhang, 1990:155)
Agnesiella juglandis Chou et Ma, 1981:198.
寄 主：核桃。
分 佈：雲南、陝西。

477. **Aguriahana juglandis** Chou et Ma 核桃亞小葉蟬 (Zhang, 1990:146)
Aguriahana juglandis Chou et Ma, 1981:203.
寄 主：核桃樹。
分 佈：陝西。

478. **Aguriahana dissimilis** Chou et Ma 核桃異亞小葉蟬 (Zhang, 1990:146)
Agyrihana dissimilis Chou et Ma, 1981:202.
寄 主：核桃樹。
分 佈：福建、湖南、陝西。

479. **Aguriahana triangularis** (Matsumura) 三角葉蟬 (Cai et lic. 1995:98; Chiang, 1989:137; Zhang, 1990:145)
Eupteryx triangularis Matsumura, 1932:94.
=*Eupteryx u-nigrum* Matsumura, 1932:94-95.
Aguriahana triangularis, Dworakowska, 1972:291.
別 名：*三角事小葉蟬*。
寄 主：梨、蘋果、刺梨、草莓、柿樹、薔薇、臺灣赤楊(*Alnus formosana* (Burk.) Makino)、山櫻花(*Prunus campanulata* Maxim.)。
分 佈：臺灣、湖南、陝西；朝鮮、日本、越南。

480. **Alebra pallida** Dworakowska 淡色眼小葉蟬 (Zhang, 1990:123)
Alebra pallida Dworakowska, 1968:565.
寄 主：蘋果、櫻樹。
分 佈：陝西；朝鮮。

481. **Amrasca biguttula** (Ishida) 棉葉蟬 (ASZI, 1986, 1:168; Chao, 1982:71; Chiang, 1989:42; Fang, 1992:356; Hun., 1992:123; Yang, 1996:81; Zhang, 1990:131; Zhang, 1987[ed.]:44; Zhao, 1994(4):46; Zhao et al., 1996(3):43)
Chlorita biguttula Ishida, 1913:1.
=*Zygina punctata* Melichar, 1914:146.
=*Empoasca bipunctata* Schumacher, 1915:127.
=*Chlorita bimaculata* Matsumura, 1917:393.
=*Empoasca devastans* Distant, 1918:93.
=*Empoasca nigropunctata* Merino, 1936:52.
=*Typhlocyba uniguttata* Jacobi, 1941:311.
=*Empoasca quatrinotatissima* Dlabola, 1957:296.
=*Empoasca biguttula*, Koh, 1966:96.
Amrasca biguttula biguttula Ishida, Ghauri, 1967:
=*Empoasca schumacheri* Metcalf, 1968:353.
=*Sundapteryx biguttula* Ishida, Dworakowska, 1972:712.
Amrasca biguttula, Dworakowska et Viraktamath, 1975:530.
別 名：*葡萄小葉蟬*。
寄 主：葡萄、桃、梨、柑橘、桑、茶、棉花、木棉、木芙蓉、錦葵、扶桑花、玉米、粟、花生、大豆、甘藷、馬鈴薯、蕎麥、茄、番茄、甜椒、豌豆、綠豆、紅花草、甘薯、蔬菜、南瓜、芥菜、蘿蔔、蜀葵、瓜類、芝麻、菊、向日葵、煙草、苧麻、梧桐、柳、油桐、蓖麻、黃麻、鐘麻、泰國麻、泡桐、樟、烏桕。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、安徽、浙江、江蘇、山東、河南、陝西、新疆、東北地區、南北各省區；日本、印度、印尼。

482. **Amrasca splendens** Ghauri 麗櫻果葉蟬 (Zhang, 1990:132; Zhang & Chou, 1988:45)
Amrasca splendens Ghauri, 1967:161.
寄 主：檬果。
分 佈：海南；印度、孟加拉。

483. **Arboridia apicalis** (Nawa) 葡萄斑葉蟬 (ASZI, 1986, 1:173; Chiang, 1989:73)
Zygina apicalis Nawa, 1913:480.
=*Erythroneura sandagouensis* Vilbaste, 1968:108.
Arboridia apicalis, Dworakowska, 1970:607.
寄 主：葡萄、櫻桃、山楂、梨、梅、桃、蘋果、桑、槭等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河南、陝西、

河北、遼寧、吉林。

484. **Atkinsoniella sulphurata** (Distant) 條翅大葉蟬 (Hun., 1992:118, Xu et al., 1995:89; Yunn., 1987:272; Zhang, 1990:29)
Tettigoniella sulphurata Distant,1908:216.
=*Atkinsoniella maculata* Distant, 1908:236.
=*Bhandara tetraspila* Jacobi, 1944:41.
Atkinsoniella sulphurata, Young, 1986:97.
別 名：*雕安大葉蟬*，*黃色條大葉蟬*。
寄 主：核桃、闊葉樹、草本植物。
分 佈：福建、湖南、貴州、雲南；印尼、緬甸、印度。

485. **Bothrogonia ferruginata** (Fabricius) 黑尾大葉蟬 (AS23, 1986, 1:178; Hun., 1992:117; Liang et al., 1997:333; Luo, 1991:84)
Bothrogonia ferruginata (Fabricius, 1787:)
=*Cicadella ferruginea* China,
寄 主：葡萄、柑橘、梨、蘋果、桃、枇杷、棗、桑、腰果、馬尾松、甘蔗、高粱、玉米、甘薯、茶、油茶、奎寧樹、月季、大豆、向日葵、竹、泡桐、油桐。
分 佈：臺灣、廣東、海南、貴州、雲南、四川、江西、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇、山東、遼寧、東北地區，廣分佈，但以長江以南較多；朝鮮、日本、菲律賓、越南、寮國、印尼、緬甸、印度、非洲(南部)。

486. **Bosthrogonia (Boehrogonia) sinica** Yang et Li 華凹大葉蟬 (Hun., 1992:132; Xu et al., 1995:89; Zhang, 1990:22; Zhang, 1987[ed.]:42)
Bothrogonia sinica Yang et Li, 1980:193.
寄 主：蘋果、枇杷、柑橘、葡萄、茶、油茶、玉米、高粱、甘薯、向日葵、甘蔗、菊芋、大豆、豆角、柳樹、楊樹、鹽膚木、梧桐、竹、油桐。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、浙江、湖北、陝西。

487. **Bythoscopus dorsalis** (Matsumura) 褐盾短頭葉蟬 (Hun., 1992:123)
寄 主：栗、柳樹、櫟樹、榆及槲等。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西；日本。

488. **Bythosonus chlorophana** (Melichar) 黃綠短頭葉蟬 (Zhang, 1987[ed.]:47)
寄 主：板栗、茶、水稻、苦楝。
分 佈：江西。

489. **Cicadella fasciifrons** (Stål) 二點葉蟬 (Hun., 1992:127)
寄 主：蘋果、茶樹、稻、麥、棉。
分 佈：福建、江西、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、山東、河南、寧夏。

490. **Cicadella ferruginea** (Fabricius) 黑尾大葉蟬 (Yang, 1965:196)
Cicadella ferruginea (Fabricius, 1794)
=*Cicadella ferruginea apicalis* (Walker, 1851:)
寄 主：蘋果。
分 佈：中國(陝西?)。

491. **Cicadella viridis** (Linnaeus) 大青葉蟬 (Beijing FC., 1980[ed.]:207-208; Chen et Jian, 1996:44; Chen et Wang, 1987:68-69; Chen et al., 1993:63; Ge, 1992:275; Heilongjiang Mudingjiang PS., 1988[ed.]:254-255; Hu et Hu, 1993:128; Huang,

1990[ed.] 2:29-30; Hun., 1992:118; Li, 1993:32; Liang et al., 1997:330; Liu, 1982[ed.]:262; Liu, 1995(3):41; NZWDI, 1981:1713; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sun, 1984:384-388; Suzhou CS., 1985:225-226; Tang, 1994(2):30; Tsai, 1965:34; Xiao,1992:180; Wang et Wang, 1993:8-10; Wang et al., 1997:22-23; Wu et al., 1998(4):25; Xu et al., 1995:89; Yang, 1965:196; Zhang, 1987[ed.]:43; Zhang, 1990:24; Zhang, 1993:36; Zhang, 1995(5):51; Zhang, 1997(3):41-42; Zhang et Zhang, 1992:130; Zheng, 1982:225-226)

Cicada viridis Linnaeus, 1758:438.

=*Tettigoniella viridis*

別 名：*大浮塵子*，*青葉蟬*，*青葉跳蟬*，*大綠葉蟬子*。

寄 主：蘋果、梨、李、桃、杏、草莓、柑橘、葡萄、核桃、棗、沙棗、桑、茶、油茶、楊、柳、刺槐、槐、榆、臭椿、檜柏、梧桐、枸樹、豆類、蔬菜、竹、稻、麥、粟、甘蔗、高粱、玉米、禾本科農作物、大豆、綠豆、棉花、麻、苧麻、花卉、花生、甘藷、蕃茄、馬鈴薯、等的薔薇科，十字花科白菜、蘿蔔，楊柳科楊、柳，禾本科狼尾草、狗尾草、共有 39 科，160 多種。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江，國內其他果產區；蘇聯、朝鮮、日本、馬來西亞、印度、歐洲、加拿大，世界廣布。

天 敵：蜘蛛

小枕異絨螨

華矩獵蝽

Anagrus sp. 卵魅小蜂

Chaetostricha auralenia Doutt 大青葉蟬毛小蜂(卵)

Gonatocerus sp. 葉蟬魅小蜂(越冬卵被寄生率達 22%)

Trichogramma sp. 葉蟬卵毛小蜂

瘦蚊 (1-2%)

492. **Cofana spectra** (Distant) 大白葉蟬 (Hun.,1992 :117; Zhang, 1990:35)

Tettigonia albida Signoret, 1853:633.

Tettigoniella spectra, Distant, 1908:211.

Cofana spectra, Young, 1979:7.

寄 主：桑樹、甘蔗、水稻、麥等。

分 佈：臺灣、廣東、湖南；日本、印度、非洲南部。

493. **Drabescus nigrifemoratus** (Matsumura) 黑股槽脛葉蟬 (Hun., 1992:132)

寄 主：板栗、櫸樹、槲樹、橡樹等。

分 佈：雲南、廣東、湖南、江蘇；日本。

494. **Empoasca boninensis** Matsumura 小笠原小綠葉蟬 (Wen et Lee, 1985:105)

寄 主：番石榴。

分 佈：臺灣；小笠原群島。

495. **Empoasca (Kybos) butleri** Ma 布小綠葉蟬 (Ma, 1983:149)

Empoasca (Kybos) butleri Ma, 1983:149.

寄 主：蘋果。

分 佈：陝西。

496. **Empoasca flavescens** (Fabricius) 小綠葉蟬 (ASZI, 1986, 1:169; Chen, 1981:49; Chen et Wang, 1987:156; Chen et al., 1993:65; Huang, 1995, 18(2):1; Liang et al., 1997:340; Luo et al., 1996:53; Yang, 1965:196; Zhang, 1985[ed.]:150-153)

Chlorita flavescens Fabricius, 1794:

寄 主：桃、梅、蘋果、梨、杏、李、山楂、柑橘、棗、蓮霧、柿、橄果、葡萄、楊梅、板栗、桑、茶、稻、麥、高粱、粟、玉米、蕎麥、甘藷、甘蔗、甜菜、大豆、菜豆、綠豆、豌豆、蠶豆、馬鈴薯、大麻、花生、芝麻、向日葵、甘藷、十字花科蔬菜、萬苣、茄子、蕃茄、蠶豆、綠豆、豌豆、菜豆、花生、紅花草、瓜類、棉、洋麻、大麻、苧麻、煙草、蓖麻、油茶、油桐、楊、柳、烏桕、槐、苦楝、櫻花。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東、河北、內蒙古、東北；朝鮮、日本、蘇聯、印度、斯里蘭卡、歐洲、非洲、北美洲。

497. **Empoasca fabae** (Harris) 蘋果小葉蟬 (Yang, 1965:196)

Empoasca fabae (Harris, 1841)

=*Empoasca mali* (LeBaron, 1853)?

寄 主：蘋果。

分 佈：中國。

498. **Empoasca notata** Melichar 小字紋小綠葉蟬 (ASZI, ,1986, 1:170; Zhang, 1987[ed.]:45)

寄 主：葡萄、水稻、花生、四季豆、大麻、泡桐。

分 佈：江西、廣東、貴州、安徽、湖北；印度、斯里蘭卡。

499. **Empoasca pirisuga** (Matsumura) 假眼小綠葉蟬 (ASZI, 1986, 1:169; Hun., 1992:124; Yunn., 1987:279; Zhang, 1985[ed.]:150; Zhang, 1987[ed.]:45)

寄 主：葡萄、桃、梨、桑、松、花生、大豆、十字花科蔬菜、棉花、煙草、茶、泡桐。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、安徽、河南、山東。

500. **Empoasca rufa** Melichar 猩紅小綠葉蟬 (Liu et Qu, 1995, 21(2):27-28)

寄 主：獼猴桃、水稻、茶。

分 佈：湖北。

501. **Erythroneura apicalis** (Nawa) 二點姬葉蟬 (Chen et Wang, 1987:65-68; Huang, 1990[ed.] 2:364-365; Huang et Gao, 1996:284; Lu, 1996(2):48-49; NZWD6, 1981:1712; Yang, 1965:196; Zhang, 1987[ed.]:45)

Erythroneura apicalis (Nawa, 1913)

別 名：*葡萄二點葉蟬*。

寄 主：蘋果、梨、桃、櫻桃、山楂、葡萄、野葡萄、桑、多種花卉、槭。

分 佈：臺灣、福建、江西、四川、陝西、西北、華北、東北，全國南北各地。

天 敵：卵寄生蜂 1 種，寄率高達 50 % 以上。

502. **Erythroneura arachisi** (Matsumura) 血點斑葉蟬 (Zhang, 1987[ed.]:45)

寄 主：葡萄、桑、水稻、大豆、花生、菜豆。

分 佈：江西。

503. **Erythroneura atrifrons** (Distant) 中黑斑葉蟬 (Hun., 1992:121)

寄 主：柑橘、茶樹、花生。

分 佈：江西、湖南；斯里蘭卡。

504. **Erythroneura hirayamalla** (Matsumura) 黑胸斑葉蟬 (ASZL 1986, 1:175)
寄 主：葡萄、桑、花生、蘿蔔。
分 佈：安徽、河北；日本。

505. **Erythroneura melia** Kuch 苦楝斑葉蟬 (Luo et al., 1996:53)
寄 主：檬果。
分 佈：海南。

506. **Erythroneura mori** (Matsumura) 桑斑葉蟬 (ASZL 1986, 1:172; Hun , 1992:122; Suzhou CS., 1985:246; Zhang, 1987[ed.]:46; Zhao, 1993:160; Zheng, 1982:246)
別 名：*血斑浮塵子*。
寄 主：桑、桃、李、梅、棗、柑橘、葡萄、柿、棉。
分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、安徽、山東、陝西；日本。

507. **Erythromeura multipunctata** (Matsumura) 多點斑葉蟬 (Hun., 1992:121)
寄 主：桑、闊葉樹。
分 佈：湖南、廣東、雲南、貴州；日本。

508. **Erythroneura sudra** (Distant) 桃一點葉蟬 (Cai et al., 1993:60-61; Chen et Wang, 1987:156; Huang, 1990[ed.]:2:170-172; Huang et Gao, 1996:238; Lin, 1979:295-297; Zhang, 1987[ed.]:46; Zhao et al., 1997:189)
Typhlocyba sudra Distant, 1906:412.
Erythroneura sudra, Ge, 1966:90-91.
寄 主：桃、杏、梅、李、櫻桃、棟、海棠、蘋果、梨、葡萄、柑橘等。
分 佈：臺灣、福建、江西、長江流域各省、陝西、山東、河北、內蒙古。

509. **Erythroneura** sp. 柿血斑葉蟬 (Chen et Wang, 1987:209-210; Huang, 1990[ed.]:2:325-326; Wang, 1987[ed.]:251-252.)
別 名：*柿斑葉蟬*。
寄 主：柿、棗、桃、李、葡萄、桑。
分 佈：四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北。

510. **Erythroneura** sp. 栗斑葉蟬 (Zhang, 1987[ed.]:46)
寄 主：栗。
分 佈：江西。

511. **Eurhadina japonica** Dworakowska 日本稚小葉蟬 (Zhang, 1990:148)
Eurhadina japonica Dworakowska, 1972:652.
寄 主：核桃。
分 佈：陝西；日本。

512. **Eutettix apricus** Melichar 光綠菱紋姬葉蟬 (Hun , 1992:122)
寄 主：柑橘、茶樹及其他雜灌木。
分 佈：湖南、安徽；印度、斯里蘭卡。

513. **Eutettix disciguttus** (Walker) 菱紋姬葉蟬 (Hun., 1992:122; Kuoi et al., 1981:1-8; NZWDL, 1981:113; Sun et al., 1988, 15(3):173-178; Tao, 1965:36)
=*Hishimonas sellatus* (Uhler), 1896:
別 名：*桑菱紋葉蟬*、*綠翅菱紋葉蟬*、*棱紋葉蟬*、*凹緣菱紋葉蟬*。

寄 主：桑、柑橘、棗、茶、水稻、甘藷、薔薇。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、安徽、浙江、江蘇、安徽，湖北、山東、河北；日本、菲律賓、斯里蘭卡、異他群島、新幾內亞、澳洲、非洲。
傳 病：傳佈桑黃化型萎縮病，萎縮型萎縮病，棗瘟病。
天 敵：*Polynema* sp. 纓小蜂
Beauveria bassiana Bals. 白僵菌(成蟲)
Erigonidium graminicola (Sund.) 赤甲黑腹微蛛
Miaumenops tricuspidatus (Fabr.) 葉蟹蛛(三實花蛛)
Oodothorax insesticeps (Boes. et Str.) 赤甲條背微蛛
Pardosa T-insignita (Boes. et Str.) 小字紋狼蛛
Plexippus pakylli (Audouin) 黑色蠅蛛

514. **Eutettix sellatiformis** (Ishihara) 擬菱紋葉蟬 (Kuoi et al., 1981:1-8; NZWDI, 1981:1113)
別 名：*紅頭菱紋葉蟬*。
寄 主：桑、柑橘、茶、水稻、甘藷、薔薇。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、安徽、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北；日本、菲律賓、斯里蘭卡、異他群島、新幾內亞、澳洲、非洲。
傳 病：傳佈桑黃化型萎縮病，萎縮型萎縮病。
天 敵：*Polynema* sp. 纓小蜂
Beauveria bassiana Bals. 白僵菌(成蟲)
Erigonidium graminicola (Sund.) 赤甲黑腹微蛛
Miaumenops tricuspidatus (Fabr.) 葉蟹蛛(三實花蛛)
Oodothorax insesticeps (Boes. et Str.) 赤甲條背微蛛
Pardosa T-insignita (Boes. et Str.) 小字紋狼蛛
Plexippus pakylli (Audouin) 黑色蠅蛛

515. **Farynala malhotri** Sharma 核桃蕾小葉蟬 (Zhang, 1990:153)
Farynala malhotri Sharma, 1977:241.
寄 主：核桃。
分 佈：廣東、陝西；印度。

516. **Flexocerus citrinus** Li 橘彎莖葉蟬 (Li, 1986:125)
Plexocerus citrinus Li, 1986:125.
寄 主：柑橘。
分 佈：貴州。

517. **Hecalus prasinus** (Matsumura) 褐脊匙頭葉蟬 (ASZI, 1986, 1:183; Cai et He, 1995:95; Zhang, 1990:73; Zhang, 1987[ed.]:41)
Parabolocrates (sic) *prasinus* Matsumura, 1905:48.
Paraholocratus prasinus, Matsumura, 1912:285.
=*Paraholocratus dubiatus* Bierman, 1970:64.
Hecalus prasinus, Morrison, 1973:417.
別 名：*褐脊鏟頭葉蟬*。
寄 主：柑橘、茶、棉花、禾本科雜草。
分 佈：福建、江西、廣東、貴州、雲南、陝西、河北；日本、菲律賓、寮國、泰

國。

518. **Hishimonus sellatiformis** Ishihara 擬菱紋葉蟬 (Suzhou CS., 1985:221-225; Zheng, 1982:221-225)
Hishimonus sellatiformis Ishihara,
別 名：*紅頭*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、四川、浙江、江蘇、安徽、遼寧。

519. **Hishimonus sellatus** (Uhler) 凹緣菱紋葉蟬 (Chen et al., 1993:70; Liang et al., 1997:345; Suzhou CS., 1985:221-225; Zhang, 1990:88; Zhang, 1987[ed.]:48; Zheng, 1982:221-225; Zhou et al., 1998, 15(4):354-359)
Thamnotettix sellata Uhler, 1896:294.
=*Eutettix disciguttus* (Walker), Kuoh, 1966:146.
別 名：*綠頭*。
寄 主：刺梨、桑、棗、柑橘、無花果、大麻、大豆、赤豆、綠豆、豇豆、茶、茄子、花生、馬鈴薯、芝麻、紅花草、葎草、薔薇、泡桐、榆。
分 佈：臺灣、江西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、遼寧；日本、蘇聯。
附 註：傳播桑黃化型、桑萎縮病、棗瘋病，爲著名病毒媒介昆蟲。

520. **Hisimonoides aurifavialea** 橙帶擬菱紋葉蟬 (Zhou et al., 1998, 15(4):356)
寄 主：棗。
分 佈：河北。
附 註：傳播棗瘋病。

521. **Hishimonoides sellatifrons** Ishihara 擬菱紋葉蟬 (Chen, 1993:71; Zhou et al., 1998, 15(4):354-359)
寄 主：棗、桑、泡桐。
分 佈：浙江、江蘇、安徽、河南。
附 註：傳播棗瘋病。

522. **Iassus chlorophanus** (Melichar) 黃綠短頭葉蟬 (Liang et al., 1997:327)
Iassus chlorophanus (Melichar, 1903:)
寄 主：水稻、黃荊、苕子等。
分 佈：臺灣、貴州、四川、湖北；菲律賓、印度、斯里蘭卡。

523. **Idiocerus niveosparsus** (Lethierry) 檬果葉蟬 (Chao, 1982:73; Chen et Chang, 1988:193; Huang, 1990[ed.] 2:297; Lin, 1995(3):44; Pingtung AC. 1986:10; Tsai, 1965:37)
別 名：*檬果短頭葉蟬*。
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣、福建、中國大陸；日本、菲律賓、馬來西亞、新加坡、爪哇、緬甸、印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡。

524. **Idiocerus populi** (Linnaeus) 楊短頭葉蟬 (Yang, 1965:196)
Idiocerus populi (Linnaeus, 1761)
寄 主：蘋果。
分 佈：東北。

525. **Idioscopus clypealis** (Lethierry) 龍眼扁喙葉蟬 (ASZI, 1986, 1:184; Chen et Chang, 1995:457; Huang, 1995, 18(2):1-10; Luo et Li, 1998:48; Luo et al., 1996:53; Tsai, 1961:115; Tsai, 1965:37; Yunn., 1987:267, 279; Zhang, 1990:120)

Idiocerus clypealis Lethierry, 1889:252.
=*Idiocerus nigroclypeatus* Melichar, 1903:148.
Idioscopus clypealis, Baker, 1915:339.
別 名：*龍眼綠浮塵子*。
寄 主：龍眼、橄果。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南；日本、菲律賓、馬來西亞、爪哇、緬甸、印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡。

526. **Idioscopus incertus** (Baker) 橄果扁喙葉蟬 (ASZI,1986, 1:183; Huang, 1995, 18(2):1-10; Huang et Cao, 1996:281; Luo et Li, 1998:45; Luo et al., 1996:53; Qian et Li, 1999, 22(4):40; Shi, 1998, 21(3):36; Yunn., 1987:267; Zhang, 1990:120)
Idiocerus maculatus Distant, 1912:605.
Idiocerus incertus, Baker, 1924:376.
Idioscopus incertus, Koh, 1986:183.
寄 主：橄果、龍眼。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

527. **Idioscopus nigroclypeatus** (Melichar) 黑唇扁喙葉蟬 (Yunn., 1987:267)
寄 主：橄果。
分 佈：海南、雲南；印度、斯里蘭卡。

528. **Ishidaella albomarginata** (Signoret) 白邊大葉蟬 (ASZI, 1986, 1:178; Liang et al., 1997:337)
Ishidaella albomarginata (Signoret, 1853:)
寄 主：柑橘、葡萄、桑、水稻、甘蔗、棉花、土當歸、樸、樽、槭、薔薇、紫藤。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、東北；朝鮮、日本、西伯利亞、馬來西亞、澳洲。

529. **Jacobiasca formosana** (Paoli) 茶小葉蟬 (Chiang, 1989:66; Tsai, 1965:37)
Empoasca formosana Paoli, 1932:117.
Jacobiasca formosana, Dworakowska, 1984:14.
寄 主：桃、茶、苧麻、蓖麻、朝鮮薊、菜豆、落花生、奎寧。
分 佈：臺灣；日本。

530. **Jassus brevis** (Walker) 二黃帶頂葉蟬 (Zhang, 1987[nd.]:44)
寄 主：葡萄、梧桐。
分 佈：江西。

531. **Jassus indicus** Lethierry 黃綠短頭葉蟬 (Chen et al., 1993:67)
寄 主：棗。
分 佈：河南。

532. **Kolla atramentaris** (Motschulsky) 淡邊大葉蟬 (Yunn., 1987:281)
寄 主：柑橘、葡萄、桑、樸、槭、土當歸、薔薇、紫藤。
分 佈：自華南至東北廣泛分佈；日本。

533. **Kolla paulula** (Walker) 白邊大葉蟬 (Liang et al., 1997:330; Xu et al., 1995:89)
Kolla paulula (Walker, 1858:)
寄 主：花椒、雜灌木。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、

河北；越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼。

534. **Kuohzygia albolinea** Zhang 葛小葉蟬 (Zhang, 1990:181)
Kuohzygia albolinea Zhang, 1990:181.
寄 主：楊梅。
分 佈：湖南。

535. **Ledra auditura** Walker 蜜耳葉蟬 (ASZI, 1986, 1:185; Luo et al., 1996:54; Yang, 1965:196; Zhang, 1990:44; Zhang, 1987[ed.]:41)
Ledra auditura Walker, 1858:249.
別 名：*蘋果耳葉蟬*。
寄 主：檬果、蘋果、梨、葡萄、油茶、樸及其他闊葉樹。
分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、安徽、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯、爪哇。

536. **Ledropsis discolor** (Uhler) 乳條片頭葉蟬 (ASZI, 1986, 1:184)
寄 主：梨、柑橘、榆、樸及其他殼斗科植物。
分 佈：浙江；日本。

537. **Limassolla diospyri** Chou et Ma 柿零葉蟬 (Chou & Ma, 1981:205; Chou & Zhang, 1985:288; Zhang, 1990:162)
Limassolla diospyri Chou et Ma, 1981:205.
寄 主：柿樹。
分 佈：湖南、陝西。

538. **Limassolla discoloris** Zhang & Chou 斑翅零葉蟬 (Zhang, 1990:164; Zhang & Chou, 1988:251)
Limassolla discoloris Zhang & Chou, 1988:251.
寄 主：柿子。
分 佈：陝西。

539. **Limassolla dispunctata** Chou et Ma 柿散零葉蟬 (Chou & Ma, 1981:204; Chou & Zhang, 1985:289; Zhang, 1990:161)
Limassolla diospyri Chou et Ma, 1981:204.
寄 主：柿樹。
分 佈：廣東、陝西。

540. **Limassolla ishiharai** Dworakowska 石原零葉蟬 (Zhang, 1990:165; Zhang & Chou, 1988:252)
Limassolla ishiharai Dworakowska, 1972:865.
寄 主：楊梅。
分 佈：廣西、湖南、陝西；日本。

541. **Limassolla kakii** Chou et Ma 柿小零葉蟬 (Chou & Ma, 1981:205; Chou & Zhang, 1985:289; Zhang, 1990:162)
Limassolla kakii Chou et Ma, 1981:205.
寄 主：柿樹。
分 佈：陝西。

542. **Limassolla multipunctata** (Matsumura) 多點零葉蟬 (Chou & Zhang, 1985:289)
Zygina multipunctata Matsumura, 1920:2.
=*Typhlocyba nakanensis* Matsumura, 1932:99.

=*Zygina teizonis* Matsumura, 1932:119.
Limassolla multipunctata
寄 主：桑、闊葉樹。
分 佈：廣東；日本。

543. **Moonia castanea** Kuoh 棕盾瀰葉蟬 (Kuoh, 1986:199)
Moonia castanea Kuoh, 1986:199.
寄 主：雲南松、雜木。
分 佈：雲南。

544. **Moonia maculigena** Kuoh 斑頰瀰葉蟬 (Kuoh, 1986:200)
Moonia maculigena Kuoh, 1986:220.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

545. **Motshulskyia pulchra** Matsumura 麗葉蟬 (Tsai, 1965:37)
Motshulskyia pulchra Matsumura, 19
寄 主：桑。
分 佈：臺灣；日本。

546. **Naratettix zonatus** (Matsumura) 黑帶小葉蟬 (Yang, 1965:196)
Naratettix zonatus (Matsumura, 1915:)
寄 主：蘋果。
分 佈：中國。

547. **Neotituria kongosana** (Matsumura) 金剛耳葉蟬 (Yang, 1965:196)
Neotituria kongosana (Matsumura, 1915:)
寄 主：蘋果。
分 佈：中國。

548. **Nephotettix cincticeps** (Uhler) 假黑尾葉蟬 (Cai et He, 1995:97; Ge, 1992:303; Liang et al., 1997:345; Luo et al., 1996:53; Zhang, 1990:81; Zhou et Zhang, 1995:38)
Selenocephalus cincticeps Uhler, 1896:292.
=*Nephotettix apicalis cincticeps*, Sasaki, 1897:381.
=*Nephotettix bipunctatus cincticeps*, Esaki 1932:5.
Nephotettix cincticeps, Ghauri, 1971:487.
別 名：*黑尾葉蟬*。
寄 主：柑橘、橡果、香蕉、茶、水稻、甘蔗、菱白、小麥、玉米、稗草、看麥娘、白菜、芥菜、蘿蔔。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北；朝鮮、日本、東洋區、古北區、非洲區。

549. **Nephotettix nigropictus** (Stål) 黑尾葉蟬 (Zhang, 1990:80)
Thamnotettix nigropicta Stål, 1870:740.
=*Thamnotettix nigromaculata* Kirby, 1891:379.
=*Nephotettix apicalis* Melichar, 1903:193.
Nephotettix nigropictus, Ghauri, 1971:491.
別 名：*二綫黑尾葉蟬*。

寄 主：柑橘、水稻、甘蔗、茭白、小麥、穀子等。
分 佈：亞洲。

550. **Nephotettix virescens** (Distant) 原黑尾葉蟬 (Ghauri, 1971:484; Huang, 1995, 18(2):1; Song, 1984:82; Tsai, 1965:36; Yunn., 11987:282; Zhang, 1990:79)
Selenocephalus virescens Distant, 1908:291.
=*Cicada bipunctata* Fabricius, 1803:379, nom. preocc. by *Cicada bipunctata* Scopoli,1763:115.
=*Nephotettix impicticeps* Ishinara, 1964:42.
別 名：*二點黑尾葉蟬*。
寄 主：柑橘、檬果、茶、水稻、茭白、小麥、紫雲英、甘蔗、竹、雜草等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、香港、廣東、雲南；日本、菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

551. **Nirvana suturalis** Melichar 寬帶隱脈葉蟬 (ASZI, 1986, 1:179; Hun., 1992:127; Zhang, 1990:51)
Nirvana suturalis Melichar, 1903:166.
寄 主：桑、甘蔗、稻。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、貴州；日本、緬甸、印度。

552. **Oncopsis mali** Matsumura 蘋果橫紋葉蟬 (Liang et al., 1997:328)
Oncopsis mali Matsumura, 1905:
寄 主：蘋果。
分 佈：四川；日本。

553. **Oniella leucocephala** Matsumura 白頭小板葉蟬 (Hun.,1992:125; Zhang, 1990:50)
Oniella leucocephala Matsumura, 1912:47.
寄 主：桑、榆、赤楊。
分 佈：四川、湖南、浙江；日本。

554. **Orientus ishidae** (Matsumura) 蘋果斑葉蟬 (Yang, 1965:196)
Orientus ishidae (Matsumura, 1902).
寄 主：蘋果。
分 佈：中國。

555. **Orosius albicintus** Distant 網室葉蟬 (ASZI, 1986, 1:165)
Orosius albicintus Distant,
寄 主：葡萄、大豆、花生。
分 佈：廣東、安徽、河北；印度。

556. **Ouadira pakistanica** (Ahmed) 印度棗葉蟬 (Wen et Lee, 1987:410)
寄 主：印度棗。
分 佈：臺灣。

557. **Paracyba soosi** Dworakowska 褐帶蠟小葉蟬 (Zhang, 1990:155)
Paracyba soosi Dworakowska, 1977:41.
寄 主：楊梅。
分 佈：湖南；越南。

558. **Paramesus lineaticollis** Distant 一字斷脈葉蟬 (Luo et al., 1996:53)

寄 主：檬果。
分 佈：海南。

559. **Penthimia formosa** Yang 美麗烏葉蟬 (Yang, 1997:349)
Penthimia formosa Yang, 1997:349-250.
寄 主：獼猴桃園。
分 佈：湖北。

560. **Penthimia nitida** Lethierry 黑扁葉蟬 (Yang, 1965:196)
Penthimia nitida Lethierry, 1875:
寄 主：蘋果。
分 佈：中國。

561. **Petalocephala viridula** Kuoh 淡綠片頭葉蟬 (Kuoh, :274)
Petalocephala viridula Kuoh, 1984:274.
寄 主：松樹。
分 佈：雲南。

562. **Pseudonirvana erythrolinea** Kuoh 紅紋擬隱脈葉蟬 (Kuoh & Kuoh, 1983:319; Yunn., 1987: 270)
Pseudonirvana erythrolinea Kuoh et Kuoh, 1983:319.
寄 主：番石榴。
分 佈：雲南。

563. **Pseudonirvana furcilinea** Kuoh et Kuoh 叉線擬隱脈葉蟬 (Kouh & Kuoh, 1983:317; Yunn., :270; Zhang, 1990:53)
Pseudonirvana furcilinea Kuoh et Kuoh, 1983:317.
寄 主：柑橘、相思樹、紅木。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南。

564. **Pseudonirvana longitudinalis** (Distant) 雙線擬隱脈葉蟬 (Hun.,1992:127; Zhang, 1990:53)
Nirvana longitudinalis Distant, 1908:283.
Pseudonirvana longitudinalis, Baker,1923:393.
寄 主：柑橘、相思樹、紅木。
分 佈：湖南、雲南、貴州、上海；印度。

565. **Pseudonirvana orientalis** (Matsumura) 長線擬隱脈葉蟬 (Zhang, 1990:54)
Nirvana orientalis Matsumura, 1912:282.
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、香港、湖南、華北。

566. **Psmmotettex striatus** (Linnaeus) 條沙葉蟬 (Chen et al., 1993:67)
寄 主：棗。
分 佈：河南、甘肅。
天 敵：*Anagrus* sp. 卵魅小蜂
Gonatocerus sp. 卵魅小蜂
Pterygogramma sp. 卵毛小蜂

567. **Pyramiidotettix mali** Yang 蘋果塔葉蟬 (Chen et Wang, 1987:68)

寄 主：蘋果。
分 佈：陝西。

568. **Quadria pakistanica** (Ahmed) 印度棗葉蟬 (Chiang, 1989:113; Wen, 1996:341; 1998:135-141)
Zygina pakistanica Ahmed, 1969:172.
=*Spatulosyrus variegatus* Ramakrishnana et Menon, 1973:17.
寄 主：印度棗(*Zizyphus mauritiana* Linnaeus)。
分 佈：臺灣、印度、巴基斯坦。
天 敵：*Verticillum lecaric* 蟲生真菌

569. **Recilia dorsalis** (Motschulsky) 電光葉蟬 (ASZI, 1986, 1:160; Hun., 1992:125; Liang et al., 1997:341; Tsai, 1965:35; Yunn., 1987:274; Zhang, 1990:83)
Deltocephalus dorsalis Motschulsky, 1859:114.
=*Deltocephalus fulguralis* Matsumura, 1902:391.
=*Thamnotettix storratus*, (Ikuma), 1903:
Inazuma dorsalis (Motschulsky), Metcalf, 1967:1601.
Recilia dorsalis, Nielson, 1968:315.
寄 主：柑橘、稻、麥、玉米、高粱、粟、甘蔗。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、江蘇、上海、湖北；日本、婆羅洲、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡。

570. **Ribautiana tenerrima** (Herrich-Schaffer) 黃帶小葉蟬 (ASZI, 1986, 1:171)
寄 主：梨、李、橡、楓、柳、榛、鼠木、黃楊樹。
分 佈：河北；歐洲。

571. **Scaphoideus festivus** Matsumura 橘帶葉蟬 (Cai et He, 1995:97)
Scaphoideus festivus Matsumura, 1902:
寄 主：柑橘、茶、水稻。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、雲南、貴州、陝西；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡。

572. **Singapona shinshana** (Matsumura) 桃一點葉蟬 (ASZI, 1986, 1:174; Chiang, 1989:131; Hun., 1992:119; Sun, 1963:209-219)
Zygina shinshana Matsumura, 1932:117.
Singapona shinshana, Dworakowska, 1970:760
=*Erythroneura sudra* Distant, Lin, 1978:295. misident.
[Peach leafhopper]
寄 主：桃、李、梨、梅、柑橘、山楂、蘋果、彌猴桃、葡萄等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、浙江、安徽、江蘇、上海。

573. **Tartessus ferruginus** (Walker) 黃錐胸葉蟬 (ASZI, 1986, 1:180)
寄 主：柑橘、無花果、檬果、龍眼、奈爾樹。
分 佈：臺灣、華北；日本、菲律賓、馬來西亞、印度。

574. **Tautoneura arachisi** (Matsumura) 血點斑翅葉蟬 (ASZI, 1986, 1:173; Chen, 1982:72; Hun., 1992:120; Zhang, 1990:143)
Zygina arachisi Matsumura, 1916:397.
=*Zygina sawarensis* Ahmed, 1971:177.
=*Zygimopsis erythropunctatus* Ramakrishnan et Menon, 1973:32.
Tautoneura arachisi, Dworakrishnan et Sohi, 1978:39.

寄 主：葡萄、花生、大豆、豌豆、四季豆等。
分 佈：臺灣、福建、安徽。

575. **Tartessus gokaensis** Matsumura 哥加葉蟬 (Tsai, 1965:36)
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣；日本。

576. **Tettigella alba** Metcalf 白葉蟬 (Lee, 1991:84)
寄 主：腰果。
分 佈：海南。

577. **Tettigella spectra** (Distant) 大白葉蟬 (Lee et al., 1996:53)
寄 主：橡果。
分 佈：海南。

578. **Tettigoniella albomarginata** (Signoret) 白邊大葉蟬 (Hsu., 1992:117; Zhang, 1987[ed.]:42)
寄 主：柑橘、葡萄、桑、槲、櫟、紫藤、水稻、甘蔗、棉、土當歸、薔薇。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、北京、東北地區；朝鮮、日本、俄羅斯、馬來西亞。

579. **Tnamnotettix cyclops** (Mulsant et Rey) 一點木葉蟬 (Chen et al., 1993:70)
寄 主：棗。
分 佈：河南。

580. **Typhlocyba rosae** (Linnaeus) 薔薇小葉蟬 (Hsu., 1992:125; Zhang, 1987[ed.]:46)
寄 主：獼猴桃、蘋果、寒莓、苦莓、田麻、薔薇、槲、槐。
分 佈：江西、湖南、江蘇、北京及東北地；朝鮮、日本、歐洲、北美。

581. **Typhlocyba** sp. 紅閃小葉蟬 (Zhou et al., 1998, 15(4):336)
寄 主：棗。
分 佈：河北。
附 註：傳播棗瘋病。

582. **Uzeldikra citrina** (Melichar) 檸檬烏小葉蟬 (Zhang, 1990:126; Zhang & Chou, 1988:43)
Empoasca citrina Melichar, 1903:213.
=*Puxaneura signata* Ramakrishnan et Menon, 1971:459.
Uzeldikra citrina, Dworakowska, 1971:585.
寄 主：檸檬。
分 佈：海南；斯里蘭卡。

583. **Zyginella citri** (Matsumura) 柑橘塔葉蟬 (Chou et Zhang, 1985:292)
Conometopius citri Matsumura, 1907:83-116.
Zyginella citri, Dworakowska, 1970:707.
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣；日本。

584. **Zyginella mali** (Yang) 蘋果塔葉蟬 (ASZI, 1986, 1:177; Chou et Zhang, 1985:292; Huang, 1990[ed.]:2:30-31.

Li, 1988:29-31; Zhang, 1990:170)
Pyramidotettix mali Yang, 1965:197-200.
=*Remmia orbigera* Vilbaste, 1968:92-93.
Zyginella mali Yang, Dworakowska, 1970:708.
寄 主：蘋果、沙果、槓子、海棠。
分 佈：青海、陝西、甘肅、寧夏；蘇聯。

585. **Zyginella minuta** (Yang) 蘋小塔葉蟬 (Chou et Zhang, 1983:293; Yang, 1965:200; Zhang, 1990:171)
Pyramidotettix minuta Yang, 1965:200.
Zyginella minuta Yang, Dworakowska, 1970:708.
寄 主：蘋果、核桃。
分 佈：福建、江蘇(南京)、陝西南部。

Psyllidae 木蝨科

586. **Anomoneura mori** Schwerz 桑異脈木蝨 (Hua., 1992:205; Li, 1992:132; NZWDI, 1981:1096; Suzhou CS., 1985:218-221; Tao, 1980:216; Xiao, 1992:183; Zhang, 1982:218-221)
別 名：*桑木蝨*、*桑芭茅*、*桑白毛*。
寄 主：桑。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧；韓國、日本。
天 敵：*Hierodula saussurei* Kirby 二點螳螂
Mallada septempunctata (Wesmeal) 七點草蛉
Halyomorpha picus Fabricius 茶翅蝽
Aiolocaria mirabilis Motschulsky 奇變瓢蟲
Anisolemnia dilata (Fabricius) 十斑瓢蟲
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Harmonia axyridis Pallas 異色瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
世紋瓢蟲
十星大瓢蟲
Tetrastichus sp. 桑木虱嚙小蜂 (若蟲，寄生率可達 43%)

587. **Aphalaridae fasciata** Kuwayama 帶斑木蝨 (Li, 1995:106)
Aphalaridae fasciata Kuwayama, 1908:
寄 主：蓼、馬尾松。
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、安徽、湖北、遼寧；朝鮮、日本。

588. **Cacopsylla cangshanli** (Yang et Li) 蒼山梨木蝨 (Li et Yang, 1992:330)
Psylla cangshanli Yang et Li, 1984:227-228.
寄 主：梨。
分 佈：雲南(大理)。

589. **Cacopsylla ciliensis** Li 慈利喙木蝨 (Li, 1992:133)
Cacopsylla ciliensis Li, 1992:133-134.
寄 主：胡頹子 *Elaeagnus* sp.。
分 佈：湖南。

590. **Cacopsylla clausenisuga** Li et Yang 黃皮木蝨 (Li, 1995:107)
Cacopsylla clausenisuga Li et Yang.
寄 主：黃皮。
分 佈：

591. **Cacopsylla erhaili** (Yang et Li) 洱海梨木蝨 (Li et Yang, 1992:350)
Psylla erhaili Yang et Li, 1984:228-229.
Cacopsylla erhaili; Li et Yang, 1992:350.
寄 主：梨。
分 佈：雲南(大理)。

592. **Cacopsylla gracilenta** Li 細肛喀木蝨 (Li, 1990:212)
Cacopsylla gracilenta Li, 1990:212.
寄 主：沙棘(*Hippophae rhamnoides* L., 胡頹子科 Elaeagnaceae)。
分 佈：四川、寧夏、甘肅、山西、內蒙古。

593. **Cacopsylla idiocrataegi** Li 山楂喀木虱 (Cao et Peng, 1993:23; Wang et al., 1994(2):30-32)
寄 主：山楂。
分 佈：山西、河北、遼寧、吉林。

594. **Cacopsylla laricis** Li 落葉松喀木蝨 (Li, 1997:357)
Cacopsylla laricis Li, 1997:357-358.
寄 主：落葉松。
分 佈：湖北。

595. **Cacopsylla laricola** Li 落葉松喀木蝨 (Li, 1990:207)
Cacopsylla laricola Li, 1990:207.
寄 主：落葉松。
分 佈：山西、河北、內蒙古。

596. **Cacopsylla oculata** Li et Yang 眼斑沙棘喀木蝨 (Li et Yang, 1992:332)
Cacopsylla oculata Li et Yang, 1992:332-334.
寄 主：沙棘(*Hippophae rhamnoides* L.)。
分 佈：西藏、四川、山西、寧夏、甘肅。

597. **Cacopsylla phymatophora** Li 瘤喀木虱 (Li, 1990:215)
Cacopsylla phymatophora Li, 1990:215.
寄 主：樟子松(*Pinus sylvestris* var. *mongolica* Litvin)。
分 佈：內蒙古。

598. **Cacopsylla prona** Li et Yang 彎草沙棘木蝨 (Li et Yang, 1992:337)
Cacopsylla prona Li et Yang, 1992:337-339.
寄 主：沙棘(*Hippophae rhamnoides* L.)、胡頹子(*Elaegnus* sp.)。
分 佈：四川、山西、甘肅。

599. **Cacopsylla scalpelliforma** Li 刀突喀木虱 (Li, 1990:209)
Cacopsylla scalpelliforma Li, 1990:209.
寄 主：馬尾松、落葉松。

分 佈：山西、內蒙古、吉林、黑龍江。

600. **Cacopsylla serpentina** Li et Yang 蛇突沙棘喀木蝨 (Li et Yang, 1992:335)
Cacopsylla serpentina Li et Yang, 1992:335-336.
寄 主：沙棘(*Hippophae rhamnoides* L.)、胡頹子(*Elaeagnus* sp.)。
分 佈：四川、陝西、山西、甘肅。

601. **Cacopsylla spinata** Li 刺突喀木蝨 (Li, 1997:358)
Cacopsylla spinata Li, 1997:358-359.
寄 主：巫山胡頹子(*Elaeagnus wushanensis* C. Y. Chang)。
分 佈：四川。

602. **Cacopsylla sylvestresuga** Li 樟子松喀木虱 (Li, 1990:210)
Cacopsylla sylvestresuga Li, 1990:210.
寄 主：樟子松。
分 佈：內蒙古。

603. **Cacopsylla vulgahippophaes** (Li et Yang) 普通沙棘喀木蝨 (Li et Yang, 1992:343)
Cacopsylla vulgahippophaes (Li et Yang, 1987:)
Cacopsylla vulgahippophaes; Li et Yang, 1992:343.
寄 主：沙棘。
分 佈：

604. **Cacopsylla xiaguanli** (Yang et Li) 下關梨木蝨 (Li et Yang, 1992:350)
Psylla xiaguanli Yang et Li, 1984:223-225.
Cacopsylla xiaguanli; Li et Yang, 1992:350.
寄 主：梨。
分 佈：雲南(下關市)。

605. **Caenohomotoma mangiferae** Yang et Li 檬果厚毛木蝨 (Yang et Li, 1984:209; Yunn., 1987: 307)
Caenohomotoma mangiferae Yang et Li, 1984:209.
寄 主：檬果。
分 佈：雲南。

606. **Chineura alba** Yang et Tsay 橄欖木蝨 (Yang, 1999:44)
Chineura alba Yang et Tsay, 1980:
寄 主：*Canrium album* (Lour.) 橄欖。
分 佈：臺灣。

607. **Cornegenapsylla sinica** Yang et Li 龍眼角頻木蝨 (ASZI, 1986, 1:200; Chen et al., 1997(6):35-36; Chen et al., 1998(4):16; Chen et al., 1999(3): 29; Huang et Gao, Li et Huang, 1993:134-135; Lin et al., 2000(1):28-29; Yang, 1999:44; 1996:214; Yang et Li, 1982:124-127)
Cornegenapsylla sinica Yang et Li, 1982:124.
=*Neophacopteron euphoriae* Yang, 1984:165. N. Syn.
寄 主：龍眼(*Euphoria longana* Lam.)。
分 佈：臺灣、福建、廣東。
附 註：能傳播龍眼鬼帚病(成蟲)。

608. **Diaphorina citri** Kuwayama 柑橘木蝨 (ASZI, 1986, 1:199; Cai, 1995(4):36-37; Chen, 1982:82; Chen et al.,

1981, 8(3):210-212; Chiu et al., 1985:1-8; 1985:449; Ding et Huang, 1994, 16(2):67-72; Guangxi, CHRS., 1977, (34):23-24; Huanan AC., PPD., 1977, (6):50-51; Huang, 1953, (1):7-20; Huang, 1990[ed.] 2:210-212; Huang et Huang, 1986, 13(1):23-30; Huang et Huang, 1989:135-143; Huang et al., 1982:282-283; 1984:65-72; 1989:411-412; Hun., 1992:204; Lin, 1956, 2(2):13-42; Lin et al., 1998(2):27-29; Liu, 1989:144-164; Liu, 1989:165-175; NZWDI, 1981:1881; Sun, 1999(6):17-18; Tao et Wu, 1968:60; Tsai, 1965:41; Tsai et al., 1984:285-287; Wang, 1981:412-419; Wang et al., 1996:355-365; Wei et al., 1995, 17(2):59-63; Wu et al., 1983:293; Xie et Su, 1989, 15(2):198-202; Xie et al., 1988:18-22; Xie et al., 1988, 15(2):111-116; Xu et Ke, 1995(1):35-36; Xu et Zhong, 1995(1):35-36; Xu et al., 1985, 5(4):241-245; Xu et al., 1988:29-31; Xu et al., 1994(1):32-33; Xu et al., 1994, 21(1):53-56; Xu et al., 1998, 25(20):108-110; Yang, 1984:37; Yang, 1989:126-134; Yang et Huang, 1988, 14(1):8-9; Yang et Huang, 1989:114-125; Yunn., 1987: 332; Zhang, 1987ed.:57; Zhao et al., 1979, 9(2):121-126; Zhao et al., 1995(4):28)

Diaphorina citri Kuwayama, 1908:160.

寄 主：枸橼、檸檬、黎檬、雪柑、蕉柑、柚、紅橘、月月橘、橙、黃皮、羅浮、代代、七里香等蕓香科植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度。

天 敵：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉

Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉, 亞非草蛉

Orius similis Zheng 南方小花蝽 (卵、若蟲)

Chilomenes quadriplagiata (Swartz) 四斑月瓢蟲

Coelophora biplagiata (Swartz) 雙帶盤瓢蟲

Leis axyridis (Pallas) 異色瓢蟲

Lemia circumusta Mulsant 紅基盤瓢蟲

Synharmonia octomaculata (Fabricius) 八斑和瓢蟲

Diaphorencyrtus diaponrinae (Lin et Tao) 柑木虱跳小蜂

Metapriomitus sp.

Tamarixia radiata (Waterston) 亮腹釉小蜂

609. **Livia pinicola** Li 馬尾松扁木蝨 (Li, 1997:351)

Livia pinicola Li, 1993:

寄 主：馬尾松。

分 佈：廣東、廣西、貴州、四川。

610. **Microceropsylla nigra** (Crawford) 檬果木蝨 (Chen et Chang, 1995:457; Lee et Wen, 1980:219-224; Luo et al., 1996:54; Pinghung AC., 1986:12; Tsai, 1965:42; Yang, 1984:148)

Pauropsylla nigra Crawford, 1919:143.

Microceropsylla nigra, Boselli, 1930:180-185.

寄 主：檬果。

分 佈：臺灣、海南；菲律賓、印度。

611. **Paurocephala psylloptera** Crawford 桑木蝨 (Chen et Hsieh, 1975:447; Hsieh et Chen, 1977:37-46; Liu, 1995:27-29; Shih et Lee, 1977:324; Su et al., 1990:365; Tao, 1980:211; Tsai, 1965:42; Yang, 1984:141)

Paurocephala psylloptera Crawford, 1913:294.

=*Agonoscena sauteri* Enderlein, 1914:234.

別 名：*臺灣桑木蝨*。

寄 主：桑。

分 佈：臺灣；菲律賓、婆羅洲、西里伯、印度、斯里蘭卡、摩洛哥。

天 敵：螳螂

安平草蛉

Coelophora chinensis Weise 六星瓢蟲

Leis dimidiata Fabricius 小十三星瓢蟲

Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲

Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
大十三星瓢蟲
八條瓢蟲
龜紋瓢蟲
錨紋瓢蟲
紅基瓢蟲
七星瓢蟲
赤星瓢蟲
寄生性
Encyrtidae 跳小蜂科

612. **Paurocephala pumilae** Yang et Li 薜荔小頭木虱 (Yang et Li, 1986:46)
Paurocephala pumilae Yang et Li, 1986:46-48.
寄 主：*Ficus pumila* L. 薜荔。
分 佈：海南。

613. **Pseudophacopteron canarium** Yang et Li 橄欖星室木虱 (Chen et al., 1997, 24(3):209-214; Huang et Gao, 1996:274; Lian et Cai, 1998(3):55; Huang, 1990[ed.] 2:301-302; Huang et al., 1998(4):38; Yang et Li, 1983, 3:121; Zhong et al., 1999(5):36)
Pseudophacopteron canarium Yang et Li, 1983:121.
寄 主：*Canarium album* (Lour.) Raeusch 橄欖樹。
Canarium pimela Koenig 黃欖樹
分 佈：臺灣、福建、廣東。
天 敵：*Mallada boninensis* (Okamoto) 安平草蛉
Cyrtorrhinus lividipennis Reutir 黑肩綠盲蝽
Chilocorus rufitarsus Motschulsky 寬緣唇瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Harmonia octomaculata (Fabricius) 八斑和瓢蟲
Illeis cincta (Fabricius) 素鞘瓢蟲
Lemnia biplagiata (Swartz) 雙帶盤瓢蟲
Lemnia circumusta (Mulsant) 紅基盤瓢蟲
Lemnia saucia Mulsant 黃斑盤瓢蟲
Megalocaria dilatata (Fabricius) 十斑大瓢蟲
Menochilus sexmaculata (Fabricius) 六斑月瓢蟲
Phrynocaria congener (Fabricius) 紅星盤瓢蟲
Propylaea japonica (Thunberg) 龜紋瓢蟲
Serangium japonicum Chapin 刀角瓢蟲
Synonycha grandis (Thunberg) 大突肩瓢蟲

614. **Psylla aili** Li et Yang 艾梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla aili Li et Yang, 1984:226.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

615. **Psylla betulaefoliae** Yang et Li 杜梨木虱 (Yang et Li, 1981:39)
Psylla betulaefoliae Yang et Li, 1981:39.
寄 主：杜梨。

分 佈：河北。

616. **Psylla cangshanli** Li et Yang 蒼山梨木虱 (Li et Yang, 1984:223; Yunn., 1987:326)
Psylla cangshanli Li et Yang, 1984:223.
寄 主：梨。
分 佈：雲南。

617. **Psylla chaenomelei** Li et Yang 紫梨木蝨 (Li et Yang 232; Yunn., 1987:326)
Psylla chaenomelei Li et Yang, 1984:232.
寄 主：紫梨 (皺皮木瓜)(*Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai)。
分 佈：雲南。

618. **Psylla changli** Yang et Li 昌梨木虱 (Yang et Li, 1981:42)
Psylla changli Yang et Li, 1981:42.
寄 主：梨。
分 佈：河北。

619. **Psylla chinensis** Yang et Li 中國梨木蝨 (ASZI, 1986, 1:197; Bai et al., 1993(2):50; Cao, 1990, (3):14-16; Cao et Tan, 1997(1):32-35; Chai et al., 1994(3):35; Chen, 1998(4):52; Chen et Fang, 1999(2):43; Chen et Wang, 1987:121-122; Feng, 1997(1):41-43; Gong, 1997:42-43; Gu et Zhang, 1996, 23(1):8-12; Guo et Guo, 1999:45; Gao et Li, 1997(3):33; Guo et al., 1998(3):36; Han et al., 2000(2):57-58; Huang, 1990[ed.] 2:105-106; Jiang et Zhang, 1995(2):31-33; Jiang, et al., 1993(2):28; Jiang et al., 1998(4):15; Lan et Cao, 1998(2):36; Li, 1996, 13(4):275-276; Li et al., 1996:42; Li et al., 1996(2):49; Li et al., 1998(1):11; Li et al., 1999:22-23; Liu, 1999:45; Liu et Gao, 1999(1):21; Liu et al., 1995(4):5; Lu, 1990, (1):14-16; Qu et al., 1996:27; Su et Gao, 1999(4):53; Wang, 1993(4):42; Wang, 1994, 11(4):224; Wang et Wang, 1996(2):42-43; Wang et Wang, 2000(1):49; Wang et al., 1998(3):20-21; Wang et al., 1998(2):16; 1998(4):10-11, 13; Wei, 1995: 25-26; Yan, 1996(1):39; Yue et Ren, 1994(4):23; Zhang, 1992, 18(5):11-12; Zhang, 1997(3):41-42; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zhu et al., 1996(2):30, 39; Zhu et al., 1996(3):16-17; Zuo et al., 1998(1):33-34; Zhao et al., 1998(4):29)
Psylla chinensis Yang et Li, 1981:37.
別 名：*梨木虱*。
寄 主：杜梨、鴨梨、鴨廣梨、蘋果。
分 佈：浙江、河南、陝西、寧夏、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧。

620. **Psylla citricola** Yang et Li 柑橘木蝨 (Yunn., 1987:321)
Psylla citricola Yang et Li, 1984:261.
寄 主：柚、酸橙。
分 佈：雲南。

621. **Psylla citrisuga** Yang et Li 柚木蝨 (Yunn., 1987:321, 332)
Psylla citrisuga Yang et Li, 1984:260.
寄 主：柚、橙。
分 佈：雲南。

622. **Psylla dianli** Li et Yang 滇梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla dianli Li et Yang, 1984:231.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

623. **Psylla erhaili** Li et Yang 洱海梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla erhaili Li et Yang, 1984:228.
寄 主：梨樹。

分 佈：雲南。

624. **Psylla heterobetulaefoliae** Yang et Lin 異杜梨木虱 (Yang et Li, 1981:40)
Psylla heterobetulaefoliae Yang et Li, 1981:40.
寄 主：杜梨。
分 佈：河北、北京。

625. **Psylla jiangli** Yang et Li 疆梨木蝨 (ASZI 1986, 1:198; Yang et Li, 1981:44)
Psylla jiangli Yang et Li, 1981:44.
寄 主：梨樹。
分 佈：新疆。

626. **Psylla kunmingli** Li et Yang 昆明梨木蝨 (Yunn.1987:321)
Psylla kunmingli Li et Yang, 1984:222.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

627. **Psylla liaoli** Yang et Li 遼梨木虱 (Pang et Pang, 1990:365-368; Yang et Li, 1981:43)
Psylla liaoli Yang et Li, 1981:43.
別 名：*梨脊木虱*。
寄 主：洋梨(*Pyrus communis* Linnaeus)、白梨(*Pryrus bretschneideri* Rehd.)、山梨(*Pyrus ussuriensis* Maxim)。
分 佈：山西、遼寧。

628. **Psylla phaeocarpae** Yang et Li 褐梨木虱 (Yang et Li, 1981:42)
Psylla phaeocarpae Yang et Li, 1981:42.
寄 主：褐梨。
分 佈：陝西、河北、北京。

629. **Psylla pyri** (Linnaeus) 梨木蝨 (ASZI, 1986, 1:198; Yang et Li, 1981:41)
寄 主：西洋梨。
分 佈：新疆；高加索、格魯吉亞、中亞細亞、歐洲。
天 敵：*Coccophagus lycimnia* (Walker) 賴食蚧矮小蜂

630. **Psylla pyrisuga** Förster 梨廣木蝨 (Li, 1994:30; NZWDI, 1981:1737)
寄 主：梨。
分 佈：全國。

631. **Psylla qianli** Li et Yang 黔梨木虱 (Chou et Fang, 1994:467-468; Li et Yang, 1984:220)
Psylla qianli Li et Yang, 1984:220.
寄 主：梨。
分 佈：臺灣、貴州。

632. **Psylla simaoli** Li et Yang 思茅梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla simaoli Li et Yang, 1984:225.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

633. **Psylla xanthisma** Li et Yang 黃梨木虱 (Li et Yang, 1984:221)
Psylla xanthisma Li et Yang, 1984:221.
寄 主：梨。
分 佈：貴州。

634. **Psylla xiaguanli** Li et Yang 下關梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla xiaguanli Li et Yang, 1984:227.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

635. **Psylla yunli** Li et Yang 雲梨木蝨 (Yunn., 1987:326)
Psylla yunli Li et Yang, 1984:229.
寄 主：梨樹。
分 佈：雲南。

636. **Psylla sp.** 梨木虱 (Zhang, 1987[ed.]:57)
寄 主：棠梨、梨、沙果。
分 佈：江西。

637. **Sinitrioza rubisuga** Li et Yang 木莓華個木虱 (Li et Yang, 1984:181)
Sinitrioza rubisuga Li et Yang, 1984:181-183.
寄 主：*Rubus hupehensis* Oliv. 木莓
分 佈：福建(建陽坳頭)。

638. **Tenaphalara dimocarpi** Yang et Li 龍眼喬木虱 (He et al., 1994(1):41; Yang et Li, 1985:211)
Tenaphalara dimocarpi Yang et Li, 1985:211.
寄 主：龍眼。
分 佈：福建(廈門市)。

639. **Tenaphalara mengiferae** Yang et Li 檬果喬木蝨 (Yunn., 1987:311)
Tenaphalara mengiferae Yang et Li, 1985:210.
寄 主：檬果。
分 佈：雲南。

640. **Trichochermes sanxiaensis** Li 三峽毛個木蝨 (Li, 1997:365)
Trichochermes sanxiaensis Li, 1997:365-366.
寄 主：馬尾松。
分 佈：四川。

641. **Trichochermes sinicus** Yang et Li 中華毛個木蝨 (Li, 1997:366)
Trichochermes sinicus Yang et Li, 1985:
寄 主：馬尾松。
分 佈：湖北、陝西、山西、河北、北京、甘肅、寧夏。

642. **Trioza aterigenae** Li et Yang 黑鍾黑個木蝨 (Li et Yang, 1992:351)
Trioza aterigenae Li et Yang, 1992:3511-353.
寄 主：沙棘(*Hippophae rhamnoides* L.)

分 佈：四川。

643. **Trioza bicolorata** Li 兩色個木蝨 (Li, 1997:369)
Trioza bicolorata Li, 1997:369-370.
寄 主：馬尾松。
分 佈：四川。

644. **Trioza citrilyma** Yang et Li 柑橘個木蝨 (Yang, 1987:326, 333)
寄 主：柑橘。
分 佈：雲南。

645. **Trioza citroimpura** Yang et Li 柑橘個木虱 (Yang et Li, 1984:261)
Trioza citroimpura Yang et Li, 1984:261.
寄 主：柑橘(*Citrus reticulata* Blanco)。
分 佈：雲南。

646. **Trioza elaeagni** Scott 沙棗綠個木蝨 (Li, 1996:73)
Trioza elaeagni Scott, 1879:252.
寄 主：沙棗(*Elaeagnus angustifolia* Linnaeus)。
分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞、高加索、俄羅斯(歐洲部分)。

647. **Trioza magnisetosa** Loginova 沙棗木虱 (Beijing FC., 1980[ed.]:208-210; Li, 1996:74; Wang, 1987[ed.]:247-248; Xiao, 1992:190)
Trioza magnisetosa Loginova, 1964:479.
寄 主：沙棗、梨、李、櫻等多種果樹、楊屬、柳屬。
分 佈：陝西、山西、河北、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、哈薩克斯坦、中亞、高加索、土耳其、俄羅斯(歐洲部分)。

648. **Trioza outeiensis** Yang (Yang, 1999:45)
Trioza outeiensis Yang, 1984:
寄 主：巴西蒲桃(*Eugenia* sp.)。
分 佈：臺灣。

649. **Trioza resupina** Li et Yang 雙莖個木虱 (Li et Yang, 1984:176)
Trioza resupina Li et Yang, 1984:176.
寄 主：*Syzygium grijsii* (Hance) Merr. et Perry 山烏珠(桃金娘科)
分 佈：福建(建陽)。

650. **Trioza rhabdoclada** Li 棒突個木虱 (Li, 1990:216)
Trioza rhabdoclada Li, 1990:216.
寄 主：馬尾松。
分 佈：內蒙古。

651. **Trioza** sp. 蓮霧麥木虱 (Luo et Li, 1998:88; Luo et al., 1996:86)
寄 主：蓮霧。
分 佈：海南。

652. 枸杞木蝨 (Zhao et al., 1999(3):60)

寄 主：枸杞。
分 佈：寧夏。

Aleyrodidae 粉蝨科
(Ko et Wu, 1996:326-327; Tao, 1979:311-334)

653. **Acanthaleyrodes callicarpae** Takahashi 杜紅花粉蝨 (Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:7; Tao, 1979:311; Tsai, 1965:43)
Acanthaleyrodes callicarpae Takahashi, 1931:221.
別 名：*白刺粉虱*。
寄 主：草莓、葡萄、杜紅花、野桐。
分 佈：臺灣。

654. **Aleurocanthus cheni** Young 陳氏粉蝨 (Huang, 1990[ed.] 2:213)
Aleurocanthus cheni Young.
寄 主：柑橘。
分 佈：

655. **Aleurocanthus citriperdus** Quaintance et Baker 橘粉蝨 (Chao, 1982:83; Ko, 1994:697; Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:14)
Aleurocanthus citriperdus Quaintance et Baker, 1916:459-463.
=*Aleurocanthus cameroni* Corbett, 1935:799-800.
寄 主：柑橘、梨、葡萄、柿。
分 佈：中國、福建、香港；越南、馬來西亞、新加坡、爪哇、蘇門答臘、印度、斯里蘭卡。
天 敵：*Ablerus macrochaeta* ssp. *inquirendus* Silvestri (印尼)
Encarsia merceti Silvestri (中國,馬來亞,印尼,斯里蘭卡)
Encarsia divergens (Silvestri) (中國,馬來亞,印尼,斯里蘭卡)
Encarsia smithi (Silvestri) (中國,馬來亞,印尼,斯里蘭卡)
Eretmocerus serius Silvestri (中國,馬來亞,印尼,斯里蘭卡)
Platygasteridae 扁細蜂科
Amitus hesperidum Silvestri (中國,馬來亞,新加坡,爪哇,斯里蘭卡)

656. **Aleurocanthus eugeniae** Takahashi 蒲桃粉蝨 (Mound et Halsey, 1978:16; Tao, 1979:312; Tsai, 43)
Aleurocanthsu eugeniae Takahashi, 1933:20.
寄 主：蒲桃類。
分 佈：臺灣。

657. **Aleurocanthus spiniferus** (Quaintance) 黑刺粉蝨 (Chang, 1987:40; Chao, 1982:83; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(4):27; Chen et Huang, 1994, (4):33-34; Chen et al., 1998, 15(3):34-35; Chen et al., 1999, 26(4):338-342; Chien et Chiu, 1986:223-229; Chiu et al., 1985:1-8; Han et Zhang, 1993:139-140; He et al., 2000(1):21; Huang, 1990[ed.] 2:213-216; Huang et Gan, 1996:170; Hun., 1992:213; Ko, 1994:699; Li, 1999(2):20; Lin, 1960:10; Lin, 1979:38; Luo et Li, 1998:21, 98; Lu, 1996(2):48-49; Mound et Halsey, 1978:21; NZWDI, 1981:1884; Pan, 1998(1):34; Shi & al., 1989-'90:81; Sun et Fang, 1992, 21(2):31; Tao, 1979:312; Tan, 1999(1):16; Ting, 1999(3):19; Wang et al., 1995(2):43, 42; Yu et Fang, 1996(4):41-42; Zhang, 1985[ed.]: 167-169; Zhang, 1987[ed.]:57; Zhang et Ren, 1995(1):43; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1995(4):39; Zhao et al., 1997, 14(4):32-33)
Aleurodes spiniferus Quaintance, 1903:63.
=*Aleurodes citricola* Newstead, 1911:173.
=*Alerocanthus spiniferus*, Quaintance et Baker, 1914:102.
別 名：*刺粉蝨*、*橘刺粉蝨*、*柑橘刺粉蝨*、*油茶黑刺蝨*。

寄 主：柑橘類、橄欖、葡萄、蘋果、花紅、梨、桃、枇杷、柿、釋迦、牛心梨、番石榴、龍眼、板栗、桑、可可、香蕉、椰子、檳榔、胡椒、薔薇、玫瑰、茶花、茶、油茶、女貞、楓、樟、柳、楠木、伊立基藤、猴歡喜、杜英、烏桕、柞、榆、白楊、木通、花椒、筆羅子、春蘭。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、河南；日本、菲律賓，越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、摩里達斯、馬利亞納、加羅林群島、夏威夷。

天 敵：*Chrysopa boninensis* Okamoto　安平草蛉

Chilocorus kuwanai Silvestri　紅點唇瓢蟲

Cryptognatha sp. (中國，日本)

Delphastus sp. (日本)

Serangium sp.　粉虱小黑瓢蟲

Serangium japonicum Chapin　刀角瓢蟲(福建)

Drosophilidae　果蠅科

Acletoxenus sp.　粉虱蠅

Aphelinidae　矮小蜂科

Ablerus macrochaeta Silvestri (中國)

Aphytis sp.

Coccophagus sp.

Encarsia divergens (Silvestri)

Encarsia ishii (Silvestri) (中國，日本)

Encarsia merceti Silvestri

Encarsia merceti var. *modesta* Silvestri

Encarsia japonica Viggiani　日本恩矮小蜂(福建，日本)

Encarsia obtusiclava Hayat　鈍棒恩矮小蜂(福建，印度)

Encarsia smithi (Silvestri)　黃盾恩矮小蜂(中國，日本)

Eretomocerus sevius Silvestri,

Eretmocerus silvestri Gerling (中國)

Platygasteridae　扁腹細蜂科

Amitus hesperidum Silverstri　粉虱扁腹細蜂 (中國，日本)

Amitus hesperidum var. *varipes* Silvestri (中國，蘇門答臘)

Amitus sp. (日本)

Aegerita webbneri Fawc.　真菌

Aschersonia aleyrodis Wehbeer　赤座霉

658. **Aleurocanthus spinosus** (Kuwana) 刺毛粉蝨 (Chao, 1982:83; Mound et Halsey, 1978:23; Tao, 1979:312; Tsai, 1965:43)

Aleyrodes spinosus Kuwana, 1911:626.

Aleurocanthus spinosus, Quaintance et Baker, 1914:102.

寄 主：柑橘、梨、黃槐子、風藤、魯花樹、野牡丹。

分 佈：臺灣、中國大陸；菲律賓。

天 敵：*Encarsia clypealis* Silvestri (菲律賓)

Encarsia sp. (菲律賓)

659. **Aleurocanthus woglumi** Ashby 柑黑刺粉虱 (Ko, 1994:701; Huang, 1990[ed.]2:213; Luo et al., 1996:54)

Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915:321-322.

=*Aleurocanthus punjabensis* Corbett, 1935:8-9.

=*Aleurocanthus woglumi* var. *formosana* Takahashi, 1935:281-283.

寄 主：檬果、腰果、冷子釋迦、釋迦、刺番荔枝、木瓜、桑、香果、馬來蒲桃、番石榴、百香果、石榴、咖啡樹、星蘋果、蛋黃果、來母、甜橙、香橙、柚、枸櫞、蜜果、人心果、桑寄生、紫薇、黃褥花、木槿、裂瓣朱槿、樹蘭、珊瑚藤、臺灣火刺木、夜來香、仙丹花、羊角藤、月橘等。

分 佈：臺灣、海南、中國；菲律賓、婆羅洲、馬來西亞、新加坡、爪哇、蘇門答臘、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、馬達加斯加、塞昔耳群島、非洲、伊朗、夏威夷、美國、中美洲。

天 敵：*Chrysopa* sp. (馬來亞,牙買加,巴拿馬)

Coccinellidae 瓢蟲科

Cryptognatha flaviceps (Crotch) (巴拿馬)

Cryptognatha sp. (馬來亞，蘇門答臘)

Delphastus catalinae Horn (牙買加)

Delphastus diversipes (Champion) (牙買加)

Hyperaspis albicollis Gorham (巴拿馬)

Hyperaspis calderana Gorham (巴拿馬)

Microweisea castanea Mulsant (巴拿馬)

Scymnillodes aeneus Sicard (牙買加)

Scymnillodes cyanescens Sicard (牙買加)

Scymnus coloratus Gorham (巴拿馬)

Scymnus gorhami Weise (巴拿馬)

Scymnus horni Gorham (巴拿馬)

Scymnus thoracicus (Fabricius) (巴拿馬)

Nitidulidae 出尾蟲科

Cybocephalus sp. (爪哇)

Pyralidae 螟蛾科

Cryptoblabes gnidiella (Milliere) (蘇門答臘,印度)

Drosophilidae 果蠅科

Acletoxenus indica Malloch (爪哇)

Acletoxenus sp. (蘇門答臘)

Aphelinidae 矮小蜂科

Ablerus connectens Silvestri (斯里蘭卡)

Ablerus macrochaeta ssp. *inquirendus* Silvestri (新加坡)

Cales noacki Silvestri

Encarsia divergens (Silvestri) (馬來亞,新加坡,爪哇,蘇門答臘,印度)

Encarsia ishii (Silvestri) (中國)

Encarsia merceti Silvestri (菲律賓,馬來亞,新加坡,印尼,印度)

Encarsia smithi (Silvestri) 黃盾恩矮小蜂(中國,斯里蘭卡)

Encarsia sp. (斯里蘭卡,蘇門答臘)

Eretmocerus serius Silvestri (馬來亞,新加坡,印尼,緬甸,斯里蘭卡,夏威夷,美國,海地,古巴,牙買加)

Encyrtidae 跳小蜂科

Pseudhomalopoda prima Girault (牙買加)

Mymaridae 魅小蜂科

Gonatocerus cubensis Dozier (海地)

660. **Aleurocybotus setiferus** Quaintance et Baker 剛毛狹粉虱 (Ko, 1994:705; Mound et Halsey, 1978:30; Tao, 1979:312)
Aleurocybotus setiferus Quaintance et Baker, 1917:357.
寄 主：柑橘類、露兜樹、白茅。
分 佈：臺灣；菲律賓、馬來西亞、爪哇、泰國、斯里蘭卡。
天 敵：*Encarsia persequens* Silvestri　矮小蜂(菲律賓)

661. **Aleurodes marlati** Quaintance 馬氏粉虱 (Chen, 1995:26-27)
寄 主：柑橘、山楂、花椒。
分 佈：我國南部柑橘產區、山東；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼。

662. **Aleurodicus dispersus** Russell 螺旋粉虱 (Ko, 1994:755; Mound et Halsey, 1978:231; Wen, 1996:389; Wen et al., 1994:421-431; 1995:147-156; 1996:39-47; 1997:139-149)
Aleurodicus dispersus Russell, 1965:49-54.
寄 主：被害植物達 22 科 44 種，包括櫻桃屬、來母、欖果、釋迦、酪梨、番石榴、人心果、咖啡、芭蕉屬、可可椰子等。
分 佈：臺灣；菲律賓、新幾內亞、夏威夷、美國、中美、南美等地區。
附 註：臺灣於 1990 年左右發現由國外輸入於南部鳳山地區繁殖，以後逐漸向中部地區擴散，嚴重爲害番石榴、聖誕紅、辣椒等。

663. **Aleurolobus citri** Takahashi (Chao, 1982:83; Mound et Halsey, 1978:32; Tao, 1979:312)
Aleurolobus citri Takahashi, 1932:34.
寄 主：柑橘類等。
分 佈：臺灣、福建；柬埔寨。

664. **Aleurolobus marlatti** (Quaintance) 馬氏粉蛾 (Chao, 1982:83; Huang, 1990[ed.] 2:213; Lin, 1960:11; Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:34; Tsai, 1965:44; Shi et al. 1989-'90:81; Tao, 1979:313; Zhang, 1987[ed.]: 58)
Aleurodes marlatti Quaintance, 1903:61.
=*Aleurocanthus spiniferus*, Shiraki et Maki, *nec* Quaintance.
別 名：*橘黑粉虱*、*黑粉虱*。
寄 主：無花果、葡萄、柑橘、柚、黎檬、梨、山楂、棗、夜來香、梔子花、油茶、樟、柞木。
分 佈：臺灣、江西、西南、華南、華中、華東、華北；日本、菲律賓、越南、馬來亞、印尼、印度、斯里蘭卡、美國。
天 敵：*Eretmocerus aleurolobi* Ishii (日本)

665. **Aleurolobus setigerus** Quaintance et Baker 番石榴粉蛾 (Mound et Halsey, 1978:38; Tao, 1979:313; Tsai, 1965:44)
Aleurolobus setigerus Quaintance et Baker, 1917:372.
寄 主：番石榴、魯花樹。
分 佈：臺灣、香港、中國大陸；泰國、斯里蘭卡。

666. **Aleurolobus subrotundus** Silvestri 黑圓粉虱 (Chao, 1982:83; Lin, 1960:88; Mound et Halsey, 1978:39; Zhang, 1987[ed.]:58)
Aleurolobus subrotundus Silvestri, 1927:13-14.
寄 主：柑橘、黃皮。
分 佈：福建、江西；越南。
天 敵：*Encarsia armata* (Silvestri) (越南)

667. **Aleurolobus szechwanensis** Young 四川粉蚤 (Huang, 1990[ed.] 2:213)
寄 主：柑橘。
分 佈：四川。

668. **Aleurolobus taonobae** Kuwana 葡萄眼粉虱 (Lin, 1991:38)
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

669. **Aleuroplatus pectiniferus** Quaintance et Balker 脂粉蚤 (Chao, 1982:83; Mound et Halsey, 1978:53; Tao, 1979:313; Tsai, 1965:44)
Aleuroplatus pectiniferus Quaintance et Baker, 1917:393.
別 名：*膠扁粉虱*。
寄 主：無花果、蒲桃、桑、柳、茄苳、臺灣檵木、白肉榕、木頭茶、梵天花、加入樹。
分 佈：臺灣、福建；印度。

670. **Aleurotrachelus alpinus** Takahashi (Mound et Halsey, 1978:67; Tao, 1979:313)
Aleurotrachelus alpinus Takahashi, 1940:29.
寄 主：懸鉤子(*Rubus* sp.)。
分 佈：臺灣。

671. **Aleurotrachelus caerulescens** Singh 楊梅圓粉蚤 (Mound et Halsey, 1978:67; Tao, 1979; Tsai, 1965:44)
Aleurotrachelus caerulescens Singh, 1931:59.
別 名：*月桃頂粉虱*。
寄 主：楊梅、錫蘭橄欖、桑、朴樹、茄苳、黃梔子、魯花樹、紫薇。
分 佈：臺灣、印度。

672. **Aleurotrachelus camelliae** (Kuwana) 黑膠粉蚤 (Chao, 1982:83; Mound et Halsey, 1978: 68; Zhang, 1987[ed.]: 58)
Aleyrodes camelliae Kuwana, 1911:625-626.
Aleurotrachelus camelliae, Quaintance et Baker, 1914:103.
寄 主：龔、桑、茶、油茶、烏桕、柞木。
分 佈：福建、江西、香港；日本。

673. **Aleurotrachelus rubi** Takahashi 草莓粉蚤 (Mound et Halsey, 1978:76; Tsai, 1965:45)
Aleurotrachelus rubi Takahashi, 1933:16-17.
寄 主：樹莓(*Rubus* sp.)。
分 佈：臺灣；日本。

674. **Aleurotrachelus turpiniae** Takahashi 山香圓粉蚤 (Mound et Halsey, 1978:78; Tsai, 1965:45)
Aleurotrachelus turpiniae Takahashi, 1932:45.
寄 主：柿、臺灣山香圓。
分 佈：臺灣。

675. **Aleurotuberculatus aucubae** (Kuwana) 珊瑚瘤粉虱 (Lin, 1960:88; Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:79; Shi et al., 1989-'90:81; Zhang, 1987[ed.]:58, 59)
Aleyrodes aucubae Kuwana, 1911:625.
Aleurotuberculatus aucubae, Takahashi, 1932:20.

別 名：*珊瑚粉虱*，*小黑粉虱*，*黑點瘤粉虱*。
寄 主：柑橘、李、梅、葡萄、桑、油茶、樟、柞樹、"王梢刺"、女貞等。
分 佈：江西、上海；日本。
天 敵：*Encarsia* sp. (日本)

676. **Aleurotuberculatus ficicola** Takahashi 崖石榴粉蚧 (Mound et Halsey, 1978:82; Tao, 1979:314; Tsai, 1965:45)
Aleurotuberculatus ficicola Takahashi, 1932:314.
別 名：*榕褐疣粉虱*。
寄 主：桑、崖石榴、榕類。
分 佈：臺灣。

677. **Aleurotuberculatus gordonia** Takahashi 大頭茶疣粉虱 (Mound et Halsey, 1978:82; Tao, 1979:314; Zhang, 1987[ed.]:58)
Aleurotuberculatus gordonia Takahashi, 1932:21.
別 名：*樟粉虱*。
寄 主：梨、桑、正榕、樟樹等。
分 佈：臺灣、香港。

678. **Aleurotuberculatus guyavae** Takahashi 番石榴黑粉蚧 (Mound et Halsey, 1978:83; Tao, 1979:315; Tsai, 1965:45)
Aleurotuberculatus guyavae Takahashi, 1932:22.
寄 主：番石榴、樟屬。
分 佈：臺灣、香港。

679. **Aleurotuberculatus jasmini** Takahashi 黃皮粉蚧 (Chao, 1982:84; Mound et Halsey, 1978:83; Takahashi, 1955:222; Tao, 1979:315)
Aleurotuberculatus jasmini Takahashi, 1932:26.
寄 主：柑橘、黃皮、月橘、素馨等。
分 佈：臺灣、廣東、香港；馬來亞、泰國、印度。

680. **Alerurotuberculatus murrayae** Singh 小蔓粉虱 (Lin, 1991:38)
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

681. **Aleurotuberculatus psidii** (Singh) 番石榴白粉蚧 (Ko, 1994:712; Mound et Halsey, 1978:87; Tao, 1979:316; Tsai, 1965:46; Wen et Lee, 1985:105-109)
Aleurotrachelus psidii Singh, 1931:61.
Aleurotuberculatus psidii, Takahashi, 1932:20.
別 名：*番石榴白疣粉虱*。
寄 主：龍眼、荔枝、李、番石榴、蒲桃、香果(*Eugenia jambos*)、桑、柳、榎、朴樹、樟、接骨木、冇骨消、刺土密、山花屬。
分 佈：臺灣、香港；馬來亞、泰國、印度。

682. **Asialeyrodes euphoriae** Takahashi 龍眼亞洲粉虱 (Chou & Yan, 1988:243; Mound et Halsey, 1978:103; Yan, 1988:50)
Asialeyrodes euphoriae Takahashi, 1942:204.
寄 主：龍眼。
分 佈：海南；泰國、印度。

683. **Asterobemisia fujianensis** 福建黑粉虱 (Lin, 1991:38)
Asterobemisia fujianensis
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

684. **Bemisia argentifolii** Bellows et Perring 銀葉粉蝨 (Chen et Chang, 1996:383; Hsin et al., 1996:383; Lin et al., 1995:379-380; 1997:66-79)
寄 主：園藝作物的蔬菜、花卉、果樹等。
分 佈：臺灣(1990 年侵入)。

685. **Bemisia giffardi** (Kotinsky) 長粉蝨 (Chao, 1982:84; Huang, 1990[ed.] 2:213; Huang et Gao, 1996:171; Ko, 1994:717; Lin, 1960:89; Mound et Halsey, 1978:113; Tao, 1979:317; Tsai, 1965:47; Zhang, 1987[ed.]:58)
Aleyrodes giffardi Kotinskky, 1907:94.
Bemisia giffardi, Quaintance et Baker, 1914:100.
=*Bemisia giffardi bispina* Young, 1942:98-99.
=*Asterobemisia helyi* Dumbleton, 1956:172-173.
=*Bemisia jasminum* David et Subramaniam, 1976:181-182.
別 名：*姬粉蝨*。
寄 主：柑橘、柚、檸檬、黃皮、破布子、茉莉花、素馨、山素花。
分 佈：臺灣、福建、江西；日本、越南、馬來西亞、爪哇、蘇門答臘、泰國、印度、尼泊爾、澳洲、新喀里多尼亞、夏威夷。
天 敵：*Encarsia strenua* (Silvestri) (中國，馬來亞，爪哇，蘇門答臘)

686. **Bemisia giffardi bispina** Young 雙刺長粉虱 (Huang, 1990[ed.] 2:213; Huang et Gao, 1996:171; Zhang, 1987[ed.]:58)
寄 主：柑橘類。
分 佈：福建、江西。

687. **Bemisia tabaci** (Gennadius) 煙草粉虱 (Cai, 1996, 22(6):48; Chao, 1982:84; Hsin et al., 1996:383; Ko, 1994:719; Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:118; Tao, 1979:317)
Aleurodes tabaci Gennadius, 1889:1.
=*Aleurodes inconspicua* Quaintance, 1900:28-29.
=*Bemsia emiliae* Corbett, 1926:273.
=*Bemsia costa-limai* Bondar, 1928:27-29.
=*Bemsia signata* Bondar, 1928:29-30.
=*Bemsia bahiana* Bondar, 1928:30-31.
=*Bemsia gossypieperda* Misra et Lamba, 1929:1-7.
=*Bemsia achyranthes* Singh, 1931:82-83.
=*Bemsia hibisci* Takahashi, 1933:17-18.
=*Bemsia longispina* Priesner et Hosny, 1934:6.
=*Bemsia gossypieperda* var. *mosaicinectura* Ghesquiere, 1934:30.
=*Bemisia goldingi* Corbett, 1935:249-250.
=*Bemsia nigeriensis* Corbett, 1935:250-252.
=*Bemsia rhodesiaensis* Corbett, 1936:22.
=*Bemsia manihotis* Frappa, 1938:30-32.
=*Bemsia vayssierei* Frappa, 1939:255-258.
=*Bemsia* (*Neobemisia*) *hibisci* Takahashi, 1941:8.
=*Bemsia* (*Neobemisia*) *rhodesiaensis* Corbett, 1941:8.
=*Bemsia loniceraе* Takahashi, 1957:16-17.
=*Bemsia minima* Danzig, 1964:638, 640 [327-328].
=*Bemsia miniscula* Danzig, 1964:640 [328].
寄 主：甚多，達 60 科 319 種，包括釋迦、葡萄、桑、茶藨子(*Ribes cynosbati*, *R.*

gracile, R. grossularia)、洛神葵、小葉桑、蒲桃屬、石榴、梨、西洋梨、柑橘類、芭蕉屬等。

分 佈：臺灣、福建、中國大陸；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、模里西斯、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、蘇聯、澳洲、新幾內亞、斐濟、加羅林群島、百慕達、中美、南美。

傳 病：雙生病毒(Geminivirus)
煙草曲葉病(Tobacco leaf curl)
南瓜曲葉病(Squash leaf curl)
蕃茄黃曲葉病(Tomato yellow leaf curl)
蕃茄曲葉病(Tomato leaf curl)
木瓜曲葉病(Papaya leaf curl)
藿香薊曲葉病(*Ageratum conyzoides* leaf curl)
苦苣菜曲葉病(Sowthistle leaf curl)
水通菜曲葉病(*Sphenoclea zeylanica* leaf curl)
豨薟曲葉病(*Siegesbackia orientalis* leaf curl)
豨薟曲葉病(*Siegesbackia orientalis* yellow vein)
鱧腸黃脈病(*Eclipta prostrata* yellow vein)

天 敵：Phytoseiidae　植綏蟎科
Amblyseius aleyrodis El Badry　(蘇丹)
Typhlodromus medanicus El Badry　(蘇丹)
Typhlodromus sudanicus El Badry　(蘇丹)
Chrysopidae　草蛉科
Encarsia partenopea Masi　(埃及)
Encarsia smithi (Silvestri)　黃盾恩矮小蜂
Encarsia transvena (Timberlake)　淺黃恩矮小蜂(福建,日本,印度,巴基斯坦,非洲,夏威夷)
Encarsia sp.　(蘇丹)
Eretmocerus corni Haldeman　(埃及)
Eretmocerus diversiciliatus Silvestri　(蘇丹)
Eretmocerus masii Silvestri
Eretmocerus mundus Mercet　(蘇聯)
Ceraphronidae　圓腹細蜂科
Aphanogmus fumipennis Thomson　(Zaire)

688. **Dialeurodes bladhiae** Takahashi 樹杞粉蝨 (Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:131; Tao, 1979:317; Tsai, 1965:48)
Dialeurodes bladhiae Takahashi, 1931:219.
別 名：*蒲桃粉虱*。
寄 主：葡萄、蒲桃、石櫟類、銳葉栲木、樹杞、珊瑚樹。
分 佈：臺灣、福建、香港；泰國。

689. **Dialeurodes cinnamomi** Takahashi 蒲桃粉蝨 (Mound et Halsey, 1978:133; Tao, 1979:318; Tsai, 1965:48)
Dialeurodes cinnamomi Takahashi, 1932:13.
寄 主：蒲桃、樟、日本桂、厚殼桂。
分 佈：臺灣。

690. **Dialeurodes citri** (Ashmead) 橘黃粉蝨 (Chao, 1982:84; Chen, 1985(3):37; Chen et Kuang, 1995(1):1923; Huang, 1990[ed.] 2:213; Huang et Gao, 1990:170; Hun., 1992:214; Lin, 1960:90; Mound et Halsey, 1978:133; Sun et Shi, 1979: 173; Tao, 1979:318; Zhang, 1985[ed.]:169-170; Zhang, 1987[ed.]:58)

Aleyrodes citri Ashmead, 1885:704.

=*Aleurodes citrifolii* Foster; Riley et Howard, 1892:274. Nome nudum.

=*Aleurodes eugeniae* var. *aurantii* Maskell, 1895:431-432

=*Aleurodes kuchinasii* Sasaki, 1908:55-56.

=*Dialeurodes tuberculatus* Takahashi, 1932:9.

=*Dialeurodes citri* var. *kinyana* Takahashi, 1935:43-44.

=*Dialeyrodes citri* var. *hederae* Takahashi, 1936:219.

別 名：*柑橘粉蝨*、*橘綠粉蝨*、*黃粉蝨*、*柑橘雙孔粉虱*。

寄 主：有 30 科，包括柑橘、桃、柿、板栗、咖啡、梔子、素馨、長春藤、犬樟、神子木桃、赤木犬茶、油茶、女貞、苦楝、欖。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西；泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、日本、蘇聯、土耳其、意大利、美國、墨西哥、智利、巴西。

天 敵：*Aleurodothrips fasciapennis* (Franklin) 斑翅管蓟馬(臺灣,美國)

Chilocorus stigma (Say) 瓢蟲

Cryptognatha flaviceps (Crotch) (印度)

Cycloneda sanguinea (Linnaeus)

Delphastus catalinae Horn (美國)

Scymnus punctatus Melsheimer

Serangium sp.

Verania cardoni Weise

Aphytis proclia (Walker) (印度)

Encarsia formosa Gahan

Encarsia citri (Ishii) (日本)

Encarsia citrofila (Silvestri) (中國,日本,印尼,印度)

Encarsia lahorensis (Howard) (中國,日本,印度)

Encarsia tricolor Förster

Encarsia sp. (印度)

691. **Dialeurodes citricola** Young 柑橘綠粉蝨 (Huang, 1990[ed.] 2:213)

寄 主：柑橘。

分 佈：中國。

692. **Dialeurodes citrifolii** (Morgan) 內齒雙孔粉虱 (Ko, 1994:729; Mound et Halsey, 1978:135)

Aleyrodes citrifolii Morgan, 1893:70-74.

=*Aleyrodes nubifera* Berger, 1909:68-70.

別 名：*雲翅粉蝨*。

寄 主：柑橘、來母(*Citrus aurantifolia*)、香橙(*C. aurantium*)、椪柑(*C. reticulata*)、柿、梨、梅、懸鉤子、香果、石榴、茶、茶花、素馨女貞、樟、油茶、長春藤、梔子、丁香落葉榕、苦楝、茄苳、豬腳楠、倒卵葉饅頭果、三葉山香圓、鵝掌柴、楓杞、猿尾藤、石欖、筆羅子、臺東火刺木、臺灣白腳蜈蚣等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、湖北、安徽、浙江、江蘇、河南、陝西；日本、越南、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、歐洲、蘇聯、北美洲、百慕達、墨西哥、中美洲、古巴、南美洲。

天 敵：*Amblyseius eharai* Amitai & Swirki 江原鈍綏蟎

Semidalis aleyrodiformis (Stephens) 廣重粉蛉
Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉(亞非草蛉)
Orius similis Zheng 南方小花蝽
Delphastus catalinae Horn 瓢蟲(美國)
Encarsia perstrenua (Silvestri) (越南)
Encarsia strenua (Silvestri) (印尼)

693. **Dialeurodes kirkaldyi** (Kotinsky) 中條粉蝨 (Ko, 1994:730; Mound et Halsey, 1978:141; Tao, 1979:318)
Aleyrodes kirkaldyi Kotinsky, 1907:95-96.
寄 主：有 10 科，包括甜橙、咖啡等。
分 佈：臺灣、中國；日本、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、非洲、中東、澳洲、新喀多里亞、加羅林群島、馬里亞納群島、夏威夷、美國、中美洲。

694. **Dialeurodes psidii** Corbett 番石榴裸粉虱 (Chou et Yan, 1988:244; Ko, 1994:731; Mound et Halsey, 1978:146; Yan, 1988:50)
Dialeurodes psidii Corbett, 1935:734-735.
寄 主：番石榴、芭蕉(*Musa basjoo*)、茶屬一種(*Camellia* sp.)。
分 佈：雲南、湖南；馬來西亞、沙勞越、泰國、新幾內亞。

695. **Dialeuropora decempuncta** (Quaintance et Baker) 斑點巨孔粉虱 (Ko, 1994:734; Mond et Halsey, 1978:159; Tsai, 1965:50)
Dialeurodes (*Dialuropora*) *decempunctata* Quaintance et Balker, 1917:434.
=*Dialeurodes* (*Dialuropora*) *setigerus* Takahashi, 1932:14.
=*Dialeurodes dothiosensis* Dumbleton, 1961:121-122.
寄 主：梅屬(*Prunus* spp.)、酪梨、釋迦、秘魯釋迦、牛心梨、桑、草莓、印度黃檀、破布子、大戟、豬腳楠、長葉暗羅、薔薇等。
分 佈：臺灣；柬埔寨、馬來西亞、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、東加、新喀里多尼亞。

696. **Parabemisia myricae** (Kuwana) 楊梅粉蝨 (Huang, 1990[ed.] 2:213; Ko, 1994:740; Lin, 1991:38; Mound et Halsey, 1978:177; Suzhou CS., 1985:226-227; Tao, 1979:320; Tsai, 1965:47; Zhang, 1987[ed.]:58; Zheng, 1982:226-227)
Bemisia myricae Kuwanan, 1927:249-251.
Parabemisia myricae, Takahashi, 1952:24.
別 名：*日本山桃粉虱*、*桑粉虱*、*白蝨*、*桑蝨*。
寄 主：桃、李、梅、梨、櫻桃、番石榴、柑橘、柿、楊梅、無花果、桑、錫蘭橄欖、葡萄、茶、杜鵑花、青棒櫟、豬腳楠、擦芽樹、山桂花、重瓣黃梔、柳、垂柳、鐵雞笆、枹樹等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽；日本、馬來西亞、希臘、以色列、夏威夷。
天 敵：七星瓢蟲
龜紋瓢蟲
變形瓢蟲
Chrysopa septempunctata cognata McLachlan 四紋草脈蛉
Encarsia bemisiae Ishii, 1938:30. (日本)

697. **Paraleyrodes bondari** Peracchi 龍速巢粉蝨 (Cheng et al., 1998:427-428)
寄 主：番荔枝、臺灣柿、酪梨、桑樹、蓮霧、番石榴、柑橘類、山黃麻、鴛鴦掌

柴、香蘭等。
分 佈：臺灣(推測可能隨引進之柑橘類或酪梨苗木而入侵)；巴西、中美洲

698. **Pealius mori** (Takahashi) 臺灣桑粉蝨 (Liu, 1995:30-31; Mound et Halsey, 1978:182; Tao, 1979:320; Tsai, 1965:52)
Trialeurodes mori Takahashi, 1932:38.
Pealius mori, Mound et Halsey, 1978:82.
別 名：*白桑皮氏粉虱*。
寄 主：無花果、桑、柳。
分 佈：臺灣；泰國。
天 敵：草蛉
瓢蟲

699. **Pealius polygoni** Takahashi 海葡萄皮氏粉虱 (Mound et Halsey, 1978:182; Tao, 1979:320)
寄 主：桑、*Polygonum* sp. (Polygonaceae)。
分 佈：臺灣；日本。

700. **Setaleyrodes mirabilis** Takahashi 泥沼毛粉虱 (Tao, 1979:322)
Setaleyrodes mirabilis Takahashi, 1931:222.
別 名：*長粉虱*。
寄 主：桑、栓皮櫟。
分 佈：臺灣。

701. **Singhius viticola** 葡萄白粉虱 (Lin, 1991:38)
Singhius viticola
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

702. **Taiwanaleyrodes carpini** Takahashi 千金榆粉虱 (Tao, 1979:322)
Taiwanaleyrodes carpini Takahashi, 1939:78.
=*Taiwanaleyrodes carpini yushuniae* Takahashi, 1932:80.
寄 主：桑、*Carpinus* sp., *Sassafras* (*Yushuniae*) *randaiensis*.
分 佈：臺灣。

703. **Tetraleurodes aucubae** Kuwana 珊瑚粉蝨 (Huang, 1990[ed.] 2:213)
寄 主：柑橘。
分 佈：中國。

704. **Trialeurodes vaporariorum** (Westwood) 白粉蝨 (Cheng et Duan, 1992, 9(2):122; Cui et al., 2000(1):45-47; Hua, 1992:214; Li et Msdvheiyz, 1985:233-235; Liu, 1988:33-41; 426; Mound et Halsey, 1978:219-224; Wang et Yan, 1988, 15(4):283; Wang et al., 1988:404-406; Wang et al., 1996(1):56; Xu et al., 1980, 23(3):265-275; Xu et al., 1981, 1(2):147-158; Zhou et Zheng, 1988, 15(4):277-281)
Aleyrodes vaporariourum Westwood, 1856:852.
=*Asterochiton lecanioides* Maskell, 1879:215-216.
=*Aleurodes papillifer* Maskell, 1890:173.
=*Aleurodes nicotianae* Maskell, 1895:436-437.
=*Aleyrodes sonchi* Kotinsky, 1907:97-98.
Trialeurodes vaporariorum, Quaintance et Baker, 1915:xi,
=*Trialeurodes massopi* Corbett, 1935:9-10.
=*Trialeurodes natalensis* Corbett, 1936:18-19.

=*Trialeurodes sesbaniae* Corbett, 1936:19.
別 名：*溫室粉蝨*。
寄 主：果樹、刺梨、林木、花卉、藥材、蔬菜、雜草等 81 科 270 種植物上寄生，包括柿、美洲胡桃、胡桃、酪梨、番石榴、水蓮霧、青墩果、百香果、桃、懸鉤子、柑橘類、葡萄等。
分 佈：全國各地及世界各地均有分佈。
天 敵：Chrysopidae 草蛉科
Chrysopa rufilabris Burmeister (加拿大)
Cecidomyidae 癭蚊科 (英國)
Encarsia citrella ssp. *porteri* Mercet (智利)
Encarsia formosa Gahan 麗恩矮小蜂(歐洲,蘇聯,北美,澳洲,新西蘭)
Encarsia japonica Viggiani 日本恩矮小蜂(福建,日本)
Encarsia luteola Howard (智利)
Encarsia partenopea Masi (英國)
Encarsia pergandiella Howard (英國,美國, 夏威夷)
Encarsia transvena Timberlake (福建,日本,印度,巴基斯坦,非洲,夏威夷)
Encarsia sp. (夏威夷,荷蘭,羅德西亞)
Eretmocerus corni Haldeman (智利)
Eretmocerus haldemani Howard (美國)
Encyrtidae 跳小蜂科
Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr) (美國)

Adelgidae 球蚜科(Chermesidae)

705. **Adelges laricis** Vallot 落葉松球蚜 (Beijing FC., 1980[ed.]:204-205; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:216-218; Liu, 1982[ed.]: 258-259, Tao, 1999:2)
寄 主：落葉松(針葉)(第二寄主)、紅皮雲杉(嫩梢)(第一寄主)
分 佈：四川、內蒙古、遼寧、黑龍江。
天 敵：*Harmonia axyridis* (Pallas) 異色瓢蟲
Scaeva pyrastri (Linnaeus) 斜斑鼓額食蚜蠅

706. **Aphrastasia pectinatae** (Chlokovsky) 紅松球蚜 (Tao, 1999:2)
Chermes pectinatae Chlokovsky, 1888:47.
Aphrastasia pectinatae,
寄 主：紅松。
分 佈：黑龍江。

707. **Pineus armandicola** Zhang et al. 華山松球蚜 (Zhang et al., 1992:360)
Pineus armandicola Zhang et al., 1992:360-361.
寄 主：*Pinus armendi* 華山松。
分 佈：

708. **Pineus cembrae pinikoreanus** Zhang et Fang 紅松球蚜 (Tao, 1999:3 ; Xiao, 1992:228)
Pineus cembrae pinikoreanus Zhang et Fang, 1983:
寄 主：紅松。
分 佈：山東、遼寧、黑龍江(小興安嶺)。

709. **Pineus cladogenous** Fang et Sun 紅松枝縫球蚜 (Xiao, 1992:229)
Pineus cladogenous Fang et Sun, 1985, 3:1-5.
寄 主：紅松。
分 佈：黑龍江。

710. **Pineus cortecicolus** Fang et Sun 紅松皮下球蚜 (Tao, 1999:3 ; Xiao, 1992:230)
Pineus cortecicolus Fang et Sun, 1985, 3:3-5.
寄 主：紅松。
分 佈：黑龍江。

711. **Pineus laevis** (Maskell) 光松球蚜 (Tao, 1999:3)
Kermaphis pini var. *laevis* Maskell, 1885, 17:16.
=*Pineus borneri* Annand, 1928:
Pineus laevis, Borner, 1932:
寄 主：松。
分 佈：浙江、江蘇。

712. **Pineus pini** (Linnaeus) 松球蚜 (Tao, 1999:3)
Chermes pini Linnaeus, 1746:215.
Pineus pini,
寄 主：松。
分 佈：廣東、香港。

713. **Pineus piniyunnanensis** Zhang et al. 雲南松幹球蚜 (Zhang et al., 1992:361)
Pineus piniyunnanensis Zhang et al., 1992:361-362.
寄 主：雲南松(*Pinus yunnanensis*)。
分 佈：雲南(麗江)。

Phylloxeridae 根瘤蚜科

714. **Aphanostigma jakosuiense** (Kishida) 梨黃粉蚜 (ASZL, 1986, 1:206; Chen et Wang, 1987:120-121; Fang, 1980:389-393; 1989:305; Feng, 1997(1):41-43; Guo et Guo, 1999:45-46; Huang, 1990[ed.] 2:110-111; Mao, et al., 1985:72-76; NZWDI, 1981:1737; Tang, 1998(2):22; Zhang, 1999:24; Zhang et Li, 1997:29-30; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zhao et al., 1998(4):29)
Cinacium jakosuiense Kishida, 1924, 36:472.
Cinacium iwakusuiense Tabe et Misshima, 1929:
=*Aphanostigma pyri* Tao, 1978. *nec* Cholodkovsky, 1903.
別 名：*梨瘤蚜*。
寄 主：梨(果實尊洼)。
分 佈：臺灣、福建、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、河南、山西、山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本。

715. **Aphanostigma piri** (Cholodokovsky) 梨瘤蚜 (Cheng et Yeh, 1992:73-80; Lai et Lo, 1981:284; Liu et Liu, 1990:362; 1993:129-138; Liu et al., 1991:45-53; 1992:41-46; 41-46; 1993:188; Tao, 1999:4)
Phylloxera piri Cholodkosvky, 1903:
寄 主：梨、橫山梨(果蒂內)。
分 佈：臺灣、四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、河北、山西、遼寧；朝鮮、日本、以色列、歐洲。

716. **Phylloxera notabilis** Pergande 警根瘤蚜 (Tao, 1999:4; Xiao, 1992:214)

Phylloxera notabilis Pergande, 1904:468.
別 名：*長山核桃葉根瘤蚜*，*美核桃葉早矮蚜*。
寄 主：長山核桃。
分 佈：浙江、江蘇；美國。

717. **Phylloxera vastatrix** Planchoni 葡萄根瘤蚜 (ASZI, 1986, 1:206; Cao,et al., 1962:59-70; Chang, 1987:40; Huang, 1990[ed.] 2:366-371; Lee, 1957:489-495; NZWDI, 1981:1748; Tao, 1999:4; Zhang, 1955:161-165, 153; Zhang, 1993(3):42-43)
Phylloxera vastatrix Planchoni, 1868:588.
=*Peritymbia vitisana* Westwood, 1869:
=*Xerampelus vastator* Del Guercio, 1900:
=*Peritymbia vitifolii* (Fitch),
Phylloxera vastatrix (Planchoni); Tao, 1999:4.
[Grape phylloxera]
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、陝西、山西、山東、河北、遼寧；日本、歐洲、美洲(Cosmopolitan).
附 註：原產北美東部，1892 年由法國首先傳入山東台市。

Pemphigidae 綿蚜蚜科 (Eriosomatidae 綿蚜科)

718. **Eriosoma anncharlotteae** Danielsson 安綿蚜 (Tao, 1999:7; Zhang et al., 1985:287)
Eriosoma anncharlotteae Danielsson, 1979, (299):195
寄 主：第一寄榆、光葉榆、英國榆；第二寄主高山茶藨子。
分 佈：黑龍江；瑞典。

719. **Eriosoma lanigerum** (Hausmann) 蘋果綿蚜 (ASZI 1986, 1:211; An, 1993(4):47; Beijing FC.,1980[ed.]:205-207; Chang & Chu, 1957:167-182; Deng et al., 1993, 20(3):217-222; Huang, 1990[ed.] 2:24-29; Jin et al., 1998(4):13; Li et Xu, 1997(4):36; NZWDI, 1981:1706; Pan et al., 1999(4):5; Qin, 1997(4):25; Qu et Zhu, 1994(4):27; Sun et al., 1993(2):17; Tao, 1999:7; Wen et Li, 1994(1):40; Yunn., 1987:340; Zhao et Wang, 1996(1):44-46)
Aphis lanigerum Hausmann, 1802:440.
Eriosoma lanigerum Leach, 1818:
=*Eriosoma* (*Schizoneura*) *lanuginosum* Hartig, 1839:
寄 主：蘋果、花紅、沙果、西洋梨、海棠、李、山楂、山荊子、榆樹、花楸。
分 佈：雲南、西藏、山東、遼寧；朝鮮、日本、全北區，原產北美，現已傳播到世界各地。
天 敵：*Leis axyridis* var. *novemdecimpunctata* Faldermann　異色瓢蟲十九斑變種
Aphelinus mali (Halderman)　蘋果綿蚜矮小蜂(日光蜂)

720. **Prociphilus crataegi** Tullgren 蘋果根綿蚜 (Chen et Wang, 1987:64; Qiao, 1993:34-35; Tao, 1999:12)
Prociphilus crataegi Tullgren, 1909, 5:14, 96.
=*Proceiphilus pyri* Essig et Kuwana, 1918:
=*Prociphilus crataegicola* Shinji, 1922:
=*Prociphilus sasakii* Monzen, 1927:
別 名：*蘋果卷葉綿蚜*，*山楂卷葉綿蚜*。
寄 主：蘋果、山楂。
分 佈：陝西、山東。

721. **Prociphilus kuwanai** Monzen 梨捲葉綿蚜 (ASZI, 1986, 1:210; Tao, 1999:13; Yunn., 1987:345; Zhang et al., 1992:364)
Prociphilus kuwanai Monzen, 1927, 4:1.
寄 主：花蓋梨、香水梨、洋梨。

分 佈：雲南、四川、山西、山東、遼寧；日本、西伯利亞。

722. **Prociphilus piniradius** Tao 松根綿蚜 (Tao, 1990:22, 1999:13)
Prociphilus pini Tao, 1970:139.
Prociphilus piniradius Tao, 1986:104. (n. n. for *pini* Tao *nec* Burmeister, 1835)
寄 主：松樹根。
分 佈：臺灣、河北；日本、歐洲。

Thelaxridae 群蚜科

723. **Glyphina** sp. 山核桃蚜 (Huang, 1990[ed.] 2:336-338)
寄 主：山核桃。
分 佈：浙江、安徽。

724. **Kurisakia sinocaryae** Zhang 山核桃刻蚜 (ASZI 1986, 1:218; Hum.,1992:145; Jin, 1982; Tao, 1999:26; Wang, 1987[ed.]:199-203; Xiao, 1992:202; Zhang et al., 1992:145)
Kurisakia sinocaryae Chang, 1970:52.
寄 主：山核桃。
分 佈：湖南、浙江、安徽、山東。
天 敵：草蛉
Leis axyridis Pallas 異色瓢蟲
食蚜蠅
寄生性
紅蟻
蚜繭蜂

Greenideidae 毛管蚜科

725. **Eutrichosiphum (Paratrichosiphum) tatakanum** (Takahashi) 立麗毛管蚜 (Tao, 1990:110, 1999:28; Yunn., 1987:370; Zhang et al., 1992:367)
Greenidea tatakanum Takahashi, 1925:33, 53.
Eutrichosiphum tatakanum, Eastop et Rille Ris Lambers, 1976:
別 名：*塔真毛管蚜*。
寄 主：臺灣板栗、狹葉櫟、山櫟、櫟、臺灣栲樹。
分 佈：臺灣、雲南；日本、印度、尼泊爾。

726. **Greenidea** (s. str.) **ficicola** Takahashi 榕毛管蚜 (Chao, 1982:87; Liao, 1978:350; Tao, 1990:116, 1999:28)
Greenidea ficicola Takahashi, 1921:66.
寄 主：波羅蜜、無花果、榕、雀榕、大榕乳樹、大果榕、白肉榕。
分 佈：臺灣、廣東、香港；日本、印尼、印度。
天 敵：*Mallada boninensis* (Okamoto) 安平草蛉
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜虻

Archaphidus greenideae Stary et Schlinger　無花果蚜繭蜂
Diaeretiella rapae M'Intosh　少脈蚜繭蜂(菜蚜繭蜂)
Diaeretus nipponensis Ashmead　蚜繭蜂
Fissicaudus confucius (Mackauer)　蚜繭蜂
Trioxys struma Gahan　蚜繭蜂

727. **Greenidea (Trichosiphum) formosana** (Maki) 番石榴毛管蚜 (Chen, 1981:48; Liao, 1978:347; Tao, 1990:118; 1999:28; Yann., 1987:374)
Trichosiphum formosana Maki, 1917:13.
=*Trichosiphum pisidi* van der Goot, 1917:
別 名：*臺灣毛管蚜*。
寄 主：番石榴、蓮霧、桃金孃、番櫻桃屬、白千層。
分 佈：臺灣、廣東、雲南；日本、琉球、印尼、泰國、印度、尼泊爾。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson　曹氏褐蛉
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲
Leis dimidiata Fabricius　小十三星瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp.　褐尾小黑瓢蟲
Ischiodon scutellaris Fabricius　刺腿食蚜虻
Archaphidus greenideae Stary et Schlinger　蚜繭蜂
Aphidius tuberosus Chou　蚜繭蜂
Fissicaudus confucius (Mackauer)　蚜繭蜂

728. **Greenidea guangzhouensis** Chang 廣州毛管蚜 (Chang et Zhong, 1979:117; Tao, 1999:28)
Greenidea guangzhouensis Chang (Zhang), 1979:177.
寄 主：無花果(*Ficus carica*)。
分 佈：廣東。

729. **Greenidea** (s. str.) **mangiferae** Takahashi 檬果毛管蚜 (Liao, 1978:350; Tao, 1990:118; 1999: 29)
Greenidea mangiferae Takahashi, 1925:33.
寄 主：檬果、龍眼。
分 佈：臺灣。

730. **Greenidea (Trichosiphum) myricae** Takahashi 楊梅毛管蚜 (Liao, 1978:348; Tao, 1990: 121; 1999: 29)
Trichsipphum myricae Takahashi, 1925:31.
寄 主：楊梅、檵木。
分 佈：臺灣。

731. **Greenidea (Paragreenidea) viticola** Takahashi 葡萄毛管蚜 (Liao, 1978:346; Tao, 1990: 125; 1999:29)
Greenidea viticola Takahashi, 1929:98.
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

732. **Mollitrichosiphus (Metatrichosiphon) nandii** Basu 毛管蚜 (Tao, 1999:30)

Mollitrichosiphus nandii Basu, 1964:233.
寄 主：*Prunus cerasodes* 高盆櫻
Alnus.
分 佈：雲南；印度。

Hormaphidae 扁蚜科

733. **Cerataphis lataniae** (Boisduval) 椰子蠟蚜 (Pingtung AC., 1986:71; Tao, 1990:35; 1999:18)
Coccus lataniae Boisduval, 1867:355.
Cerataphis lataniae, Buckton, 1883:
=*Aphis palmae* Baehr., 1908.
=*Cerataphis formosana* Takahashi, 1924:
寄 主：椰子(小葉葉片下)、*Areca catheca*.
分 佈：臺灣；越南、泰國、緬甸、印尼、澳洲、北美、歐洲、非洲。

Lachnidae 大蚜科

734. **Cinara atratipinivora** Zhang 黑松大蚜 (Zhang, 1982, 2:24)
Cinara atratipinivora Zhang, 1982:24.
寄 主：黑松、馬尾松。
分 佈：江西、雲南、山東。

735. **Cinara formsana** (Takahashi) 馬尾松大蚜 (Chao, 1982:87; Hun., 1992:150; Tao, 1990:79; 1999:32; Zhang, 1987[ed.]:63; Zhang et al., 1992:365)
Dilachnus formosana Takahashi, 1924:73.
=*Panimerus kiangsiensis* Lou, 1935.
別 名：*馬尾松長足大蚜*，*臺灣長足大蚜*，*松大蚜*。
寄 主：松屬植物、雲南松、華山松、琉球松、馬尾松、黑松等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西、寧夏、山東、河北、寧夏、遼寧、吉林；日本。
天 敵：*Aphidius* sp. 松蚜蜂
Pauesia (*Paraphiduis*) *laticeps* (Gahan)
Pauesia (s. str.) *picta* (Haliday)
Pauesia (s. str.) *unilachni* (Gahan) 長足大蚜蜂

736. **Cinara kochi** Inouye 考氏大蚜 (Jiang, 1986:214-215; Tao, 1999:32; Zhang et al., 1988:228)
Cinara kochi Inouye, 1931, 33:21.
寄 主：紅松、松屬一種。
分 佈：黑龍江；朝鮮、日本。

737. **Cinara minoripinihabitans** Zhang (Tao, 1999:33; Zhang, 1989:198)
Cinara minoripinihabitans Zhang, 1989:198.
寄 主：紅松。
分 佈：黑龍江。

738. **Cinara orientalis** (Takahashi) 東方松蚜 (Tao, 1990:81; 1999:33; Yunn.,1987:384)
Dilachnus orientalis Takahashi, 1925:37.
寄 主：雲南松、松。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川(西康)；日本、印度。

739. **Cinara orientalis lijiangensis** Zhang 麗江大蚜 (Tao, 1999:33; Yunn.,1987:384; Zhang, 1985:310; Zhang et al., 1992:365)
Cinara orientalis lijiangensis Zhang, 1985:310.
寄 主：雲南松、華山松、油松。
分 佈：福建、雲南、四川、山東、北京。

740. **Cinara paxilla** Zhang 小管松大蚜 (Tao, 1999:33; Zhang, 1981:241)
Cinara paxilla Zhang, 1981:241.
寄 主：高山松(*Pinus densata*)，虎刺(*Damnacanthus indicus*)。
分 佈：西藏。

741. **Cinara piceae** (Panzer) 雲杉大蚜 (Tao, 1999:33; Zhang, 1996:91)
Aphis piceae Panzer, 1801:22.
Cinara piceae,
寄 主：馬尾松、黑松、琉球松、*Picea schrenkiana*。
分 佈：臺灣、廣東、西藏、山東、新疆。

742. **Cinara pinea** (Mordvilko) 歐亞松蚜 (Beijing FC., 1980[ed.]:202-203; Chao, 1982:87; Liu, 1982[ed.]:260-261; Tao, 1990:82; 1999:33; Zhang, 1987[ed.]:64)
Cinara pinea Koch, 1856. (*nec* Fabricius, 1781).
Lachnus pinea Mordvilko, 1895:230.
=*Lachniella inoptita* Wilson, 1919.
=*Dilachnus piniformosanus* Takahashi, 1923.
=*Cinara diversiseta* Borner,1952.
=*Cinara kaltenbachi* Hottes, 1954.
別 名：*松蚜*，*松大蚜*。
寄 主：馬尾松、琉球松、黑松。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、浙江、安徽、陝西、寧夏、甘肅、河南、河北、山西、山東、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、歐洲、美國。
天 敵：Hemerobiidae 褐蛉科
Sympherobius weisong Yang 衛松益蛉
Chrysopidae 草蛉科
Chrysopa kulingensis Navás 牯嶺草蛉
Chrysopa pallens (Rambur) = *Chrysopa septempunctata* Wesmael 大草蛉
Ballia obscurosignata Liu 隱斑瓢蟲
Calvia albolineata (Schoenherr) 細紋裸瓢蟲
Calvia chinensis (Mulasant) 華裸瓢蟲
Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Harmonia obscurosignata (Liu) 隱斑瓢蟲
Syrphidae 食蚜虻科
Scaeva pyrastri (Linnaeus) 斜斑鼓額食蚜虻
Aphidiidae 蚜繭蜂科
Aphidius laticeps Gahan

743. **Cinara pinidensiflorae** (Essig et Kuwana) 東亞松蚜 (Tao, 1990:82; 1999:33; Yunn., 1987:384; Zhang et al., 1992:365)

Lachnus pinidensiflorae Essig et Kuwana, 1918:99.
Cinara pinidensiflorae,
別 名：*日本赤松大蚜*。
寄 主：雲南松、馬尾松、油松、黑松等。
分 佈：臺灣、江西、雲南、山東、遼寧；朝鮮、日本。

744. **Cinara pinikoraiensis** Zhang (Tao, 1999:33; Zhang, 1989:198)
Cinara pinikoraiensis Zang, 1989:198.
寄 主：紅松。
分 佈：遼寧、黑龍江。

745. **Cinara pinitabulaeformis** Zhang et Zhong 松大蚜 (Tao, 1999:33; Xiao, 1992:198; Zhang et Zhong, 1989:202)
Cinara pinitabulaeformis Zhang et Zhong, 1989:202.
寄 主：紅松、油松、赤松、樟子松、雲南松、馬尾松。
分 佈：四川、陝西、山東、河南、山西、河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、歐洲。

746. **Cinara piniyunnanensis** Zhang 雲南松大蚜 (Tao, 1999:34; Zhang, 1987:383)
Cinara piniyunnanensis Zhang, 1987:383.
寄 主：雲南松、華山松、思茅松、五葉松。
分 佈：雲南。

747. **Cinara similiorientalis** Zhang 肖東方大蚜 (Tao, 1999:34; Yunn., 1987:384; Zhang, 1987:384)
Cinara simioreintalis Zhang, 1987:384.
寄 主：華山松、五葉松。
分 佈：雲南。

748. **Cinara subapicula** Zhang 亞端大蚜 (Tao, 1999:34; Zhang, 1981:243)
Cinara subapicula Zhang, 1981:243.
寄 主：松、虎刺。
分 佈：西藏。

749. **Cinara tibetapini** Zhang 藏松大蚜 (Tao, 1999:34; Zhang, 1981:244)
Cinara tibetapini Zhang, 1981:244.
寄 主：松。
分 佈：西藏。

750. **Cinara watsoni** Tissot 瓦式大蚜 (Hun., 1992:151; Tao, 1999:34; Zhang et al., 1992:145)
Cinara watsoni Tissot, 1939:43.
寄 主：松屬植物。
分 佈：湖南、黑龍江；美國。

751. **Eulachnus agilis** (Kaltenbach) 捷長大蚜 (Tao, 1990:85; 1999:34; Yunn., 1987:383; Zhang, 1987[ed.]: 64; Zhang et al., 1992:365)
Lachnus agilis Kaltenbach, 1843:161.
=*Eulachnus pini* Takahashi, 1935:
別 名：*舊世界松針蚜*、*松針長大蚜*。
寄 主：雲南松、馬尾松、短葉松、中歐山松、南歐黑松、歐洲赤松等。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、雲南、西藏(西康)、四川；非洲、歐洲、蘇聯、北美。

752. **Eulachnus alticola** Börner 高山長大蚜 (Hun., 1992:151; Tao, 1999:35)
Eulachnus alticola Börner, 1940:1.
寄 主：馬尾松、雲南松。
分 佈：廣東、廣西、雲南、湖南、浙江、山東；捷克。

753. **Eulachnus cembrae** Bröner 五葉松長大蚜 (Yunn., 1987:379)
Eulachnus cembrae Börner, 1950:2.
寄 主：華山松、瑞士五葉松。
分 佈：雲南；歐洲。

754. **Eulachnus piniarmandifoliae** Zhang 華山松長大蚜 (Hun., 1992:151; Tao, 1999:35)
Eulachnus piniarmandifoliae Zhang, 1992:151.
寄 主：華山松。
分 佈：湖南、雲南。

755. **Eulachnus pinitabulaeformis** Zhang 油松長大蚜 (Hun., 1992:152; Tao, 1999:35)
Eulachnus pinitabulaeformis Zhang, 1992:152.
寄 主：油松、馬尾松。
分 佈：湖南、北京、遼寧。

756. **Eulachnus rileyi** (Williams) 里長大蚜 (Tao, 1999:35; Yunn., 1987:383)
Eulachnus rileyi Williams, 1911:
寄 主：松、短葉松、瑞士五葉松、阿勒頗松、中歐山松、南歐黑松、克里木松、美國黃松、北美油松、歐洲赤松、黑松等。
分 佈：臺灣、雲南；土耳其、歐洲、北美。

757. **Eulachnus thunbergii** (Wilson) 長毛松針蚜 (Tao, 1990:86; 1999:35)
Lachniella thunbergii Wilson, 1919:3.
=*Eulachnus piniformosanus* Takahashi, 1921.
=*Lachnus longicorni* Shinji, 1922.
=*Eulachnus tawanus* Takahashi, 1923.
=*Eulachnus bielawskii* Szelegiewcz, 1970.
寄 主：琉球松、馬尾松、黑松。
分 佈：臺灣、山東、遼寧；朝鮮、日本、印度、澳洲。
天 敵：Aphidiidae　蚜繭蜂科
Diaeretus lencoperus (Haliday)

758. **Eulachnus tuberculostemmatus** (Theobald) 釘毛長大蚜 (Tao, 1999:35; Yunn., 1987:383)
Protolachnus tuberculostemmatus Theobald, 1915, 6:145.
寄 主：松、雲南松、馬尾松。
分 佈：福建、廣東、雲南；非洲。

759. **Hyalopterus arundinis** (Fabricius) 桃大尾蚜 (Chan, 1982:87; Chen et Wang, 1987:153; Huang, 1990[ed.] 2:167-170; Huang et Gao, 1996:240; Li, 1996(3):36; NZWDI, 1981:1759; Wang et al., 1997:22-23; Wen et al., 1999(1):41-42; Zhang, 1987[ed.]:61; Zhang et Li, 1997:29-30; Zhang et Zhang, 1992:75-76; Zhu et al., 1996(4):14-17)
別 名：*桃粉大尾蚜*、*桃粉蚜*。

寄 主：桃、梅、杏、李、梨、櫻桃、水稍、蘆葦、香蒲。
分 佈：福建、江西、山東。

760. **Lachnus tropicalis** (van der Goot) 板栗大蚜 (ASZI, 1986, 1:227; Beijing FC., 1980[ed.]:203-204; Huang, 1990[ed.] 2:359-360; Huang et Gao, 1996:260; Hun., 1992:152; Luan, 1995:26; Tao, 1999:36; Wang, 1987[ed.]:222; Wang, 1998(3):43-44; Xiao, 1992:204; Yu et Xu, 1995:113; Yunn., 1987:379; Zhang et al., 1992:145)
Pterolachnus tropicalis van der Goot, 1916:3.
=*Pterolachnus japonicus* Matsumura, 1917:
=*Pterolachnus ogasavarae* Matsumura, 1917:
Lachnus tropicalis: Takahashi, 1951:
別 名：*栗大黑蚜*。
寄 主：板栗、錐栗、白櫟、柞、麻櫟、槲、柯、櫧(在小枝上，有時爲害幼果)、柳。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、越南、馬來西亞、印度、尼泊爾。

761. **Lachnus** sp. 枇杷大蚜 (Zhang, 1987[ed.]:64)
寄 主：枇杷。
分 佈：江西。

762. **Longistigma xizangensis** Zhang 藏柳長痣大蚜 (ASZI, 1986, 1:226; Tao, 1999:36; Yunn., 1987:373; Zhang et al., 1992:366)
Longistigma xizangensis Zhang, 1981:245.
寄 主：桃、蘋果、藏柳、楊、柏、青岡、槭楠等。
分 佈：雲南、西藏。

763. **Nippolachnus piri** Matsumura 無眼瘤大蚜 (Tao, 1990:92; 1999:36; Zhang, 1987[ed.]:64)
Nippolachnus piri Matsumura, 1917:382.
=*Nippolachnus micromeli* Shinji, 1924.
別 名：*枇杷綠大蚜*。
寄 主：梨、枇杷、白杏花。
分 佈：臺灣、江西、廣東、青海；朝鮮、日本、馬來西亞、印度。

764. **Nippolachnus xitianmushanus** Zhang et Zhong 枇杷大蚜 (ASZI, 1986, 1:228; Tao, 1999:36; Yunn., 1987:373)
Nippolachnus xitianmushanus Zhang & Zhong, 1982:25.
寄 主：枇杷。
分 佈：雲南、浙江。

765. **Pterochlorus japonica** Matsumura 栗黑大蚜 (Zhang, 1987[ed.]:64)
寄 主：板栗、白櫟、槲、苦櫧、泡桐。
分 佈：江西。

766. **Pyrolachnus macroconus** Zhang et Zhong 巨錐大蚜 (Tao, 1999:337; Yunn., 1987:373; Zhang et Zhong, 1982: 197)
Pyrolachnus macroconus Zhang et Zhong, 1982:197.
寄 主：枇杷。
分 佈：雲南、四川。

767. **Pyrolachnus pyri** (Buckton) 梨大蚜 (ASZI, 1986, 1:228; Long et Chen, 1988:28-29; Tao, 1999:37; Yunn., 1987:373; Zhang et al., 1992:366)
Lachnus pyri Buckton, 1899:274.
=*Dilachnus krishni* George, 1927:
寄 主：梨、枇杷。
分 佈：臺灣、江西、廣東、雲南、四川、青海；日本、馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

768. **Schizolachnus orientalis** (Takahashi) 東方鬍喙大蚜 (Chao, 1982:90; Hun., 1992:153; Tao, 1990:87; 1999:37; Zhang et al., 1992:145)
Unilachnus orientalis Takahashi, 1924:74.
Schizolachnus orientalis, Eastop et Hille Ris Lambers, 1976:
別 名：*東方單細松蚜*、*東方一條大蚜*。
寄 主：馬尾松、油松、雲南松。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、西康、湖南、江蘇、新疆、內蒙古、黑龍江；日本、印度。

769. **Schizolachnus pineti** (Fabricius) 松針粉大蚜 (Tao, 1999:37; Zhang et al. 1983:313; Zhang et al., 1992:366)
Aphis pineti Fabricius, 1781:389.
=*Aphis tomentosa* Villers, 1789:
寄 主：雲南松、油松、歐洲赤松、南歐海松。
分 佈：雲南、北京；歐洲。

770. **Sinolachnus nitakayamensis** (Takahashi) 檳榔大蚜 (Tao, 1990:96, 1999:37)
Lachnus niitakayamensis Takahashi, 1925:36.
寄 主：小葉胡顛子、檳榔。
分 佈：臺灣；日本。

Drepanosiphidae 斑蚜科 (Callaphididae Callipteridae 鐮管蚜科)

771. **Callaphis nepalensis** Quednau 尼泊爾斑蚜 (Zhang et al., 1992:366)
Callaphis nepalensis Quednau, 1973:
寄 主：核桃、柳。
分 佈：雲南、西藏；尼泊爾。

772. **Callaphis nepalensis yunlongensis** Zhang 雲龍斑蚜 (Tao, 1999:39; Zhang et Zhong, 1985:220; Zhang et al., 1992:366)
Callaphis nepalensis yunlongensis Zhang, 1985:220.
寄 主：核桃。
分 佈：雲南(雲龍)。

773. **Castanocallis castanocallis** Zhang et Zhong 栗斑蚜 (ASZI, 1986, 1:237; Hun., 1992:145; Tao, 1999:40; Zhang et al., 1992:143)
Castanocallis castanocallis Zhang et Zhong, 1981:344.
寄 主：板栗。
分 佈：湖南、廣西、雲南、浙江、山東、河北、遼寧。

774. **Castonocallis cereus** Zhang et Zhong 粉栗斑蚜 (ASZI, 1986, 1:238; Tao, 1999:40)

Castonocallis cereus Zhang, 1981:344.
寄 主：板栗。
分 佈：雲南、江西、湖南、浙江、山東、河北、北京、遼寧。

775. **Castanocellis margituberculatus** Zhang et Zhong 緣瘤栗斑蚜 (ASZI, 1986, 1:238; Hun., 1992:146; Tao, 1999:40; Zhang et al., 1992:143)
Castanocallis margituberculatus Zhang et Zhong, 1981:345.
寄 主：板栗。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、山東、河北、北京、遼寧。

776. **Chromaphis hirsutustibis** Kumar et Lavigne 核桃多毛斑蚜 (Yunn., 1987:392; Zhang et Zhong, 1985:221)
Chromacallis hirsutustibis Kumar et Lavigne, 1970:120.
寄 主：核桃、新疆核桃、石栗。
分 佈：雲南；印度。

777. **Chromaphis juglandicola** (Kaltenbach) 核桃黑斑蚜 (Li, 1992:345-347; Tao, 1999:40; Yang et Guo, 1998(2):21; Zhang et al., 1986:404)
Lachnus juglandicola Kaltenbach, 1843:151.
Chromaphis juglandicola
別 名：*核桃斑蚜*。
寄 主：核桃。
分 佈：北京、山西、遼寧；印度、中亞、中東、非洲、丹麥、瑞典、西班牙、英國、德國、波蘭、北美。

778. **Chromocallis hirsutustibis** Kumur et Lovigna 核桃多毛斑蚜 (Zhang et al., 1992:367)
Chromocallis hirsutustibis Kumur et Lovigna, 1970:
寄 主：核桃、新疆核桃、石栗。
分 佈：雲南；印度。

779. **Chromocallis pumila** Zhang 榆緣斑蚜 (Tao, 1999:40; Zhang et Zhong, 1982:71)
Chromocallis pumila Zhang, 1982:71.
寄 主：梨、榆。
分 佈：河南、河北。

780. **Dasyaphis onigurumi** (Shinji) 楓楊肉刺斑蚜 (Hun., 1992:146, Tao, 1999:41)
Glyphina rhusae Shinji, 1922, 4(3):120.
=*Echinapphis ussurieensis* Monddvilko, 1929:
Tuberocorpus onigurumi Shinji, 1932:120.
=*Tuberocorpus rhusae* Shinji, 1932:
=*Sinocallis mirabilis* Tseng et Tao, 1938:
=*Tuberocorpus coreanus* Paik, 1965:
寄 主：胡桃、楓楊。
分 佈：廣西、四川、湖南、湖北、遼寧；朝鮮、日本、西伯利亞。

781. **Dasyaphis rhusae** (Shinji) 楓楊肉刺斑蚜 (Zhang et al., 1992:143)
寄 主：胡桃、楓楊。
分 佈：湖南、廣西、湖北、遼寧；朝鮮、日本。

782. **Nippocallis kuricola** Matsumura 栗斑蚜 (Huang, 1990[ed.]2:360-361; Huang et Gao, 1996:261; Tao,

1990:140; 1999:44 ; Zhang, 1987[ed.]:62)
Nippocallis kuricola Matsumura,1917:365.
=*Castanocallis castanocallis* Zhang et Zhong, 1981 .
=*Castanocallis cereus* Zhang et Zhong, 1981.
=*Castanocallis margituberculatus* Zhang et Zhong, 1981.
別 名：*栗角斑蚜*、*栗花翅蚜*。
寄 主：板栗、毛栗、櫟。
分 佈：臺灣、江西、廣東、四川、浙江、江蘇、河南、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、琉球。

783. **Paratinocallis corylicola yunnanensis** Zhang 榛子副長斑蚜(雲南亞種) (Zhang et al., 1992:367)
寄 主：榛子樹。
分 佈：雲南。

784. **Taoia indica** (Ghosh et Raychaudhuri) 菠蘿蜜斑蚜 (Tao, 1999:48)
Euceraphis indica Ghosh et Raychaudhuri, 1972:373.
=*Taoia exotica* Quednau, 1973:
Taoia indica;
寄 主：菠蘿蜜。
分 佈：雲南、西藏；印度、尼泊爾。

Aphididae 蚜蟲科

(Liao, 1979:291-294; Tao, 1990:1-327; 1999:1-144; Tao et Hou, 1986:99-109; Yu, 1995:42)

785. **Acyrthosiphon dirhodum** (Walker) 麥無網蚜 (Zhang et al., 1992:372)
Acyrthosiphon dirhodum (Walker, 1849:)
寄 主：春季在薔薇屬葉下及嫩枝梢危害；夏季在禾本科植物，包括大麥、小麥、有時取食牙草屬、草莓、鳶尾屬。
分 佈：貴州、雲南、西藏、四川、河南、河北、北京、寧夏；亞洲北部、歐洲。

786. **Anuraphis farfarae** (Koch) 突孔梨蚜 (Tao, 1999:57)
Aphis farfarae Koch, 1854:54.
Anuraphis farfarae, Bodenheimer et Swirski, 1957:
寄 主：梨。
分 佈：遼寧；日本、歐洲、美洲。

787. **Aphis citricola** van der Goot 橘捲葉蚜 (ASZI, 1986, 1:251; Bei et Jiang, 1999(3):19; Cai, 1995(4):36-37; Cao, 1994(2):35; Cao, 1998(2):53-54; Cao et Wang, 1997:24; Cao et Zhang, 1996(4):45; Chao et Chen, 1991:55-61; Chen, 1993(1):36; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chen et al., 1996(4):15-17; Chiu et al., 1985:1-8; Fu, 1995(3):43; Huang, 1990[ed.] 2:21-23, 217-220; Huang et Gao, 1996:165; Hun., 1992:153; Kang, 1994(40:44; Li, 1996(3):36; Li et Li, 2000(2):12; Lin, 1993(4):41; Liu et Huang, 1989:259-263; Tao, 1990:169; 1999:57; Tao et Tan, 1961:41-53; Ting, 1999(3):19; Wang et Zhang, 1996(4):36; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Yu et al., 1993(2):35; Zhang et al., 1992:370; Zhang et Li, 1997(4):22-23, 47; Zhang et al., 1995(2):33; Zhang et al., 2000(2):13; Zhao et al., 1998(4):29; Zhou, 1993(2):46; Zhu et al., 1998, 25(1):93-94)
Aphis citricola van der Goot, 1912:29. (*nec* Koch, 1854).
=*Aphis spiraecola* Patch, 1914.
=*Aphis malvoides* van der Goot, 1917.
=*Aphis nigricauda* van der Goot, 1917.
=*Aphis viburnicolens* Swain, 1919.
=*Aphis deutziae* Shinji, 1922.
=*Aphis mitsubae* Shinji, 1922.
=*Aphis pirifoliae* Shinji, 1922.
=*Aphis bidentis* Theobald, 1929.

=*Aphis pseudopomi* Blanchard 1939.

別 名：*綉線菊蚜*，*蘋果黃蚜*。

寄 主：柑橘類、蘋果、梨、桃、李、杏、櫻桃、沙果、山楂、山荊子、檳榔、枇杷、海棠、木瓜(*Chaenomeles*)、羅漢果、櫻花、榆葉梅、麻葉繡球、石斑木、石楠、香樟、楊、柳、霧香菊、紫背草、鬼針草、車桑子、多種繡線菊等植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、新加坡、印尼、北美, 中美、全世界。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒，如豆普通嵌紋、甜菜嵌紋、木瓜嵌紋、木瓜輪點病。

天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson 紹德褐蛉

Adalia bipunctata (Linnaeus) 二星小紅瓢蟲

Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲

Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲

Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲

Coelophora chinensis Weise 六星瓢蟲

Harmonia axyridis Pallas 異色瓢蟲

Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲

Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲

Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲

Platynaspidius maculosus Weise 五星瓢蟲

Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲

Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki 二星小黑瓢蟲

Synonycha grandis Thunberg 大三星瓢蟲

Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐斑小黑瓢蟲

Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲

四條瓢蟲

褐胸瓢蟲

Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅

Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅

Paragus tibialis Fallen 刺脊食蚜蠅

Paragus serratus Fabricius 短刺食蚜蠅

Chamaeyiidae 斑腹蠅科

Leucopis puncticornis Meigen 白背斑腹蠅

Ephedrus rubustus Liu 蚜繭蜂

Ephedrus plagiator (Nees)

Ephedrus persicae Froggatt 桃蚜繭蜂

Lipolexis gracilis Förster 綉蚜繭蜂

Lipolexis scutellaris Mackauer

Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂

Trioxys (*Binodoxys*) *citri*

Trioxys sp.

Aphelinus mali (Haldeman) 日光蜂(蘋果綿蚜矮小蜂)

788. **Aphis craccivora** Koch 豆蚜 (Chao et Chen, 1989:411; 1991:55-61; Liu et Huang, 1989, 16(4):259-263; Shi et al., 1989-'90:80; Song, 1984:82; Tao, 1990:170; 1999; 58; Tseng, 1994:502; Wang, 1981:299-233; Yu et Xu, 1995:113; Zhang et al., 1992:146; 1992:370)

Aphis craccivora Koch, 1854:124.
=*Aphis medicaginis* Koch, 1854.
=*Aphis dolichi* Montrouzieri, 1861.
=*Aphis loti* Kaltenbach, 1862.
=*Aphis mimosae* Ferrari, 1872.
=*Aphis robiniae* Macchiati, 1885.
=*Aphis atronitens* Cockerell, 1903.
=*Aphis cistiella* Theobald, 1903.
=*Aphis hordei* del Guercio,1917.
=*Aphis isabellina* del Guercio, 1917.
=*Aphis beccarii* del Guercio, 1917.
=*Aphis papilionacearum* van der Goot, 1918.
=*Aphis leguminosae* Theobald, 1918.
=*Aphis oxabina* Theobald, 1925.
=*Aphis kyberi* Hottes, 1930.
=*Doralina salsolae* Borner, 1940.
=*Aphis robiniae canavaliae* Zhang, 1981.

別 名：*黎豆蚜*，*黑豆蚜*。

寄 主：柑橘、豆科之合萌、落花生、紫雲英、苜蓿、黃野百合、小槐花、扁豆、野大豆、觀音豆、小豆、龍爪豆、豌豆、金龜樹、刺槐、翹搖、蠶豆、長豇豆、豇豆、苕子等，大戟科之菲律賓饅頭果、錫蘭饅頭果，錦葵科之棉，海桐科之臺灣海桐，藜科之櫻藜，紫茉莉之南美紫茉莉，瑞香科之南嶺堯花，莧菜科之長梗滿天星。

分 佈：全球，臺灣、江西、湖南、香港、雲南、西藏、浙江、江蘇、上海、河南、山東、河北、內蒙古；日本、馬來西亞、印度、非洲、歐洲、北美。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒之豌豆萎凋、大豆嵌紋、豆黃色嵌紋、甜菜嵌紋、甘藍黑環點、豇豆嵌紋、黃瓜嵌紋、南瓜黃化嵌紋病毒、紫苜蓿嵌紋、洋蔥黃色嵌紋、木瓜輪點病、百香果木質化、豌豆嵌紋及嵌紋等和持續性植物病毒苜蓿矮化、落花生簇葉等病毒。

天 敵：*Coccinella septempunctata bruckii* Mulsant 七星瓢蟲
Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲
Coelophora bissettala Mulsant 十斑盤瓢蟲
Coelophora circumusta Mulsnat 紅基盤瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Leis dimdiata Fabricius 小十三星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Platynaspidius maculosus Weise 五星瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki 二星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐斑小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Synonycha grandis Thunberg 大十三星瓢蟲
四條瓢蟲

Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Metasyrphus corollae (Fabricius) 大灰食蚜蠅
Paragus tibialis Fallen 刺脊食蚜蠅
Paragus serratus Fabricius 短刺食蚜蠅
Chamaeyiidae 斑腹蠅科
Leucopis puncticornis Meigen 白背斑腹蠅
Lipolexis gracilis Förster 繡蚜繭蜂
Lipolexis scutellaris Mackauer 徑蚜繭蜂
Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂
Lysiphebia rugosa Stary et Schlinger 豆蚜皺繭蜂

789. **Aphis gossypii** Glover 棉蚜 (ASZI, 1986, 1:252; Bei et Jiang, 1999(3):19; Chao, 1982:85; Chao et Chen, 1989:411; Chen, 1981:48; Chen, 1993(1):36; Chen, 1995(3):34-36; Chen, 1996(1):45; Chen et Chen, 1994:43-44; Chen et al., 1995(1):37-39; Chen et al., 1996(4):15-17; Chiu et al., 1985:1-8; Chou et Hsin, 1997:415; Fu, 1995(3):43; Gao, 1992, 35:267-272; Gao et Zheng, 1990, 17:373-377; Gao et al., 1989, 16(4):273-278; Gu et al., 1994:77-79; Han et al., 1990, 17(3):214, 222; Hsieh et Lee, 1998:432; Huang, 1990[ed.] 2:217-220; Huang et Gao, 1996:165; Huang et Tsai, 1984:432; Hun., 1992:154; Jiang et al., 1998(1):43-44; Li et Li, 2000(2):12; Liu, 1987, 24(1):62; Liu et Huang, 1989, 16(4):259-263; 1991:106-116; Liu et Peng, 1987:95-111; Luo, 1991:84; Luo et al., 1990, 17(3):283-288; Luo et al., 1996:54; Mu et al., 1988, 21(6):18-26; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-98; Shi et al. 1989-'90:80; Sun et al., 1987, 30(1):13-19; Sun et al., 1987, 30:13-19; Tan et al., 1998, 15(2):135-138; Tao, 1990:176; 1999:58; Tao et Tan, 1961:41-53; Ting, 1999(30:19; Tseng, 1994: 506; Wang, 1981:229-233; Wang, 1987[ed.]:321-322; Wen et Lee, 1985:105-109; Xie et Sterling, 1987, 14(3):151-156; Yu et Xu, 1995:113; Yu et al., 1993(2):35; Yu et al., 1996, 23(1):73-78; Yunn.,1987:404; Zhang et Li, 1997(4):22-23, 47; Zhang et Ren, 1995(1):42; Zhang et al., 1992:146; 1992:371; Zhao et al., 1997, 24(4):351-355; Zheng et al., 1988, 15(1):55-61; Zheng et al., 1989, 16(2):131-138; Zhou, 1993(2):46; Zou et al., 1995(4):8)

Aphis cucumeris Forbes, 1822.
Aphis solanina Passerini, 1863.
Aphis cucurbiti Buckton, 1872.
Aphis gossypii Glover, 1877:36.
=*Aphis citrulli* Ashmead, 1882.
=*Aphis monarde* Oestlund, 1887.
=*Aphis ligustriella* Theobald, 1914.
=*Aphis hederella* Theobald, 1915.
=*Aphis helianthi* del Guercio, 1916.
=*Aphis pomonella* Theobald,1916.
=*Toxoptera aurantii* var. *limonii* del Guercio, 1917.
=*Aphis tectonae* van der Goot, 1917.
=*Aphis clerodendri* Matsumura, 1917.
=*Aphis colocasiae* Matsumura, 1917.
=*Aphis bauhiniae* Theobald, 1918.
=*Aphis parvus* Theobald, 1918.
=*Aphis pruniella* Theobald, 1918.
=*Aphis malvacearum* van der Goot, 1918.
=*Aphis malvoides* Das, 1918. (*nec* van der Goot, 1917)
=*Aphis odorikonis* Matsumura, 1919.
=*Aphis affinis* var. *gardeniae* del Guercio, 1921.
=*Aphis gossypii* var. *callicarpae* Takahashi, 1921.
=*Aphis malvae* Takahashi, 1921.
=*Toxoptera leonuri* Takahashi, 1921.
=*Aphis bryophyllae* Shinji, 1922.
=*Aphis commeliniae* Shinji, 1922.
=*Aphis hibisicifoliae* Shinji, 1922.
=*Aphis mugomae* Shinji, 1922.
=*Aphis vitifoliae* Shinji, 1922.
=*Aphis chloroides* Nevsky, 1929.
=*Aphis flava* Nevsky, 1929.
=*Aphis gossypii* var. *viridula* Nevsky, 1929.
=*Aphis tridacis* Theobald, 1929.

別 名：*瓜蚜*。

寄 主：第一寄主石榴、花椒、木槿和鼠李屬植物，第二寄主棉和瓜類等多種植物。其他有 34 科 80 餘種，包括薜荔、蓮霧、蒲桃、番石榴、枇杷、梨、櫻桃、柑橘類、檬果、西印度櫻桃、腰果等果樹、爵床科之大鄧伯花、爵床，天南星科之彩葉芋、芋、闊蝶芋，五加科之三葉五加，木棉科之木棉，木麻黃科之木麻，菊科之土伏苓、白花鬼針、艾納香、菊花、野唐蒿、臺灣澤蘭、澤蘭，葫蘆科之西瓜、胡(黃)瓜、南瓜、北瓜，大戟科之乳仔草，金縷梅科之楓香，豆科之洋紫荊、紫花苜蓿，千屈菜科之散沫花，木蘭科之白木蘭，錦葵科之風鈴花，黃秋葵、山芙蓉、黃槿、香葵、棉，木槿，野牡丹科之野牡丹，桑科之构樹，榕，白肉榕、雀榕，桃金孃科之桉，紫茉莉科之九重葛，蓼科之珊瑚藤，蕎麥，馬齒莧科之馬齒莧，薔薇科之貼梗海棠、臺灣石楠，水丁香，茜草科之仙丹花、臺灣鉤藤、山黃梔，芸香科之刺花椒，楊柳科之，柳、水柳，玄參科之日本泡桐，茄科之龍葵、黃水茄、刺茄，辣椒、番茄、茄，萬桃花，蕁麻科之山苧麻，馬鞭草科之杜虹，海州常山，柚木，山埔姜，榆科之朴樹、石朴、櫸，蘇木科之黃槐，望江南，高卡科之鐵胆見類，忍冬科之英迷，長梗滿天星，滿天星。

分 佈：全國各地；世界廣泛分佈的種類。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒之馬尼拉麻嵌紋、香蕉嵌紋、大豆嵌紋、甜菜嵌紋、甘藍黑輪點、曇華嵌紋、花菜嵌紋、芹菜嵌紋、柑橘立枯、豇豆嵌紋、Crotalaria 嵌紋、黃瓜嵌紋、天竺牡丹嵌紋、蔓陀蘿增生嵌紋、蔓陀蘿扭曲嵌紋、萵苣嵌紋、紫苜蓿嵌紋、洋蔥黃矮、Ornithogalum 嵌紋、木瓜輪點、木瓜嵌紋、百香果木質化、豌豆嵌紋、甜椒脈紋嵌紋、荷蘭毒草輪點病、馬鈴薯 Aucuba 嵌紋、馬鈴薯病毒 Y、櫻草嵌紋、蘿蔔嵌紋、草莓嵌紋、甘蔗嵌紋、甘薯羽毛狀斑點、甘薯內部木栓化、Tigridia 嵌紋、煙草脈綠嵌紋、番茄萎縮、Tropaelum 嵌紋、鬱金香雜色化、西瓜嵌紋等及持續性病毒之棉 Anthocyanosis 嵌紋、百合簇葉、百合無病徵、落花生簇葉、豌豆增生嵌紋、南瓜黃化嵌紋病毒。

天 敵：*Hierodula patellifera* Serville　廣腹螳螂

Eumicromus sauteri Esben-Peterson　曹氏褐蛉

Chrysopa pallens (Rambur)　大草蛉

Mallada boninensis (Okamoto)　安平草蛉

Anthocoridae　花蝽科

Coccinella septempunctata bruckii Mulsant　七星瓢蟲

Coccinella octopunctata Fabricius　八條瓢蟲

Coccinella repanda Thunberg　波紋瓢蟲

Coelophora chinensis Weise　六星瓢蟲

Harmonia axyridis (Pallas)　異色瓢蟲

Leis dimidiata Fabricius　小十三星瓢蟲

Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲

Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲

Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲

Platynaspidius maculosus Weise　五星瓢蟲

Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲

Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki　二星小黑瓢蟲

Scymnus (*Pullus*) *frontalis quadripustulatus* Herbst 四星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐斑小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Synpharmonia conglobata (Linnaeus) 菱斑和瓢蟲
柄狀瓢蟲
甘蔗小黑瓢蟲
Episyrphus balteatus (De Geer) 黑帶食蚜蠅
Ischiodon scutellaris (Fabricius) 短刺刺腿食蚜蠅
Metasyrphus corollae (Fabricius) 大灰食蚜蠅
Sphaerophoria scripta (Linnaeus) 短翅細腹食蚜蠅
Trioxys (*Binodoxys*) *communis* Gahan 棉蚜刺繭蜂
Trioxys (*Binodoxys*) *indicus* Subba Rao et Sharma 木槿蚜刺繭蜂
Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂
Lipolexis gracilis Förster 繡蚜繭蜂
Ephedrus persicae Froggatt 桃蚜繭蜂
Ephedrus plagiator (Nees)
Aphelinus mali (Haldman) 日光蜂(蘋果綿蚜矮小蜂)
Aphelinus sp.

790. **Aphis ichigocola** (Shinji) 草莓蚜 (Tao, 1990:178; 1999:59; Zhang et al., 1992:371)
Cerosipha ichigocola Shinji, 1924:254.
Cerosipha ichigocola Shinji, 1941:354.
寄 主：草莓。
分 佈：臺灣、福建、雲南、山東；日本。

791. **Aphis nerii** Boyer et Fonscolombe 夾竹桃蚜 (Tao, 1999:59; Wang, 1981:229-233)
Aphis nerii Boyer et Fonscolombe, 1841, 10:179.
=*Aphis asclepidis* Fitch, 1851:
=*Aphis lutecens* Monell, 1879:
寄 主：木瓜。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本、馬來西亞、印度、印尼、歐洲、非洲、美洲。
傳 病：木瓜輪點病。

792. **Aphis odinae** v. d. Goot 梨吹粉蚜 (Chen et Wang, 1987:119-120; Luo et al., 1996:54; Zhang et Li, 1997:29-30)
別 名：*梨粉蚜*，*檬果蚜*。
寄 主：梨、檬果。
分 佈：海南、陝西。

793. **Aphis pomi** De Geer 蘋果蚜 (An, 1993(4):47; Cao, 1996(2):29; Chen et Wang, 1987:64; Gou, 1999(2):44; Han et al., 2000(1):54; Jia et al., 1993(4):39-40; Jiang et al., 1998(1):43-44; Jin, 1994(2):40; Leng et Cao, 1996(4):43; Li, 1993:27; Li et Ren, 1997:41-42; NZWDI, 1981:1708; Pan, 1994(3):38; Po et al., 2000(2):10; Qin, 1997(4):25; Qu, 1993(4):61; Qu, 1996(3):18; Sun et al., 1998(2):13; Tao, 1990:181; Tue et Mao, 1999(2):20; Wang et al;. 1006(3):10; Wen, 1996(3):50; Zhang, 1987[ed.]:69; Zhang et al., 1996(4):13; Zhao, 1997(1):53; 1997(2):45, 57; Zhu, 1994(2):13)
Aphis pomi De Geer, 1773, 3:53.
=*Aphis mali* Fabricius, 1775.
=*Aphis bicolor* Haldeman, 1844.
=*Aphis cydoniae* Boisduval, 1867.

=*Aphis crataegi* Buckton, 1879. (*nec* Kaltenback, 1843)
=*Aphis eriobotryae* Schoutedon, 1905.
別 名：*梨綠蚜*、*蘋果黃蚜*。
寄 主：蘋果、梨、桃、杏、沙果、貼梗海棠、櫻桃、檸檬、枇杷、山楂、臺灣石楠等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、四川、浙江、江蘇、陝西、河南、山西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、中亞細亞、歐洲、美洲。
天 敵：*Adalia bipunctata* (Linnaeus) 二紅星瓢蟲
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Lemnia wsinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica (Thunberg) 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂
Praon volucre Haliday 蘋蚜外繭蜂
Aphelinus mali Haldeman 蘋果綿蚜矮小蜂(日光蜂)

794. **Aphis rumicis** Linnaeus 酸模蚜 (Chao et Chen, 1991:55-61; Tao, 1990:181; 1999:60)
Aphis rumicis Linnaeus, 1758:451.
Aphis rhei Koch, 1853:
Aphis carbocolor Gillette, 1907:
Aphis davidsooniella Theobald, 1927:
寄 主：*Solanum tuberosum*, *S. nigrum*, *Bauhinia variegata*, 龍葵、羊蹄。
分 佈：臺灣、江西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河北、吉林；日本、廣分佈種。
傳 病：木瓜輪點病。

795. **Aphis stranvaesiae** Takahashi 玉山梨蚜 (Tao, 1990:183; 1999:60)
Aphis stranvaesiae Takahashi, 1937:14.
寄 主：玉山梨、薔薇。
分 佈：臺灣、山東。

796. **Brachycaudus (Acaudus) cardui** (Linnaeus) 飛簾短尾蚜 (Tao, 1999:63; Zhang et al., 1987:458)
Aphis cardui Linnaeus, 1758:452.
Brachycaudus cardui
寄 主：第一寄主李、梅、榆葉梅、櫻桃、烏荊子、杏、小櫻桃、甜櫻桃；第二寄主菊科、紫草科。
分 佈：江西、黑龍江；日本、巴基斯坦、阿富汗、小亞細亞、非洲、北美。

797. **Brachycaudus divaricatae** Shaposhnikov 梅短尾蚜 (Tao, 1999:63; Wang et al., 1996, 12(2):91)
Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956:228.
寄 主：梅、杏。
分 佈：甘肅。

798. **Brachycaudus helichrysi** (Kaltenbach) 李短尾蚜 (ASZI, 1986, 1:258; Huang et Gao, 1996:240; Tao, 1990:203; 1999:63; Xue, 2000(1):43; Yunn., 1987:427; Zhang et Zhang, 1992:75-76; Zhang et al., 1992:374)
Aphis helichrysi Kaltenbach, 1843:102.

=*Aphis adscita* Walker, 1848.
=*Aphis conviva* Walker, 1848.
=*Aphis familiaris* Walker, 1848.
=*Aphis prunina* Walker, 1848.
=*Aphis socia* Walker, 1848.
=*Aphis adjecta* Walker, 1849.
=*Aphis abartsiae* Walker, 1849.
=*Aphis chrysanthemi* Walker, 1849.
=*Aphis consumpta* Walker, 1849.
=*Aphis convecta* Walker, 1849.
=*Aphis detracta* Walker, 1849.
=*Aphis incumbens* Walker, 1849.
=*Aphis insessa* Walker, 1849.
=*Aphis nociva* Walker, 1849.
=*Aphis persorbens* Walker, 1849.
=*Aphis appodita* Walker, 1850.
=*Aphis bellis* Buckton, 1850.
=*Aphis insititiae* Koch, 1854.
=*Aphis mysosotidis* Koch, 1854.
=*Aphis petasitidis* Buckton, 1879.
=*Aphis marutae* Oestlund, 1886.
=*Aphis leontopodii* Schouteden, 1903.
=*Anuraphis poae* del Guercio, 1916.
=*Siphocoryne cacaliae* Matsumura, 1918.
=*Aphis senecio* Swain, 1918.
=*Anuraphis abrotaniella* Theobald, 1919.
=*Aphis fasciatus* del Guercio, 1920.
=*Anuraphis centauriella* Theobald, 1921.
=*Aphis prunus* Shinji, 1922.
=*Acaudus bipapillatus* Theobald, 1923 .
=*Anuraphis cinerariae* Theobald, 1923.
=*Aphis cyani* Theobald, 1923.
=*Anuraphis glaucifoliae* Theobald, 1923 .
=*Anuraphis sherardiae* Theobald, 1926.
=*Anuraphis ammobii* Hori, 1929.
=*Anuraphis helichrysli* ssp. *asiaticus* var. *nigriventris* Nevsky, 1929.
=*Anuraphis pruniavium* Nevsky, 1929.
=*Anuraphis brevisiphon* del Guercio, 1930.
=*Anuraphis filaginis* var. *anthemidis* del Guercio, 1930.
=*Anuraphis flavecens* del Guercio, 1930.
=*Anuraphis insititiella* del Guercio, 1930.
=*Anuraphis pruni* del Guercio, 1930.
=*Anuraphis mumecola* Shinji, 1930.
=*Barchycaudus tianshanicus* Nevsky, 1951.

別 名：*光管舌尾蚜*，*李圓尾蚜*。

寄 主：梅、桃、杏、李、榆葉梅、櫻桃等，蠶豆，菊科之藿香薊、白花鬼針、臺灣澤蘭、紫花藿香薊、昭和草、紫背天葵、白鳳菜、鼠麴草、鼠麴舅、茼蒿、蔓黃菀等。

分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、泰國、尼泊爾、阿富汗。

附 記：爲害桃樹嫩葉引起向上緊密捲曲，阻止生長。在吉林夏季由杏、李等植物上遷向菊科植物爲害，秋末飛回李樹上行有性生殖，產卵越多。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒之黃瓜嵌紋及持續性之蘿蔔黃萎。

天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson　曹德褐蛉
Mallada boninensis (Okamoto)　安平草蛉
Coccinella septemunctata bruckii Mulsant　七星瓢蟲

Coccinella octopunctata Fabricius　八條瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg　波紋瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise　褐斑小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp.　褐尾小黑瓢蟲
Epistrophe balteatus De Geer　黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius　刺腿食蚜蠅
Paragus serratus Fabricius　短刺食蚜蠅
Chamaeyiidae　斑腹蠅科
Leucopis puncticornis Meigen　白背斑腹蠅

799. **Capitophorus elaeagni** (del Guercio) 胡頹子釘毛蚜 (Hun., 1992:159; Tao, 1990:249; 1999:64; Zhang et al., 1992:147)
Aphis elaeagni del Guercio, 1894:189.
=*Myzus braggii* Gillette, 1908.
Capitophorus elaeagni van der Goot, 1913.
=*Aphis viridis* Craveri, 1915.
=*Myzus carthusianus* Haviland, 1918.
=*Capitophorus cynariella* Theobald, 1923.
=*Capitophorus arctifoliae* Shinji, 1924.
=*Capitophorus cirsii* Nevsky, 1928.
寄　主：胡頹子科胡頹子屬之植株和菊科的薊屬之小型植物。
分　佈：臺灣、湖南、四川、湖北、山東、遼寧；日本、印度、尼泊爾、埃及、歐洲、北美、澳洲。
傳　病：傳佈非持續性植物病毒之甘藍星輪點、洋蔥黃萎縮、Stock 嵌紋。

800. **Capitophorus hippophaes** (Walker) 胡蔞釘毛蚜(Tao, 1990:251; 1999:65)
Aphis hippophaes Walker,1852:302.
Capitophorus hippophaes, van der Goot, 1915.
=*Amphorophora minima* Mason, 1925.
=*Capitophorus gillettei* Theobald, 1926.
寄　主：臺灣胡頹子、玉山胡頹、水蔞、早苗蔞。胡頹子爲第一寄主。
分　佈：臺灣、香港、四川、西康、浙江、江蘇、山東、河南、河北、新疆、吉林；日本、印尼、泰國、印度、尼泊爾、歐洲、澳洲、新西蘭。
傳　病：傳佈非持續性植物病毒之甘藍黑輪點、金蓮花嵌紋。
天　敵：*Coccinella septempunctata bruckii* Mulsant　七星瓢蟲
Coccinella octopunctata Fabricius　八條瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg　波紋瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲
Leis dimidiata Fabricius　小十三星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp.　褐尾小黑瓢蟲

801. **Cavariella salicicola** (Matsumura) 柳雙尾蚜 (Chao et Chen, 1991:55-61; Tao, 1990:228; 1999:66)

Nipposiphum salicicola Matsumura, 1917:410.
=*Cavariella bicaudata* (Essig et Kuwana, 1918:)
=*Cavariella mistubae* Shinji, 1924:
=*Cavariella azamii* Shinji, 1930:
寄 主：柳、旱柳、水柳、芹菜。
分 佈：臺灣、江西、廣東、西藏、雲南、浙江、江蘇、河南、山東、河北、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、日本、印度。
傳 病：木瓜輪點病。

802. **Cryptomyzus ribis** (Linnaeus) 茶蔗子隱瘤蚜 (Tao, 1999:68; Zhang et al., 1987:458)

Aphis ribis Linnaeus, 1758:451.
Cryptomyzus ribis, Hille Ris Lambers, 1953:
寄 主：第一寄主普通茶蔗子、茶蔗子植物；第二寄主水蘇屬。
分 佈：遼寧；日本、歐洲、北美。

803. **Hyalopterus amygdali** (Blanchard) 桃粉大尾蚜 (ASZL, 1986, 1:246; Chen, 1986, 4(1,2):27-29; Hun., 1992:162; Tan, 1999:70; Xue, 2000(1):43; Yu et Xu, 1995:114; Yunn., 1987:409; Zhang et al., 1992:148; 1992:376; Zhao et al., 1997:189)

Aphis amygdali Blanchard, 1840:206.
Hyalopterus amygdali,
寄 主：桃、梅、李、檫、杏等李屬植物、梨、榆葉梅、蘆葦等。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、浙江、安徽、青海、山東、河北、遼寧、、東北地區；朝鮮、日本、歐洲、中東、北非、東非、美國。

804. **Hyalopterus pruni** (Geoffroy) 桃粉蚜 (Tao, 1990:189; 1999:70; Xue, 2000(1):43)

Aphis pruni Geoffroy, 1762:497.
=*Aphis arundinis* Fabricius,1775.
=*Aphis spinarum* Hartig, 1814.
=*Aphis gracilis* Walker, 1852.
=*Aphis phragmiticola* Oesthund, 1886.
Hyalopterus pruni Takahashi, 1919:
別 名：*桃粉大尾蚜*。
寄 主：杏、巴旦杏、梅、桃、李、蘆葦。
分 佈：全世界；臺灣、福建、廣東、香港、雲南、四川、江蘇、陝西、山東、山西、河北、遼寧；印尼、印度、中亞、非洲、歐洲、北美、澳洲、新西蘭。
傳 病：傳佈非持續性植物病毒之芹菜嵌紋、黃瓜嵌紋、洋蔥黃萎病及持續性病毒之葉紅葉。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson 曹德褐蛉
Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Betasyrphus serarius (Wiedmann) 黑色食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅

Aphidius colemani Viereck 蚜繭蜂
Ephedrus orientalis Stary et Schlinger 茄蚜繭蜂
Ephedrus plagiator (Nees)
Ephedrus persicae Froggatt 桃蚜繭蜂

805. **Hyperomyzus lactucae** (Linnaeus) 苦苣菜超瘤蚜 (Tao, 1999:70; Zhang et al., 1987:458)
Aphis lactucae Linnaeus, 1758:452.
=*Rhopalosiphum ribis* Buckton, 1879:
=*Rhopalosiphum oleraceae* van der Goot, 1917:
=*Rhopalosiphum ribijaponica* Shinji, 1924:
=*Am. cosmopolitana* Mason, 1925:
Hyperomyzus lactucae, Börner, 1933:
寄 主：第一寄主日本茶藨子；第二寄主苦苣(苣買菜)、非洲菜。
分 佈：黑龍江；日本、印度、非洲、歐洲、澳洲、夏威夷。

806. **Hyperomyzus yulongshanensis** Zhang et al. 玉龍山超瘤蚜 (Zhang et al., 1992:376)
Hyperomyzus yulongshanensis Zhang et al., 1992:376-377.
寄 主：梨?
分 佈：雲南(麗江玉龍山)。

807. **Hysteroneura setariae** (Thomas) 無肘脈蚜 (Chao et Chen, 1989:411; 1991:55-61; Tao, 1990:194; 1999:71)
Siphonophora setariae Thomas, 1878:5.
=*Siphonophora panicola* Thomas, 1878:
=*Aphis prunicolens* Ashmead, 1881.
=*Aphis scotti* Sanderson, 1905.
=*Aphis bituberculata* Wilson, 1914.
Hysteroneura setariae, Cutright, 1925:
=*Hysteroeura ogloblini* Blanchard, 1939.
=*Hysteroeura gregoryi* Eastop, 1954.
寄 主：桃樹、禾本科之颱風草、狗尾草、大理草、兩耳草、鋪地黍、求朱草、竹葉草、水稗、馬唐類、狗牙根、牛筋草、水稻等。
分 佈：臺灣、香港；越南、菲律賓、印度、非洲、美洲。
傳 病：傳佈非持續性植物病毒之洋蔥黃萎縮、甘蔗嵌紋、胡瓜嵌紋、大豆嵌紋、西瓜嵌紋、南瓜黃化嵌紋病毒、木瓜輪點病。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson 紹德褐蛉
Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲
Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Leis dimidiata Fabricius 小十三星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki 二星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Stethorus loi Sasaji 小黑瓢蟲
Synonycha grandis Thunberg 大十三星瓢蟲
四條瓢蟲

Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Chamaeyiidae 斑腹蠅科
Leucopis punctcornis Meigen 白背斑腹蠅

808. **Lipaphis erysimi** (Kaltenbach) 僞菜蚜 (Fang et al., 1993:211-225; Feng, 1986:163-170; Feng et You, 1988:135-147; Hsiao, 1994:549; Hsiao, 1999, 19(4):307-318; Liu et Meng, 1987, 5(1,2):48; Liu et Meng, 1990, 17(2):169; Rui et al., 1996, 22(1):27-28; Rui et al., 1996, 23(3):258-262; Tang et al., 1988, 15(1):63-66; Tao, 1990:206; 1999:73; Wang et al., 1997, 24(1):25-28; Wei et al., 1988, 14(6):17-20; You et al., 1982:294; Yu et Xu, 1995:114; Zhang, 1987[ed.]:61; Zhang, 1996:91; Zhang et al., 1992:148, 1992:378; Zhao et al., 1990, 17(3):223-227)
Aphis erysimi Kaltenbach, 1843:99.
=*Aphis contermina* Walker, 1849:
=*Rhopalosipphum pseudobrassicae* Davis, 1914:
=*Siphocoryne indobrassicae* Das, 1918:
=*Aphis mathiolella* Theobald, 1918:
=*Rhopalosiphum papaveri* Takahashi, 1921:
=*Aphis pseudobrassicae* Davis, 1914:
別 名：*蘿蔔蚜*，*菜縊管蚜*。
寄 主：柑橘、桃、油菜、白菜、蘿蔔、芥菜、甘藍等十字花科蔬菜類及植物、茼蒿、豆類、石龍芮、罌粟、中草藥、油料作物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、印尼、印度、伊拉克、以色列、東非、埃及、澳洲、新西蘭、美國。

809. **Macrosiphum avenae** (Fabricius) 麥長管蚜 (Cao et al., 1989, 16(2):239-243; Chao, 1982:89; Gao, 1994, 31(4):201-205; Gao, 1995, (2):8-9; Gao, 1996, 5(Suppl.):92-94; Gao et al., 1998, 25(1):1-5; Liu et al., 1993, 2(3):76-78; Lou et al., 1988, 15(3):153-158; Luo et al., 1990, 17(3):209-213; Tian et al., 1996, 22(4):17-19; Wang et al., 1986, 5:32-35; Xie et al., 1987, 14(1):37-38; Yu et Zu, 1995:114; Zhang, 1994, 3(2):66-68; Zhang et Zhong, 1983:360-362; Zhang et al., 1992:150)
Sitobion avenae Fabricius, 1795:
=*Macrosiphum granarium* (Kirby),
=*Macrosiphum akebiae* Shinji,
寄 主：桃、小麥、大麥、燕麥、油麥、甘蔗花穗、稻穗、水稻苗、高粱、玉米、夏季爲害生麥曲、雞冠草、荻草、芒草、雞腿草、蕨菜；國外爲害雀麥、黑麥、狗牙根、芒草、蒿草、紫羊茅、早熟禾、鴨嘴草、金玉香、唐菖蒲、紅三葉、毛茛、茅莓。
分 佈：福建、西藏、山東、全國；亞洲、東非、歐洲、北美。

810. **Matsumuraja formosana** Takahashi 中華指角蚜 (Tao, 1990:231; 1999:77)
Matsumuraja formosana Takahashi, 1925:22.
=*Matsumuraja rubi* Moritsu, nec Mtsumura, 1957.
寄 主：懸鉤子、*Fragaria ananassa* Hort.
分 佈：臺灣、四川。

811. **Matsumuraja rubicola** Takahashi 臺灣指角蚜 (Tao, 1990:231; 1999:77)
Matsumuraja rubicola Takahashi, 1927:4.
寄 主：懸鉤子、*Fragaria ananassa* Hort.
分 佈：臺灣。

812. **Matsumuraja rubifoliae** (Takahashi) 川康指角蚜 (Tao, 1990:232; 1999:77)
Neophorodon rubifoliae Takahashi, 1922:204.
=*Neophorodon rubi* Takahashi, 1923. (*nec* Matsumura, 1918).

=*Acanthaphis omeiensis* Tseng et Tao, 1938:
=*Matsumuraja rubifoliae* var. *taiheisana* Takahashi, 1939:
寄 主：懸鉤子。
分 佈：臺灣、四川、西康；日本、西伯利亞、印尼。

813. **Microlophium rubiformosanum** (Takahashi) 莉莓蚜 (Tao, 1990:280; 1999:80)
Macrosiphum rubiformosanum Takahashi, 1927:13.
Microlophium rubiformosanum, Hille Ris Lambers, 1976:
寄 主：懸鉤子之一種。
分 佈：臺灣、浙江；日本。
天 敵：*Trioxys* (*Binodoxys*) *carinatus* Stary et Schlinger　蚜繭蜂

814. **Myzus malisuctus** Matsumura 蘋果瘤蚜 (ASZI, 1:267; Cao, 1998(2):53-54; Chen et Wang, 1987:64-65; Dong et al., 1993(3):44-45; Ge, 1993:40-41; Hu et al., 1997(1):21; Huang, 1990[ed.] 2:23-24; Jiang et al., 1998(1):43-44; Jin, 1994(2):40; NZWDI, 1981:1708; Pan, 1994(3):38; Qin, 1997(4):25; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Wang, 1997(2):49; Wang et Zhao, 1996(4):36; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Yunn., 1987:447; Zhang, 1993(1):51; Zhang et al., 1992:383; Zhang et al., 1995(2):33; Zhao, 1997(2):45, 57; Zhao et al., 1998(1):33)
寄 主：蘋果、海棠、沙果、梨、山荊子、杜梨、棠梨。受害葉縱捲呈雙筒形。
分 佈：臺灣、雲南、中南、華中、華東、華北、東北；朝鮮、日本。
天 敵：草蛉、七星瓢蟲、龜紋瓢蟲、蠟蟬等。

815. **Myzus momonis** Matsumura 桃瘤蚜 (Chao, 1982:88; Chen et Wang, 1987:153; Huang et Gao, 1996:239; Wang et al., 1993:24; Xue, 2000(1):43; Zhang, 1987[ed.]:62; Zhang et Zhang, 1992:75-76)
別 名：*桃疑縮蚜*。
寄 主：桃、梨、梅、李、櫻桃、酸櫻桃、艾
分 佈：臺灣、福建、西南、江蘇、陝西、華東、華北、西北、東北；日本。
天 敵：*Ephedrus persicae* Froggatt　桃瘤蚜繭蜂

816. **Myzus mumecola** Matsumura 杏瘤蚜 (ASZI, 1986, 1:267; Tao, 1990:243, 1999:81)
Macrosiphum mumecola Matsumura, 1917:399.
=*Myzus umecola* Shinji, 1924.
別 名：*梅瘤蚜*。
寄 主：杏、梅。
分 佈：臺灣、青海、陝西、山東、河北、北京、內蒙古、遼寧；日本、西伯利亞、印度。
天 敵：*Mallada boninensis* (Okamoto)　安平草蛉
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Symnus (*Pullus*) sp.　褐尾小黑瓢蟲
Episyrphus balteatus (De Geer)　黑點食蚜虻
Ischiodon scutellaris Fabricius　刺腿食蚜虻
Paragus serratus Fabricius　短刺食蚜虻

817. **Myzus mushanensis** Takahashi 霧社瘤蚜 (Tao, 1999:82)
Myzus mushanensis Takahashi, 1931:67.
寄 主：櫻桃。
分 佈：臺灣、遼寧；日本。

818. **Myzus persicae** (Sulzer) 桃蚜 (ASZI, 1986, 1:268; Bei et Jiang, 1999(3):19; Cao, 1998(2):53-54; Chao,

1981:203-206; Chao, 1982:88; Chao et Chen, 1989:411; Chen, 1986, 4(1,2):27-29; Chen et Wang, 1987:153; Chen et al., 1992, 3:18-23; Chen et al., 1994, 21(4):363-368; Feng, 1986:163-170; Feng et Hsiao, 1984:423-426; Fu, 1995(3):42; Han, 1993(1):50; Hsieh et Huang, 1986:273-288; Huang, 1990[ed.] 2:166-170, 217-220; Huang et Gao, 1996:165; Huang et Hsieh, 1982:291; 1983:77-86; 1984:395-400; Huang et Tsai, 1984:432; Huang et al., 1996:111-118; Hun., 1992:167; Jiang et al., 1985, 4:10-17; Kao, 1992:63-69; Kuo, 1991:118-129; Kuo, 1993:255-265; Kuo et Liu, 1995:275-285; Kuo et al., 1999:1-18; Li, 1996(3):36; Li et Li, 2000(2):12; Li et Yang, 1993:21-22; Li et al., 1963, 2(3):297-308; Li et al., 1988, 15(4):240, 246; Li, et al., 1992, 12(2):135-140; Li et Chen, 1998(2):11-12; Liao et al., 1979:279-284; Liu et Huang, 1989, 16(4):259-263; Liu et Meng, 1987, 5(1,2):48; Liu et Meng, 1990, 17(2):169; Liu et al., 1996:332; Nee et al., 1992:357; NZWDI, 1981:1757; Pingtung AC., 1986:41; Qu, 1993(4):61; Shi et al. 1989-'90:80; Sun, 1984:375-377; Tao, 1990:245; 1999:82; Tao et al., 1996, 18(4)(Suppl.):14-18; Tang, 1994(2):30; 1961:41-53; Ting, 1999(3):19; Tseng, 1994:522; Wang, 1981:229-233; Wang et al., 1983:76; Wang et al., 1991, 18(4):351-355; Wang et al., 1996(2):36-37; Wang et al., 1996, 12(2):91; Wang et al., 1997, 24(1):25-28; Wen et al., 1999(1):41-42; Xie, 1992, 18(1):31-32; Xue, 2000(1):43; Xue et al., 2000(2):24; Yang, 1971:70-73; Yang et al., 1999, 26(2):147-152; Yang et al., 2000(1):55; Yu et Xu, 1995:114; Yu et al., 1993(2):35; Yunn., 1987:447; Zhang, 1987[ed.]:62; Zhang, 1996:92; Zhang et Li, 1997:29-30; Zhang et Zhang, 1992:75-76; Zhang et al., 1992:153; 1992:383; Zhang et al., 2000(2):13; Zhang et al., 2000(2)44; Zhao, 1981, 8(3):203-206; Zhao et Lin, 1994:17-21; Zhao et Lin, 1994:23-25; Zhao et al., 1997, 24(1):19-24; Zhao et al., 1997:189; Zhou, 1993(2):46; Zhou, 1994:39-40; Zhu et al., 1996(4):14-17. Zhu et al., 1999(4):57; Zou et al., 1995(4):8)

Aphis pericae Sulzer, 1776:105.
=*Aphis dianthi* Schrank, 1801:
=*Aphis vulgaris* Kyber, 1815:
=*Aphis dubia* Curtis, 1842:
=*Aphis rapae* Curtis, 1842:
=*Aphis convolvuli* Kaltenbach, 1843:
=*Aphis particeps* Walker, 1845:
=*Aphis vastator* Smee, 1846:
=*Aphis consors* Walker, 1848:
=*Aphis depodita* Walker, 1848:
=*Aphis derelicta* Walker, 1849:
=*Aphis egressa* Walker, 1849:
=*Aphis redundans* Walker, 1849:
=*Siphonophora nasturtii* Koch, 1855:
=*Aphis persicophila* Passerini, 1860:
=*Siphonophora achyrantes* Monell, 1879:
=*Rhopalosiphum tulipae* Thomas, 1879:
=*Siphonophora antirrhinii* Macchiati, 1883:
=*Rhopalosiphum galeactitis* Machiati, 1883:
=*Myzus malvae* Oestlund, 1886:
=*Myzus pergandei* Sanderson, 1901:
=*Aphis cymbalariae* Schouteden, 1900:
=*Phorrodon cynogloosis* Williams, 1911:
=*Rhopalosiphum betae* Theobald, 1913:
=*Rhopalosiphum lactucellum* Theobald, 1914:
=*Macrosiphum lophospermum* Theobald, 1914:
=*Macrosiphum lycopersicella* Theobald, 1914:
=*Myzodes tabaci* Mordvilko, 1914:
=*Rhopalosiphum trilinatum* del Guercio, 1920 :
=*Myzus persiae* ssp. *dyslycialis* Muller,
=*Myzus persicae* var. *poculacella* Theobald, 1926 :
=*Myzus persicae* var. *sanginsorbiella* Theobald, 1926:
=*Myzus dyslycialis* Muller, 1955:

別 名：*桃赤蚜*、*梅蚜*、*煙蚜*。

[Green peach aphid]

寄 主：第一寄主桃樹；第二寄主杏、李、榛、梅、蘿蔔等十字花科植物及煙、麻、棉、茄、辣椒、馬鈴薯、蠶豆、南瓜、甜菜、芝麻、蜀葵、甘藷、人參、三七、枸杞、大黃等百餘種經濟植物及雜草，爲多食性蚜蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、雲南、四川、浙江、江蘇、陝西、寧夏、山西、山東、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、泰國、印度、尼伯爾、世界各地。

傳 病：傳佈非持續性植物病害之 Ajuga 病毒、Arabis 嵌紋、豆(寬) 凋萎、豆普

通嵌紋、豆黃嵌紋、甜菜嵌紋、甘藍黑輪點、甘藍輪壞死、疊華嵌紋、荷蘭石竹潛伏病、石竹嵌紋、花菜嵌紋、芹菜皺葉嵌紋、芹菜嵌紋、黎 Stauden 病毒、菊花佳音嵌紋、菊花病毒 B、苜蓿 (地下) 嵌紋、Cocksfoot 條、扁豆嵌紋、Crotaria 嵌紋、黃瓜嵌紋、南瓜黃化嵌紋毒、Dahlia 嵌紋、曼陀羅扭曲嵌紋、曼陀羅蝕刻、曼陀羅病毒、香雪蘭嵌紋、Henbane 嵌紋、野芫菁 mild 嵌紋、生菜(萵苣)嵌紋、百合輪點、Lucerne 嵌紋、錦葵黃脈、洋蔥黃萎縮、嘉多利亞鬱嵌紋、鬱金香兒嵌紋、木瓜嵌紋、木瓜輪點嵌紋、百香果木質病、豌豆嵌紋、辣椒嵌紋、辣椒葉脈條紋嵌紋、胡蘿蔔毒草輪點、馬鈴薯 aucuba 嵌紋、馬鈴薯捲葉嵌紋、馬鈴薯紡錘莖、馬鈴薯病毒 A、馬鈴薯病毒 Cn、馬鈴薯病毒 Y、蘿蔔嵌紋、多蔥黃、大豆黃萎縮、Stock 嵌紋、草莓輕型黃邊病、草莓葉脈條紋、甘藷嵌紋、甘藷芽毛斑紋、甘藷內木栓、甘藷病毒 A、起絨草嵌紋、煙草蝕刻、煙草輪點、煙草萎縮、番茄 asperm、金蓮花嵌紋、金蓮花輪點、鬱金香破損、水田芹嵌紋、西瓜嵌紋；持續性病毒之甜菜黃網、苜蓿地下阻止 (stunt)、玉米葉點、錦葵、豌豆母系嵌紋、豌豆捲葉、煙龍草黃網、蘿蔔黃、煙草葉脈扭曲、番茄黃網等。

天 敵：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephen) 中華草蛉
Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉
七星草蛉
Adonia variegata (Gooze) 多異瓢蟲
Calvia chinensis (Mulasant) 華裸瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲
Chilomenne quadriplagiata (Swartz) 四斑月瓢蟲
Chilomenes sexmaculata (Fabricius) 六斑月瓢蟲
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲
Coelophora biplagiata (Swartz) 雙帶盤瓢蟲
Coelophora chinensis Weise 六星瓢蟲
Leis dimidiata Fabricius 小十三星瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Harmonia axyridis Pallas 異色瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *frontlis quadripustulatus* Herbst 四星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐條小黑瓢蟲
Symnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Betasyrphus serarius (Weidmann) 黑色食蚜蠅
Epistrophe horishana (Matsumura) 高山食蚜蠅
Episyrphus balteatus (De Geer) 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Melanostoma orientalis Weidmann 東方食蚜蠅
Metasyrphus corollae (Fabricius) 條背食蚜蠅(大灰食蚜蠅)
Paragus serratus Fabricius 短刺食蚜蠅

Sphaerophoris cylindrica Say 筒形食蚜蠅
Sphaerophoria scripta (Linnaeus) 短翅細腹食蚜蠅
Aphidius gifuensis Ashmead 煙蚜繭蜂
Diaeretiella rapae (M'Intosh) 菜蚜繭蜂
Ephedrus persicae (Froggatt) 桃蚜繭蜂
Ephdrus plagiator (Nees) 麥蚜繭蜂
Lipolexis gracilis Förster 繡蚜繭蜂
Praon mongolicum Watanabe 桃蚜外繭蜂
Pachyneuron aphidis Bouché 寬緣金小蜂
Aphidencyrtus aphidivorus Mayr 次生跳小蜂
Aphelinus mali (Haldeman) 蘋果綿蚜矮小蜂(日光蜂)
Megaspilidae 大痣盾細蜂科
Dendrocerus carpenteri (Curtis) 卡氏大痣盾細蜂

819. **Myzus prunisuctus** Zhang 山櫻黑瘤蚜 (Tao, 1999:82; Zhang et Zhong, 1980:60)
Myzus prunisuctus Zhang, 1980:60.
寄 主：山櫻桃。
分 佈：浙江(天目山)。

820. **Myzus tropicalis** Takahashi 桃縱捲葉蚜 (Yunn., 1987:447)
寄 主：桃、山桃。
分 佈：臺灣、雲南、浙江、山東。

821. **Myzus varians** Davidson 桃捲葉蚜 (Tao, 1990:248; 1999:82)
Myzus varians Davidson, 1912:409.
=*Myzus tropicalis* Takahashi, 1923.
=*Myzus clematifoliae* Shinji, 1924.
=*Macrosiphum sumomocola* Monzen, 1929.
寄 主：桃、串鼻龍。
分 佈：臺灣、雲南、四川、西康、浙江、山東、遼寧；日本、印度、北美。

822. **Ovatus crataegarius** (Walker) 山楂圓瘤蚜 (ASZI, 1986, 1:261; Tao, 1990:235; 1999:84; Yunn., 1987:448)
Aphis cretagarius Walker, 1850:46.
=*Aphis melisae* Walker, 1852:
=*Aphis menthae* Walker, 1852:
=*Myzus methae* Walker, 1852:
=*Myzus malicolens* Hori, 1929:
Ovatus crataegarius, Heinze, 1960:
別 名：*薄荷蚜*。
寄 主：第一寄主山楂、蘋果、海棠、搖桲、木瓜(*Chaenomeles*)等；第二寄主薄荷和地筍等。
分 佈：臺灣、雲南、浙江、江蘇、河北、遼寧；朝鮮、日本、印度、巴基斯坦、中亞細亞、歐洲、北美。

823. **Pentalonia nigronervosa** Coquerel 香蕉交脈蚜 (Huang, 1990[ed.] 2:290-292; Huang et Gao, 1996:272; Huang et Tsai, 1984:432; Kung, 1963:224-246; Lu et al., 1975:433; Sun, 1961:176-193; 1965:158-173; Tao, 1900:213; 1999:84; Tsai, 1995:38-39; Tsai et Huang, 1984:127; Tsai et al., 1986:147-153; Tseng, 1994:524; Wu, 1991:14; Yang, 1989: 145-146; Yunn., 1987:448; Zhang et al., 1992 :300)
Pentalonia nigrovervosa Coquerel, 1859:260.

=*Pentalonia caladii* van der Goot, 1917:
別 名：*香蕉蚜蟲*。
[Banana aphid]
寄 主：香蕉、大蕉、麻蕉等芭蕉屬植物，良姜、玉桃等良姜屬植物，旅人蕉、山芋、芋、杯芋屬、海芋屬、海里屬、花葉萬年青屬、姜花屬、鶴望蘭屬及仙人掌屬等植物。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、雲南等省區；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、印度、尼泊爾，世界熱帶地區及歐洲、北美的溫室中。
傳 病：傳佈非持續性植物病毒，馬尼拉麻嵌紋，持續性之香蕉萎縮病、香蕉束頂病毒(Banana bunchy top virus)，馬尼拉麻萎縮病。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson　紹德褐蛉
Mallada boninensis (Okamoto)　安平草蛉
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp.　褐尾小黑瓢蟲
Betasyrphus serarius (Wiedmann)　黑色食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer　黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius　刺腿食蚜蠅
Lipolexis scutellaris Mackauer　蚜繭蜂

824. **Phorodon humuli** (Schrank) 指頭蚜 (Tao, 1999:85)
Aphis humuli Schrank, 1801:110.
=*Phorodon asacola* Matsumura, 1917:
Phorodon humuli, Takahashi, 1921:
Phorodon humuli japonensis Takahashi, 1965:
寄 主：桃、李、*Humulus scanden*.
分 佈：臺灣、四川、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、北美、歐洲。

825. **Phorodon japonensis** Takahashi 薄草疣蚜 (ASZI, 1986, 1:265)
寄 主：第一寄主梅、李；第二寄主薄草、啤酒花。
分 佈：山東、河北、北京、東北；日本。

826. **Rhadisectaphis gyirongensis** Zhang 吉隆徑分脈蚜 (Tao, 1999:87; Zhang, 1981:274)
Rhadisectaphis gyirongensis Zhang, 1981:274.
寄 主：蘋果。
分 佈：西藏。

827. **Rhopalosiphum albigubernum** Zhang 白帝縊管蚜 (Zhang et Qiao, 1997:379)
Rhopalosiphum albigubernum Zhang, *In* Zhang et Qiao, 1997:379-380.
寄 主：柑橘。
分 佈：四川。

828. **Rhopalosiphum maidis** (Fitch) 玉米蚜 (Chao et Chen, 1991:55-61; Huang et Tsai, 1984:432; Tao, 1990:185; 1999:88; Tseng, 1994:526; Wang, 1981:229-233; Yen et Huang, 1989:416; Yu et Xu, 1995:115)
Aphis maidis Fitch, 1855;318.
=*Aphis adusta* Zehntner, 1897.

=*Aphis cooki* Essig, 1911.
=*Stenaphis monticalli* del Guercio, 1913.
=*Aphis vulpiae* del Guercio, 1913.
=*Aphis africana* Theobald, 1914.
=*Rhopalosiphum zeae* Rusnova, 1960.
=*Toxoptera* (*Schizaphis*) *setariae* Rusanova, 1962.

寄 主：桃樹、禾本科之玉米、高粱、臺灣野稗、大麥、水稻、甘蔗、小米、大理草、雀稗、燕麥、馬唐、黍類、牛筋草、巴拉草等。

分 佈：全世界，臺灣、福建、江西、湖南、香港、雲南、山東、遼寧；日本、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦等。

傳 病：非持續性植物病毒之大麥嵌紋、疊華嵌紋、胡瓜嵌紋、洋蔥嵌紋、甘蔗嵌紋、木瓜輪點病及持續性植物病毒之大麥黃矮、玉米葉斑等病毒。

天 敵：*Mallada boninensis* (Okamoto) 安平草蛉
Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Leis dimidiata Fabricius 小十三星瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
四條瓢蟲
五星褐斑瓢蟲
Syrphidae 食蚜蠅科
Betasyrphus serarius (Wiedmann) 黑色食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Metasyrphus corollae Fabricius 條背食蚜蠅
Aphidiidae 蚜繭蜂科
Ephedrus (s. str.) *plagiator* (Nees)
Ephedrus (s. str.) *robustus* Liu
Lipolexis gracilis Förster 繡蚜繭蜂
Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂
Aphelinidae 矮小蜂科
Aphelinus sp.

829. **Rhopalosiphum nymphaeae** (Linnaeus) 蓮縊管蚜 (ASZI, 1986, 1:247; Chao, 1982:89; Chen, 1986, 4(1,2):27-29; Huang et Gao, 1990:240; Hun., 1992:168; Tao, 1990: 185; 1999:88; Xue, 2000(1):43; Yu et Xu, 1995:115; Zhang, 1987[ed.]:62; Zhang et Zhang, 1992:75-76; Zhang et al., 1992:153)
Aphis nymphaeae Linnaeus, 1767:714.
=*Aphis plantarum aquaticum* Fabricius, 1794:
=*Aphis butomi* Schrank, 1801:
=*Aphis prunaria* Walker, 1850:
=*Rhopalosiphum alismae* Koch, 1854.
=*Aphis infuscata* Koch, 1854.
=*Rhopalosiphum najadum* Koch, 1854.
=*Aphis aquatica* Jackson, 1908.
=*Siphonocoryne donarium* Matsumura, 1918.
=*Hydaphis sparganii* Theobald, 1925.
別 名：*蓮蕤蚜*、*睡蓮蚜*、*荷縊管蚜*。

寄 主：第一寄主梨、桃、李、杏、梅、櫻桃等植物；第二寄主蓮、慈菇等水生植物。枇杷、山櫻桃、芭蕉、荷花、睡蓮、金銀蓮花、水蓮、水稻、楊、柳、槐葉蘋、地黃、日本水馬齒、田芋仔、石龍芮、水萍、青萍。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、河北、北京、寧夏、遼寧、吉林；朝鮮、日本、印尼、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、新西蘭、非洲、歐洲、北美、南美。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒之蘇菁嵌紋、花菜嵌紋、黃瓜嵌紋、洋蔥黃矮等病毒。

天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson　紹德褐蛉
Mallada boninensis (Okamoto)　安平草蛉
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japnica Thunberg　龜紋瓢蟲
Stethorus loi Sasaji　小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise　褐斑小黑瓢蟲
Epistrophe balteatus De Geer　黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius　刺腿食蚜蠅
Paragus serratus Fabricius　短刺食蚜蠅
Trioxys (s. str.) *auctus* (Haliday)　蚜繭蜂
Aphelinus sp.　矮小蜂

830. **Rhopalosiphum padi** (Linnaeus) 禾穀縊管蚜 (ASZI, 1986, 1:247; Chao, 1982:89; Chen, 1986, 4(1,2):27-29; Chen et al., 1989, 16(2):113-117; Cheng, 1990, 17(2):131; Hua., 1992:168; Li et al., 1991, 13(4):390-392; Li et al., 1995, 21(2):2-4; Qiu et al., 1997, 24(2):169-174; Shi et al. 1989-'90:81; Tao, 1900:187; Tang, 1994(2):30; Tian et al., 1996, 22(4):17-19; Tseng, 1994:328; Xue, 2000(1):43; Yang et al., 1994, 21(2):155-161; Yang et al., 1996, 23(1):89-90; Yu et Xu, 1992:115; Yunn., 1987:413; Zhang et Qiao, 1997:380; Zhang et al., 1995, 21(2):5-7)

Aphis padi Linnaeus, 1758:451.
=*Aphis avenaesativae* Schrank, 1801:
=*Aphis prunifoliae* Fitch, 1855: (partum).
=*Aphis tritici* Lawson, 1866:
=*Aphis holci* Ferrari, 1872:
=*Aphis annuae* Oestlund, 1886:
Rhopalosiphum padi, Baker et Turner, 1915:
=*Aphis pseudoavenae* Patch, 1917:
=*Rhopalosiphum padi* ssp. *americanum* Mordvilko, 1921:

別 名：*禾穀麥蚜、燕麥蚜、桃粉蚜、稻麥蚜、麥蚜、麥縊管蚜。*

寄 主：第一寄主桃、碧桃、李、梅、蘋果、梨等。第二寄主玉米、高粱、水稻、麥類、粟、稗、鼠耳草等禾本科雜草、莎草科、香蒲科植物。

分 佈：臺灣、福建、江西、香港、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、西北、遼寧；韓國、日本、西伯利亞、越南、泰國、尼泊爾、巴基斯坦、歐洲、約旦、埃及、新西蘭、北美。

傳 病：傳佈非持續性植物病毒之煙草脈綠嵌紋、大豆嵌紋、黃瓜嵌紋、洋蔥黃矮、金蓮花嵌紋、和持續植物病毒之大麥黃矮、Filarce 紅葉及玉米花斑等病毒。

天 敵：Chrysopidae　草蛉科
Chrysopa palles (Rambur)　大草蛉
Mallada boninensis (Okamota)　安平草蛉
Chilocorus rubidus Hope　黑緣紅瓢蟲

Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲
Coccinella repanda Thunberg 波紋瓢蟲
Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculata Swartz 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐斑小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
四條瓢蟲
Syrphidae 食蚜蠅科
Betasyrphus serarius (Wiedmann) 黑色食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Metasyrphus corollae Fabricius 條背食蚜蠅
Paragus tibialis Fallen 刺背食蚜蠅
Syrphus vitripennis Meigen
Aphidiidae 蚜繭蜂科
Aphidius uzbekistanicus Luzhetzki
Trioxys (s. str.) *aucts* (Haliday)

831. **Rhopalosiphum rufiabdominalis** (Sasaki) 紅腹縊管蚜 (ASZI, 1986, 1:248; Chen, 1986, 4(1,2): 27-29; Hun., 1992:168; Li et al., 1995, 21(2):2-4; Tao, 1999:88; Xue, 2000(1):43; Zhang et al., 1992:153)
Toxoptera rufiabdominalis Sasaki, 1899:202.
=*Siphocoryne splendens* Theobald, 1915:
=*Yamataphis oryzae* Matsumura, 1917:
=*Aresh ashelkovikvi* Mordvilko, 1921:
=*Yamataphis papveri* Takahashi, 1921:
=*Rhopalosiphum avenae* George, 1925:
=*Pseudocerosipha pruni* Shinji, 1941:
=*Cerosipha california* Essig, 1944:
=*Cerosipha subterrana* Zimmerman, 1948:
=*Yamataphis yamana* Cheng et Zhong, 197 :
寄 主：春季爲害桃、梅等李屬植物，夏季移到麥類等禾本科及莎草科上爲害。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、香港、四川、浙江、陝西、山東、北京、新疆、遼寧；朝鮮、日本、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、中東、非洲北部、東部、南美、北美。

832. **Sappaphis dipirivora** Zhang 梨北京圓尾蚜 (Tao, 1999:89; Zhang et Zhong, 1980:55)
Sappaphis dipirivora Zhang, 1980:55.
寄 主：梨。
分 佈：山東、北京、遼寧。

833. **Sappaphis pyri** Matsumura 梨圓尾蚜 (ASZI, 1986, 1:257; Tao, 1999:89)
Sappaphis pyri Matsumura, 1918:98.
=*Anuraphis piricola* Okamoto et Takahashi, 1927:
=*Anuraphis nashi* Shinji, 1944:

寄 主：梨。
分 佈：貴州、江蘇、山東、遼寧；朝鮮、日本、西伯利亞、印度。

834. **Sappaphis pyrivora** Tao 蜀梨圓尾蚜 (Tao, 1962:98; 1999:89)
Sappaphis pyrivora Tao, 1962:98.
寄 主：梨。
分 佈：四川。

835. **Sappaphis sinipiricola** Zhang 梨中華圓尾蚜 (ASZI, 1986, 1:257; Hun., 1992:169; Tao, 1999:89; Zhang et Zhong, 1980:55; Zhang et al., 1992:153)
Sappaphis sinipiricola Zhang, 1980:55.
寄 主：梨。
分 佈：湖南、河南、山東、遼寧。

836. **Schizaphis graminum** (Rondani) 禾綠蚜 (Feng et Xian, 1987, 24(3):140-143; 1990, 17(1):35-39; Li et al., 1995, 21(2):2-4; Tao, 1990:191; 1999:89; Tian et al., 1996, 22(4):17-19; Wang et al., 1996, 12(2):91; Zhang, 1987[ed.] :63; Zhou et Zhang, 1995:38)
Aphis graminum Rondani,1847:10.
別 名：*麥二叉蚜*，*稻長管蚜*。
寄 主：蘋果、香蕉、禾本科水稻、小麥、高粱、甘蔗、蓖蓽、巴拉草、腎形草、大理草、兩耳草。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮、日本、中亞、印度、北非、東非、地中海、北美、南美。
天 敵：六條瓢蟲
七星瓢蟲
波紋瓢蟲
龜紋瓢蟲
八條瓢蟲
赤星瓢蟲
錨紋瓢蟲
褐尾小黑瓢蟲
褐斑小黑瓢蟲
黑點食蚜蠅

837. **Schizaphis piricola** (Matsumura) 梨二叉蚜 (ASZI, 1986, 1:250; Huang, 1990[ed.] 2:103-104; Sun, 1984:371; Tao, 1990:192; 1999:89; Xu et Lo, 1996(1):47-48; Yu et Xu, 1995:115; Yunn., 1987:413; Zhang et Li, 1997:29-30; Zhang ed.:63; Zhao et al., 1998(4):29)
Toxoptera piricola Matsumura, 1917:414.
=*Toxoptera punjabipyri* Das, 1928:
Schizaphis piricola,
別 名：*梨蚜*。
寄 主：梨、白梨、棠梨、杜梨、狼尾草。
分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、四川、江蘇、河南、山東、河北、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本、印度、巴基斯坦。
天 敵：草蛉、瓢蟲、食蚜蠅、蚜繭蜂。

838. **Semiaphis heraclei** (Takahashi) 芹菜粉蚜 (Chao et Chen, 1991:55-61; Tao, 1990:209, 1999:90)

Brachycolus heraclei Takahashi, 1921:60.
=*Brachycolus lonicerae* Shinji, 1939:
別 名：*胡蘿蔔微管蚜*。
寄 主：芹菜、芫荽、水芹、茴栗前胡、鴨兒芹、胡蘿蔔、白花八角、忍冬、臺灣海桐。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、浙江、河南、山東、河北、遼寧；韓國、日本、越南、印度、印尼、夏威夷。
傳 病：木瓜輪點病。

839. **Sinomegoura citricola** (van der Goot) 月橘蚜 (ASZI, 1986, 1:279; Huang, 1990[ed.] 2:217; Liu et Huang, 1989, 16(4):259-163; Shi et al., 1989-90:81; Tao, 1990:217; 1999:90; Tao et Tan, 1961:41-53; Wang, 1981:229-233; Yunn., 1987:452; Zhang et Qiao, 1997:381)
Macrosiphomella citricola van der Goot, 1917:34.
=*Tuberosiphum camphorae* Shinji, 1922.
=*Megoura jacobsoni* Mason, 1927.
=*Megoura citricola* Takahashi, 1929.
Sinomegoura citricola,
別 名：*樟修尾蚜*。
寄 主：楊桃、月橘、柑橘屬、芭蕉屬、山茶、刺杜密、樟樹、豬腳楠、香楠、白肉榕、羊蹄甲、梔子花、冬青、月桂、棕櫚等多植物。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、浙江、江蘇；日本、菲律賓、新加坡、印尼、泰國、印度、尼泊爾、埃及、澳洲。
傳 病：木瓜輪點病。
天 敵：*Chrysopa pallens* (Rambus) 大草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephens) 中華草蛉
Mallada boninensis (Okamoto) 安平草蛉(亞非草蛉)
Leix axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Lemnis swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnus biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Nephus ryuguus (Kamiya) 圓斑彎葉毛瓢蟲
Platynaspis lewisii Crotch 艷色廣肩瓢蟲
Propylaea japonica (Thunberg) 龜紋瓢蟲
Scymnus hoffmanni Weise 黑襟毛瓢蟲
Scymnus kawamurai Ohta 黑背小瓢蟲
Scymnus sodalis (Weise) 臺灣小瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Aphidoletes aphidmyza (Rond.) 食蚜癭蚊
Betasyrphus serarius (Weidmann) 黑色食蚜蠅
Episyrphus balteatus (De Geer) 黑點食蚜蠅
Metasyrphus corollae Fabricius 條背食蚜蠅
Sphaerophoria ruppelii Wied. 半黃球尾食蚜蠅
Ephedrus plagiator (Nees) 蚜繭蜂
Trioxys (*Binodoxys*) *struma* Gahan

840. **Sinomegoura elaeocarpi** (Tao) 錫蘭橄欖蚜 (Tao, 1990:218, 1999:91)
Acyrthosiphon elaeocarpi Tao, 1963:10.
Sinomegoura elaeocarpi, Hille Ris Lambers, 1976:

寄 主：錫蘭橄欖。
分 佈：臺灣。

841. Sitobion phyllanthi (Takahashi) 油柑長網管蚜 (Tao, 1990:288, 1999:91)

Macrosiphum phyllanthi Takahashi, 1938:11.
=*Macrosiphum (Sitobion) takahashii* Eastop, 1959:
=*Sitobion adgnatum* Muller, 1959:
Sitobion phyllanthi, King et Tao, 1989:
寄 主：油柑(大戟科)。
分 佈：臺灣、廣東；泰國、印度。

842. Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe) 小橘蚜 (ASZI, 1986, 1:255; Bei et Jiang, 1999(3):19; Chao, 1982:90; Chao et Chen, 1991:55-61; Chen, 1993(1):36; Chen, 1996(1):45; Chen et Chen, 1994:43-44; Chiu et al., 1985:1-8; Fu, 1995(3):42; Huang, 1990[ed.]:2:217-219; Huang et Gao, 1996:164; Hun., 1992:170; Li et Li, 2000(2):12; Lin, 1993(4):41; Liu et Huang, 1989, 16(4):259-263; Lun, 1991:84; Luo et Jin, 1997:71, 74; Luo et Li, 1998:42; NZWDI, 1981:1888; Tao, 1900:163, 1999:92; Tao et Tan, 1961:41-53; Tao, 1990:163; Ting, 1999(3):19; Tseng, 1994:537; Yu et al., 1993(2):35; Yunn., 1987:404; Zhang, 1985[ed.]:171-174; Zhang, 1987[ed.]:53; Zhang et Li, 1997(4):22-23, 47; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1992:154; Zhang et al., 2000(2):13; Zhou, 1993(2):46)

Aphis aurantii Boyer de Fonscolombe, 1841:178.
=*Toxoptera coffeae* ssp. *thomensis* Seabra, 1841.
=*Aphis camelliae* Kaltenbach, 1843:
Toxoptera auranti, Koch, 1856:
=*Aphis coffeae* Nietner, 1861.
=*Myzus (Ceylonia) theaecola* Buckton, 1891.
=*Toxoptera theobrome* Schouten, 1906.
=*Toxoptera alaterni* Del Guercio, 1909.
=*Toxoptera variegata* Del Guercio, 1909:
=*Toxoptera clematidis* Del Guercio, 1910.
=*Toxoptera citrifoliae* Maki, 1913.
=*Aphis papaveris* var. *busi* Del Guercio, 1919:
=*Toxoptera schlingeri* Tao, 1961:
=*Toxoptera hsui* Hsu, 1980:
別 名：*橘二叉蚜*、*橘二岔蚜*、*茶蚜*、*茶二岔蚜*、*茶二叉蚜*。
寄 主：柑橘類、月橘、荔枝、橄果、錫蘭橄欖、人心果、咖啡、可可、香蕉、無花果、菠蘿蜜、蒲荔、銀杏、白桑、小葉桑、腰果、茶、山茶、尾葉山茶、大頭茶、姜、八角樹、苦楝、柳、榕、樟等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東；朝鮮、日本、泰國、尼泊爾、亞洲(熱帶地區、北非、中非、歐洲(南部)、大洋洲、澳洲、拉丁美洲、北美洲等熱帶和亞熱地區，全世界。
傳 病：木瓜輪點病。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson　細德褐蛉
Chrysopa pallens (Rambur)　大草蛉
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant　七星瓢蟲
Coccinella octopunctata Fabricius　八條瓢蟲
Coelophora chinensis Weise　六星瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch　赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz　錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius　六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg　龜紋瓢蟲
Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki　二星小黑瓢蟲

Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Betasyrphus serarius (Wiedmann) 黑色食蚜蠅
Diaeopsis aegrota Fabricius 斑翅食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Leucopis punctipennis Meigen 白背斑腹蠅
Lipolexis scutellaris Mackauer 蚜繭蜂
Lipolexis gracilis Förster 繡蚜繭蜂
Lysiphlebia japonica (Ashmead) 棉蚜繭蜂
Ephedrus (s. str.) *plagiator* (Nees)
Trioxys sinensis Mackauer 蚜刺繭蜂
Trioxys (*Binodoxys*) *struma* Gahan
Trioxys (*Binodoxys*) *toxopterae* Takada
Aphilinus mali (Haldeman) 蘋果綿蚜矮小蜂(日光蜂)

843. **Toxoptera citricidus** (Kirkaldy) 大橘蚜 (ASZI, 1986, 1:255; Bei et Jiang, 1999(30:19; Cao, 1994(2):35; Chao, 1982:85; Chen, 1993(1):36; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chen et Chen, 1994:43-44; Chen et al., 1996(4):15-17; Chiu et al., 1985:1-8; Fu, 1995(3):42; Huang, 1990[ed.] 2:216-219; Huang et Gao, 1996:164; Hun., 1992:171; Li et Li, 2000(2):12; Lin, 1993(4):41; Liu et Hung, 1989, 16(4):259-263; NZWDI, 1981:1886; Tao, 1960:154-157; 1994:164; 1999:93; Tao et Tan, 1961:41-53; Ting, 1999(30:19; Tseng, 1994:538; Wang et al., 1994(2):36-38; Wang et al., 1997, 14(1):33; Yu et al., 1993(2):35; Yu et Xu, 1995:115; Yunn., 1987:404; Zhang, 1987[ed.]:59, 63; Zhang et Li, 1997(4):22-23, 47; Zhang et al., 1992:154; Zhang et al., 1993(3):29-31; Zhang et al., 1995(4):39; Zhang et al., 2000(2):13; Zhou, 1993(2):46)
Myzus citricidus Kirkaldy, 1907:100.
=*Aphis tavaresi* del Guercio, 1908:
=*Aphis nigrivans* van der Goot, 1917:
=*Toxoptera aphoides* van der Goot, 1917:
=*Aphis aeglis* Shinji, 1922:
Toxoptera citricidus, Takahashi, 1937:
=*Paratoxoptera argentinensis* Blanchard, 1944:
別 名：*橘蚜*，*棕橘蚜*，*東方橘蚜*。
寄 主：柑橘、枸橘、柚、枳、枳殼、、枇杷、桃、柿、茶、花椒、柘、檫、黃楊、栲、變葉黎豆、莫芝。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、雲南、四川、浙江、江蘇、山東；南韓、越南、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼、日本、夏威夷，南美洲、非洲、及其他溫帶、熱帶地區均有分布。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben- Peterson 紹德褐蛉
Chrysopa pallens (Rambur) 大草蛉
Mallada bonienensis (Okamoto) 安平草蛉
(大草蛉、安平草蛉及褐姬蛉等幼蟲捕食後會中毒死亡)。
Chilomenes quadriplagiata Swartz 四斑月瓢蟲
Chilomenes sexmaculata (Fabricius) 六斑月瓢蟲
Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲
Coelophora biplagiata (Swartz) 雙帶盤瓢蟲
Coelophora chinensis Weise 六星瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Platynaspidius maculosus Weise 五星黃色瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲

Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki 二星瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni* Weise 褐斑小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) *frontalis quadripustulatus* Herbst 四星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾小黑瓢蟲
Stethorus loi Sasaji 小黑瓢蟲
但六條、七星、八條、波紋、小十三星瓢蟲等種幼蟲捕食後，往往未待化蛹中途即中毒死亡。
Betasyrphus serarius (Wiedmann) 黑色食蚜蠅
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Epistrophe horishana (Matsumura) 高山食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Odontomgia sp.
Paragus serratus Fabricius 短刺食蚜蠅
Paragus tibialis Fallen 刺背食蚜蠅
Sphaerophoris javana Wiedmann 爪哇食蚜蠅
Syrphus aegrotus Fabricius 斑翅食蚜蠅
Xanthogramma citrifasciatum De Geer 黑紋食蚜蠅
Leucopis puncticornis Meigen 白背斑腹蠅
Entomophthora aphidis 蚜蟲生菌
Lipolexis gracilis Förster 纖蚜繭蜂
Lipolexis scutellaris Mackauer
Aphelinus sp. 矮小蜂

844. **Toxoptera odinae** (van der Goot) 烏桕蚜 (ASZI, 1986, 1:256; Chao, 1982:85; Hun., 1992:171; Luo, 1991:94; Tao, 1990:165; 1999:93; Tao et Tan, 1961:41-53; Yu et Xu, 1995:115; Yunn., 1987:404; Zhang, 1987[ed.]:60; Zhang et Qiao, 1997:382; Zhang et al., 1992:154)
Longiunguis odinae van der Goot, 1917:133.
=*Longiunguis spathoeae* van de Goot, 1917:
=*Arimakia araliae* Matsumura, 1917:
=*Arimakia caranbonis* Matsumura, 1917:
=*Arimakia taranbonis* Matsumura, 1917:
=*Aphis somei* Essig et Kuwana, 1918:
=*Aphis ficicola* Takahashi, 1922:
=*Aphis mokulen* Shinji, 1922:
=*Aphis rutae* Shinji, 1922:
=*Longiunguis hameliae* Theobald, 1929:
=*Somaphis sanho* Shinji, 1932:
=*Aphis odivae* Shiraki, 1952:
Toxoptera odinae, Eastop, 1958:
別 名：*橡果聚蚜*、*橡果蚜*。
寄 主：橡果、柑橘、月橘、梨、楸樹、栗、腰果、黃連木、山漆、烏桕、山桕、三葉五加、江某(鵝掌柴)、珊瑚樹、柏樹、重陽木、密花葉底珠、恒春福木、雀榕、大葉桉、海桐、臺灣海桐、豎膚木、漆樹、大葉桉、梧桐、海桐、重陽木、臺灣何首烏、楓、欒、櫻花、蝴蝶樹、雪球、玉葉金花、水錦樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、北京、遼寧；朝鮮、日本、琉球、越南、泰國、馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson 紹德褐蛉
Coccinella septempunctata bruckii Mulsant 七星瓢蟲

Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Pseudaspidimerus japonica Nakane et Aroki 二星小黑瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾瓢蟲
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Lipolexis scutellaris Mackauer 蚜繭蜂
Lipolexia gracilis Förster 繡蚜瘤蜂
Aphidius sp. 烏柏蚜瘤蜂

845. **Toxoptera piricola** Matsumura 梨二叉蚜 (Chao, 1982:90; Chen et Wang, 1987:119-120; NZWDI, 1981:1736; Qu, 1993(4):61; Wang, 1996(3):40; Wang et al., 2000(2):22; Zhang, 1997(5):41-42)

別 名：*梨蚜*、*梨卷葉蚜*。
寄 主：梨(新梢葉片)。
分 佈：臺灣、福建、西南、中南、華東、陝西、華北、山西、西北、東北。

846. **Toxoptera schlingeri** Tao 許氏蚜 (Tao, 1990:167)

Toxoptera schlingeri Tao, 1961:258.
=*Toxoptera hsui* Hsu, 1980.
寄 主：薜荔、榕樹、白肉榕、雀榕、金氏榕、印度橡膠樹、石朴、朴樹、藍桉、厚皮香。
分 佈：臺灣、香港。
天 敵：*Eumicromus sauteri* Esben-Peterson 紹德褐蛉
Mallada boninensis Okamoto 安平草蛉
Coccinella octopunctata Fabricius 八條瓢蟲
Coelophora chinensis Weise 中國六星瓢蟲
Lemnia biplagiata Swartz 錨紋瓢蟲
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Menochilus sexmaculatus Fabricius 六條瓢蟲
Propylaea japonica Thunberg 龜紋瓢蟲
Scymnus (*Pullus*) sp. 褐尾瓢蟲
Stethorus loi Sasaji 小黑瓢蟲
Epistrophe balteatus De Geer 黑點食蚜蠅
Ischiodon scutellaris Fabricius 刺腿食蚜蠅
Syrphus serarius Wiedmann 黑色食蚜蠅

847. **Tuberocephalus higansakurae** (Monzen) 櫻桃瘤縮頭蚜 (ASZI, 1986, 1:269; Tao, 1999:94; Zhang et al., 1992:294)

Myzus higansakurae Monzen, 1927:2.
Tuberocephalus higansakurae, Miyazaki,1971:
寄 主：櫻桃。
分 佈：浙江、河南、山東、河北、北京；日本。
天 敵：*Ephedrus persicae* Froggatt 桃瘤蚜瘤蜂

848. **Tuberocephalus jinxiensis** Zhang 歐李瘤頭蚜 (Tao, 1999:94; Zhang et al., 1992:297)
Tuberocephalus jinxiensis Zhang, 1976:75.
寄 主：歐李 (*Prunus humilis*)。
分 佈：遼寧。

849. **Tuberocephalus liaoningensis** Zhang 櫻桃捲葉蚜 (ASZI, 1986, 1:269; Tao, 1999:95)
Tuberocephalus liaoningensis Zhang, 1976:75.
寄 主：櫻桃。
分 佈：北京、遼寧、吉林。

850. **Tuberocephalus momonis** (Matsumura) 桃瘤頭蚜 (ASZI, 1986, 1:270; Li, 1996(3):36; NZWDI, 1981: 159; Tao, 1990:259; Tao, 1999:95; Yunn., 1987:454; Zhang et Li, 1997:29-30; Zhang et al., 1992:295; Zhao et al., 1997:189)
Myzus mononis Matsumura, 1917:402.
=*Trichosiphoniella formosana* Hille Ris Lambers, 1965.
Tuberocephalus momonis, Eastop et Hille Ris Lambers, 1976:
別 名：*桃錐尾蚜*、*桃瘤蚜*。
寄 主：桃、櫻桃、梅、梨、山桃(在捲葉內)。
分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、四川、浙江、江蘇、甘肅、河南、山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本。
天 敵：*Ephedrus persicae* Froggatt 桃瘤蚜繭蜂

851. **Tuberocephalus sakurae** (Matsumura) 櫻桃瘤頭蚜 (ASZI, 1986, 1:270; Tao, 1990:259; 1999:95; Yunn., 1987:454)
Myzus sakurae Matsumura, 1917:403.
=*Myzus rarus* Matsumura, 1927:
=*Aphis spinosula* Essig et Kuwana, 1918:
Tuberocephalus sakurae, Miyazaki, 1971:
別 名：*櫻錐尾蚜*。
寄 主：梅，櫻、在紅色捲葉蟲瘿內，國外記載爲害黑櫻桃。
分 佈：臺灣、四川(西康)、浙江、江蘇、山東、遼寧；朝鮮、日本。

852. **Tuberocephalus tianmushanensis** Zhang 天目山瘤頭蚜 (ASZI, 1986, 1:271; Tao, 1999:95; Zhang et al., 1992:293)
Tuberocephalus tianmushanensis Zhang, 1980:58.
寄 主：野櫻桃。
分 佈：浙江。

853. **Uroleucon (Uromelan) solidaginis** (Fabricius) 黃腥黑尾蚜 (Chao et Chen, 1991:55-61; Tao, 1990:296, 1999:96)
Aphis solidaginis Fabricius, 1779:20.
=*Macrosiphum rudbeckiae* Essig et Kuwana, 1918:
寄 主：廣泛。
分 佈：臺灣、福建、山東；印度。
傳 病：木瓜輪點病。

854. 沙棘蚜 (Liu, 1999(2):33)
寄 主：沙棘。
分 佈：吉林。

Coccoidea 蚧蟲總科

(Tao, 1999:1-176)

Monophlebidae 碩蚧科 (Margarodidae)

855. **Crypticerya jakobsoni** (Green) (Tao, 1999:2)
Icerya jakobsoni Green, 1912:316.
Icerya jakobsoni, Sasscer, 1915:
寄 主：柑橘，*Dombeya acutangula*.
分 佈：廣東、香港、海南；爪哇。

956. **Drosicha contrahens** Walker 桑虱 (Chao, 1982:91; NZWDI, 1981:1087; Suzhou CS., 1985:132-233; Tao, 1999:2; Wang et Zhang, 1992:162; Zheng, 1982:231-233; Zhou, 1993(2):46)
Drosicha contrahens Walker, 1858:306.
別 名：*桑碩蚧*，*桑硬蚧*，*桑芽蚧*，*草履碩蚧*。
寄 主：梨、蘋果、紅葉李、桃、柑橘、葡萄、無花果、柿、板栗、桑、胡頹子、茶、山茶、油茶、楓、樟、櫸、烏桕、櫟、白楊、楓楊、榔榆、白榆、女貞、楝、楊、柳、洋槐、豐豆。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林；日本、蘇聯、斯里蘭卡。
天 敵：*Coelophora swinhoei* Grotch 瓢蟲
Harmonia axyridis Pallas 異色瓢蟲
Rodolia limbata Motschulsky 紅環瓢蟲
紅緣瓢蟲

857. **Drosicha corpulenta** (Kuwana) 草履碩蚧 (ASZI, 1986, 1:356; Beijing FC., 1980[ed.]:201; Chao, 1982:91; Chen et Wang, 1987:131-132; Han et al., 1994:25, 24; Huang, 1990[ed.] 2:331-332; Huang et Gao, 1996:146; Hun., 1992:176; Liu, 1982[ed.]:369-371; NZWDI, 1981:1794; Tang et al. 1989:8; Tao, 1999:2; Tian et al., 1996(1):47; Wang, 1987[ed.]:191-193; Wang et Zhang, 1996:79; Xiao, :235; Yin, 1993(4):33; Yunn., 1987:460; Zhang, 1987[ed.] 1:65; Zhang et Liang, 1996:27-28; Zhao, 1997(1):22; Zhao et al., 1997:190; Zhao et al., 1998(4):29; Zhou, 1993(2):46)
Monophlebus corpulenta Kuwana, 1902:46.
別 名：*草履蚧*。
寄 主：蘋果、梨、李、桃、杏、榛、櫻桃、柑橘、荔枝、板栗、核桃、棗、柿、胡頹子、無花果、桑、咖啡、馬尾松、茶、油茶、月季、泡桐、櫟、楊、柳、懸鈴木、楝、刺槐、黃檀。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏、四川、江西、安徽、江蘇、陝西、山西、河南、山東、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯。
天 敵：*Rodolia limbata* Motschulsky 紅環瓢蟲
Rodolia rufopilosa Mulsant 大紅瓢蟲
蠅(寄生)

858. **Drosicha maskelli** (Cockerell) (Tao, 1999:2)
Monophlebus maskelli Cockerell, 1902:717.
寄 主：松、正榕。
分 佈：臺灣、廣東、河北；日本、爪哇。

859. **Icerya aegyptica** (Douglas) 埃及吹棉蚧 (Chang et al., 1982:99; Chao, 1982:91; Tao, 1999:3; Zhou, 1993(2):46)
Crossotosoma aegypticum Douglas, 1890:79.
Icerya aegyptica, Riley et Howard, 1890:
寄 主：柑橘、荔枝、檬果、石榴、桑、茶、大頭茶、巴豆、樟、榕。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港；日本、斯里蘭卡、熱帶亞洲、埃及、非洲、澳洲。

860. **Icerya purchasi** Maskell 吹綿蚧 (ASZI, 1986, 1:354; Beijing FC., 1980[ed.]:197-199; Chao, 1982:91; Chen, 1996(4):29; Chen et Wang, 1987:233-234; Chiu et al., 1985:1-8; Huang, 1990[ed.] 2:200-202; Huang et Gao, 1996:144; Hun., 1992:176; Lin, 1986[ed.]:317-319; Liu, 1982[ed.]:253-254; Liu et al., 1994, 11(2):85; Lo et Tao, 1966:52-53; Ma et al., 1995:119; NZWDI, 1981:1889; Tang et al., 1989:9; Tao, 1999:3; Wang et Zhang, 1992:162; 1992:407; Wang et al., 2000(1):30-32; Wu, 1994:566; Xiao, 1992:236; Yunn.1987:461; Zhang, 1987[ed.] 1:65; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1995(4):59; Zhang et al., 2000(2):14; Zhou, 1993(20:46)

Icerya purchasi Maskell, 1878:221.

別 名：*綿蚧*，*綿團蚧*，*棉子蚧*，*吐綿蚧*。

[Cotton-cushion scale]

寄 主：葡萄、柑橘、檸檬、柚、橙、櫻果、木瓜、人心果、無花果、梨、蘋果、海棠、梅、李、桃、櫻桃、枇杷、柿、石榴、楊梅、栗、桑、黑松、馬尾松、咖啡、茶、山茶、大豆、玉米、高粱、花生、茄子、紅薯、瓜類、胡蘿蔔、棉、姜、菊花、鳳仙花、向日葵、山楸、牛膝、紫花地丁、常春藤、冬青、海金沙、玫瑰、紫蘇、胡枝子、芙蓉、柳、樟樹、鳳榴、木麻黃、相思樹、桉樹、衛矛、櫧、刺槐、尋麻、車前草、黃連木、桃金孃、檉柳、薔薇、玫瑰、曼陀羅、桂花、紫雲英、牛夏等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、新加坡、印尼、印度、斯里蘭卡、小亞細亞、葡萄牙、西班牙、英國、瑞士、意大利、法國、蘇聯、美國、墨西哥、千里達、斐濟、澳洲、新西蘭、南非。

天 敵：草蛉二種(浙江黃岩)

Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲(二星瓢蟲,赤星瓢蟲)

Harmonia obscurosignata (Liu) 隱斑瓢蟲

Rodolia cardinalis Mulsant 澳洲瓢蟲

Rodolia limbatus Motschulsky 紅環瓢蟲

Rodolia pumila Weise 小紅瓢蟲

Rodolia rufopilosa Mulsant 大紅瓢蟲

Rodolia sp. 黑腹紅瓢蟲

Cladosporium sp. 寄生菌

Ophelosia crawfordi Riley 克勞釉小蜂

Cryptochetidae 蚜蚧小蠅科

Cryptochetum iceryae Williston 綿蚧小蠅

861. **Icerya seychellarum** Westwood 銀毛吹綿蚧 (ASZI, 1986, 1:354; Chang et al., 1982:99; Chao, 1982:91; Huang et Gao, 1996:146; Hun.,1992:176; Luo et Jin, 1995:85; 1997:74; Wu, 1994:566; Yunn., 1987:461; Zhang, 1987[ed.] 1:66; Zhou, 1993(2):46)

Dorthesia seychellarum Westwood, 1855:830.

=*Orthesia seychellum* Maskell, 1869.

Icerya seychellarum, Maskell, 1897.

[Seychelles scale]

寄 主：柑橘、橙、檸檬、枇杷檸果、柿、石榴、桃、番石榴、蓮霧、酪梨、波羅蜜、檳榔、桑、茶、山茶、雞骨香、玫瑰、巴豆、木防己、朴草、甘蔗、烏桕、銀樺、翅子樹、棕、蘇鐵、椿、竹柏、楓。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、

湖北、安徽、山東、陝西、河南、湖北、河北；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、新西蘭、熱帶、亞熱帶。

天 敵：*Rodolia rufopilosa* Mulsant 大紅瓢蟲
Rodolia sp. 黑腹紅瓢蟲
Rodolia sp. 紅瓢蟲
黑小蠅

862. **Kuwania bipora** Borchsenius (Tao, 1999:4)
Kuwania bipora Borchsenius, 1960:915.
寄 主：柑橘、蘋果、梅屬、櫟果、柿、*Quercus*, *Camellia sinensis*, *Pterocarpus stenptera*, *Castenea*, *Betula*, *Punica granatum*, *Sinomenium acutum*.
分 佈：雲南；日本、菲律賓、印度。

863. **Kuwananiella zizyphi** Tang 棗硕蚧 (Tang, 1984:123)
Kuwananiella zizyphi Tang, 1984:123.
寄 主：棗。
分 佈：山西。

864. **Matsucoccus dahuriensis** Hu et Hu 樟子松顎蚧 (Tao, 1999:4 ; Xiao, 1992:238)
Matsucoccu dahuriensis Hu et Hu, 1981:178-179.
寄 主：樟子松。
分 佈：黑龍江。
天 敵：蟎
Inocellidae 盲蛇蛉科
Inoceuia crassicornis Schummel 盲蛇蛉
Cecidomyiidae 癭蚊科

865. **Matsucoccus koraiensis** Young & Hu 海松幹蚧 (Beijing FC., 1980[ed.]:188; Tao, 1999:5; Xiao, 1992:239; Young, 1981:181)
寄 主：紅松(海松)。
分 佈：吉林(長白山區紅松原始林)、黑龍江(小興安嶺、張廣才嶺)；蘇聯(濱海省)。
天 敵：蟎
Chrysopa intima McLachlan 多斑草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephens) 中華草蛉
Anthocoridiae 花蝽科
Coccinellidae 瓢蟲科
Formicidae 蟻科

866. **Matsucoccus liaoningensis** Tang 遼寧松幹蚧 (Beijing FC., 1980[ed.]:188, Tang, 1978:166; Young, 1979:111)
Matsucoccus liaoningensis Tang, 1978:166.
寄 主：油松(*Pinus tubulaeformis* Carr.)。
分 佈：遼寧。

867. **Matsucoccus massonianae** Youn & Hu 馬尾松幹蚧 (Beijing FC., 1980[ed.]:188; Tao, 1999:5; Xiao, 1992:241; Youn, 1980:181)
Matsucoccus massonianae Young et Hu, 1976:199-204.
寄 主：馬尾松、黑松、黃山松。

分 佈：浙江、安徽、江蘇。
天 敵：Hemerobiidae　褐蛉科
Sympherobius weisong Yang　衛松益蛉
Chrysopa kulingensis Navás　牯嶺草蛉
Lestodiplosis sp.　松蚧瘿蚊

868. **Matsucoccus matsumurae** (Kuwana) 日本松幹蚧 (Beijing FC., 1980[ed.]:188-194; Cheng et Ming, 1979:149-155; Gao, 1987: 271-276; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:213-216; Liu, 1982[ed.]:248-252; Tao, 1999:5; Wu, 1994:569; Xiao, 1992:244; Young, 1980:181; Zhang, 1987[ed.] 1:66)
Xylococcus matsumurae Kuwana, 1905:209-212.
=*Matsucoccus insignis* Borchsenius, 1955:
=*Matsucoccus liaoningensis* Tang, 1978:
別 名：*松幹蚧*，*松幹蚧殼蟲*。
[Matusmura pine scale]
寄 主：馬尾松、黃山松、臺灣松、黑松、千頭赤松、垂枝赤松、油松、琉球松、(在山東爲害赤松、油松、黑松；南方爲害馬尾松)。
分 佈：江西、浙江、江蘇、上海、安徽、山東(1950 年在勞山最早發現)、遼寧；朝鮮、日本、美國。
附 註：被害樹由于皮層組織被破壞，樹勢衰弱，針葉枯黃，芽梢枯萎；以後樹皮增厚、硬化、捲曲龜裂。幼樹嚴重被害後，易發生軟化垂枝和樹幹彎曲，並常引起次生病蟲害發生，如松幹枯病、縱坑切梢小蠹、橫坑切梢小蠹、象鼻蟲、松天牛、吉丁蟲及白蟻等。此松幹蚧爲國內外檢疫對象。
天 敵：*Anystis* sp.　大赤螨
美麗羽蛛
Inocelia crassicornis Schummel　盲蛇蛉
Hemerobius humuli Linnaeus　全北褐蛉
Hemerobius lacunaris Navás　平湖褐蛉
Sympherobius matsucoccicphagus Yang　松蚧褐蛉
Sympherobius weisong Yang　衛松益蛉
Chrysopa formosa Brener　麗草蛉
Chrysopa intima McLachlan　多斑草蛉
Chrysopa kulingensis Navás　牯嶺草蛉
Chrysopa pallens (Rambur)　大草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephpen)　普通草蛉
Dufouriella ater (Dufour)　黑叉胸花蜻
Elatophilus nipponensis Hiura.　松幹蚧花蝽
Flatophilus nipponensis Hiura　花蜻
Ballia odscurosignata Liu　隱斑瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri　紅點唇瓢蟲
Coelophora saucia Muls.　黃斑盤瓢蟲
Exochomus mongol Barousky　蒙古光瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas)　異色瓢蟲
Harmonia obscurosignata (Liu)　隱斑瓢蟲
Leis axyridis Pallas　異色瓢蟲
Lemnia (s. str.) *saicia* (Mulsant)　黃斑盤瓢蟲
Propylaea japonica (Thunberg)　龜紋瓢蟲

Rodolia limbata Motschulsky 紅環瓢蟲
Sticholotis sp. 小艷瓢蟲
Formica rufibarbis Emery 棕褐沙林蟻
Lestodiplosis sp. 松針癭蚊
Oligotrophus sp. 捕食癭蚊

869. **Matsucoccus shinnongjiaensis** Young et Lu 神農架松幹蚧 (Tao, 1999:5; Xiao, 1992:248; Young et al., 1986: 195)
Matsucoccus shinnongjiaensis Young et Lu, 1986:195.
寄 主：華山松(單食性)。
分 佈：湖北(神農架)。
天 敵：蜘蛛多種
Harmonia oxyridis Pallas 異色瓢蟲
癭蚊(卵)
Aphaenogster spp. 盤腹蟻
Formica spp. 蟻
Paratrechina spp. 立毛蟻
Prenolepis spp. 前鱗蟻

870. **Matsucoccus sinensis** Chen 中華松梢蚧 (Chen., 1992:177; Tao, 1999:5; Wang et Zhang, 1992:162; Young et al., 1980:45)
Matsucoccus sinensis Chen, 1937:382.
別 名：*松針蚧*，*中華松針蚧*。
寄 主：馬尾松、油松、黑松。
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏、浙江、上海、江蘇、安徽、陝西。
天 敵：Hemerobiidae 褐蛉科
Sympherobius weisong Yang 衛松益蛉
Chrysopa kulingensis Navás 牯嶺草蛉

871. **Matsucoccus yunnanensis** Ferris 雲南松幹蚧 (Dejong FC., 1980[ed.]:188; Tao, 1999:5; Young, 1981:181)
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。
天 敵：彎葉毛瓢蟲
Cecidomyiidae 癭蚊科
Lestodiplosis sp. 松針癭蚊
黑松針虱斑腹蠅
真菌
寄生蜂

872. **Matsucoccus yunnansonsaus** (Young et Hu) 雲南松梢蚧 (Tao, 1999:5; Young, 1981:181; Young et Hu, 1980:46;
Sonsaucoccus yunansonsaus Young et Hu, 1980, 1:186.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

873. **Neomargarodes nigra** (Green) 黑碩蚧 (Tao, 1999:6)

Margarodes nigra Green, 1912:75.
寄 主：梅屬。
分 佈：雲南；印度。

874. **Sishania nigropilata** Ferris 黑梅碩蚧 (Ferris, 1950)
Sishania nigropilata Ferris, 1950:13.
寄 主：梅屬。
分 佈：雲南。

875. **Sonsaucoccus sinensis** (Chen) 中華松棉蚧 (Xiao, 1992:253)
寄 主：馬尾松、油松、黑松。
分 佈：福建、湖南、四川、貴州、浙江、江蘇、陝西。

876. **Sonsaucoccus yunnanensis** (Ferris) 雲南碩蚧 (Ferris, 1950:12)
Matsucoccus yunnanensis Ferris, 1950:12.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

877. **Steingelia gorodetskia** Nassanow 紅松碩蚧 (Tao, 1999:6)
Steingellia gorodetskia Nassanow, 1908:345.
寄 主：紅松。
分 佈：雲南、黑龍江。

Ortheziidae 旌蚧科

878. **Orthezia insignis** Douglas 明旌蚧 (ASZI, 1986, 1:343; Tao, 1999:7; Wu, 1994:569)
Orthezia insignis Douglas, 1887:169.
[Greenhouse orthezia]
寄 主：柑橘、龍眼、馬鬱、紫葳、老鴉企(*Acanthus*)、錦葵、菊、牛膝、藿香薊(*Ageratum*)、酒餅勒(*Atalantia*)、梓、赬桐、蝶豆、十字爵床樹、千屈菜、薔薇。
分 佈：江西、湖南、華南、西南、華北；亞洲 (東部)、非洲、歐洲、美洲。

Pseudococcidae 粉蚧科 (Dactylopiidae)

879. **Atrococcus pacificus** (Borkhsenius) (Tao, 1999:9)
Pseudococcus pacificus Borkhsenius, 1949:119.
Atrococcus pacificus, Tang, 1992:
寄 主：蘋果。
分 佈：寧夏。

880. **Coccura suwakoensis** (Kuwana et Toyoda) 蘋果盤粉蚧 (ASZI 1986, 1:317; Tang et al. 1988:59; Tao, 1999:12)
Phenacoccus suwakoensis Kuwana et Toyoda, 1915:443.
=*Hemisphaococcus ussuri* Borkhsenius, 1934:
=*Phenacoccus usuuriensis* Borkhsenius, 1936:
Coccura suwakoensis, Kuwai, 1980:
別 名：*黑龍江粒粉蚧*。
寄 主：雜食性，梅、沙果(*Malus asiatica*)、*Fraxinus manshuria*，通常多在丁香屬

和薔薇科植物上。在北方爲果樹上較重要害蟲之一。

分 佈：雲南、河南、山東、山西、河北、內蒙古(通遼市)、遼寧、吉林、黑龍江。

881. **Crisicoccus moricola** Tang 桑樹楹粉蚧 (Tang 1992:354; Tang et al.1988:39; Tao, 1999:12)

Crisicoccus moricola Tang 1988:39.

寄 主：桑樹。

分 佈：內蒙古 (包頭市)。

882. **Crisicoccus pini** (Kuwana) 松粉蚧 (Hun., 1992:177; Tao, 1999:12; Wang et Zhang, 1992:161; Zhang, 1987[ed.] 1:66)

Dactylopius pini Kuwana, 1902:54.

Crisicoccus pini, Ferris, 1950:

別 名：*松白粉蚧*。

寄 主：松屬、油松、落葉松屬、冷杉屬、細杉屬。

分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、寧夏、河南、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、北美。

883. **Dysmicoccus brevipes** (Cockerell) 鳳梨潔粉蚧 (ASZI, 1986, 1:318; Chao, 1982:92; Huang, 1990[ed.] 2:384-385; Huang et Chen, 1959:86-89; 1960:122-123; 1961:194196; 1962:190-192, 1963:443-445; Huang et Chen, 1968:41-58; 1968:82; 1969:123-132; Huang et al., 1967:47-58; Hun., 1992:178; Lee, 1953:79-89; 1956(4):11; 1959:84-85; 1962:13-18; 1964:114-119; 1966:211-219; 1968;59-62; 1971:76-83; 1974:307-310; Lee et Chien, 1958:121-122; 1964:205-209; 1967:59-66; Lu et Lai, 1998, 21(2):35; 1999(3):33; Luo et Lu, 1998:95; NZWDI, 1981:1963; Sun, 1957(3-4):14; Sun, 1957:31-42; Sun et al., 1958:121; Sun et al.,1963:295; Tao, 1999:13; Tsai, 1995:40-41; Tang 1992: 196; Wu, 1994:585; Yunn., 1987:482; Zhang, 1987[ed.] 1:66)

=*Pseudococcus bromeliae* Bouché 1834:20.

Dactylopius brevipes Cockerell 1893:267.

=*Pseudococcus ananassae* Kuwana 1909:162.

=*Pseudococcus palanensis* Kanda 1933:135.

=*Pseudococcus cannae* Green 1934:162.

=*Pseudococcus longrostralis* James 1936:207.

=*Pseudococcus pseudobrevipes* Mamet 1941:58.

別 名：*鳳梨粉蚧*、*菠蘿粉蚧*、*香蕉粉介殼蟲*。

[Pineapple mealybug, Banana mealybug]

寄 主：鳳梨、柑橘、橙、柚、芭蕉、香蕉、桑、咖啡、茶、棉花、木槿(*Hibiscus* sp.)、莎草、(*Cyperus* sp.)、棕竹(*Rhapis* sp.)、水稻、甘蔗等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、貴州、青海、浙江、江蘇、湖北、河北；亞洲(東南部)、歐洲、非洲(南部)、大洋洲、美洲等熱帶、亞熱帶及溫帶廣泛分佈。

884. **Dysmicoccus cocotis** (Maskell) 椰子粉蚧 (Tao, 1999:13)

Dactylopius cocotis Maskell 1890, 22:149.

=*Pseudococcus saipanensis* Shiraiwa, 1933:

=*Dysmicoccus saipapeensis* Beardsley, 1966:

寄 主：可可椰子。

分 佈：廣東；馬利亞納群島(塞班)、加羅林群島、斐濟。

885. **Dysmicoccus wistariae** (Green) (Tang 1992:207; Tao, 1999:13)

Pseudococcus wistariae Green, 1923:218.

=*Pseudococcus matsudoensis* Kanda, 1935:85.

=*Pseudococcus piricola* Shiraiwa, 1935:

=*Pseudococcus cuspidatae* Rau, 1937:195.

寄 主：蘋果、山楂、花楸(*Sorbus commiata*)、櫻(*Cerasus sachalinesis* 和 *C.*

maximowiczii)、槭(*Acer pictum*)、樺(*Betula ermanii, B. tauschii*)、柳杉(*Cryptomeria*)、紫杉(*Taxus*)、紫藤(*Wisteria*)。

分 佈：山東；朝鮮、日本、俄羅斯遠東、北美。

886. **Ferrisiana virgata** (Cockerell) 橘腺刺粉蚧 (ASZI, 1986, 1:323; Chang et al., 1982:99, Chao, 1982:92, Hun., 1992:178, Luo, 1991:84; NZWDI, 1981:1894; Tang 1992:210; Tao, 1983:307-308; 1999:14; Yunn., 1987:485; Zhang, 1987[ed.] 1:67; Zhou, 1993(2):46)

Dactylopius virgatus Cockerell, 1893:178.
=*Dactylopius virgata* var. *formosus* Cockerell, 1893:178.
=*Dactylopius virgata* var. *humilis* Cockerell, 1893:179.
=*Dactylopius cereferus* Newstead, 1894:24.
=*Dactylopius talini* Green, 1896:7.
=*Dactylopius dasylirii* Cockerell, 1896:202.
=*Pseudococcus marchali* Vayssiere, 1912:366.
=*Pseudococcus bicaudatus* Kenchenius, 1915:63.
=*Heliococcus malvastrus* McD., 1962:323.

別 名：*雙條拂粉蚧、咖啡粉蚧、大尾粉蚧、長尾粉蚧*。

寄 主：豆科(Leguminosae),大戟科(Euphorbiaceae),莧科(Amaranthaceae),芸香科(Rutaceae),天南星科(Araceae),紫威科(Bignoniaceae),錦葵科(Malvaceae),菊科(Compositae),桑科(Moracea),玉蕊科(Lecythidaceae),木蘭科(Magnoliaceae),無患子科(Sapindineae),夾竹桃科(Apocynaceae),木犀(Oleaceae),桃金孃科(Myrtaceae),漆樹科(Anacardiaceae)等之釋迦、柑橘屬、檬果、酪梨、榴蓮、人心果、蓮霧、番石榴、石榴、無花果、咖啡屬、可可、香蕉、棗椰子、糖棕、椰子屬、桑、大蕃荔枝棉屬、腰果、蒲葵、木槿屬、茶、棉、煙草屬、茄屬、胡椒、甘蔗屬、木棉、山茶、夾竹桃屬、天門冬、重陽木、常春藤屬、車前草屬、木麻黃、木薯、橡膠、蛇皮果、車前草、面包樹、肉豆寇、油瓜、木豆、輕木、澳洲金合歡、月桂、安息香、。

分 佈：全世界熱帶及亞熱地區，臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、湖南、湖北、浙江；亞洲東南部、非洲、美洲。

天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲
Anagyrus dactylopii (Howard) 粉蚧長索跳小蜂

887. **Formicoccus eriobotryae** Wang 枇杷蟻粉蚧 (Tang 1992:289; Tao, 1999:15; Wang, 1985:444)

Formicoccus eriobotryae Wang, 1985:444.

寄 主：枇杷根部。

分 佈：福建。

888. **Geococcus citrinus** Kuwana 柑橘地粉蚧 (ASZI, 1986, 1:323; Chao, 1982:93; Huang et Gao, 1996:149; Hwang et al., 1979:200-205; Tang 1992:46; Tao, 1999:15)

Geococcus citrinus Kuwana, 1923:51.

別 名：*柑橘根粉蚧*。

寄 主：柑橘、胡椒(*Piper betle* L.)的根部。

分 佈：福建；日本。

天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲

889. **Geococcus coffeae** Green 咖啡地粉蚧 (Tao, 1999:15)

Geococcus coffeae Green, 1933:54.

寄 主：咖啡。

分 佈：臺灣。

890. **Heliococcus destructor** Borhsenius 梨刺粉蚧 (Tao, 1999:16)

Heliococcus destructor Borhsenius, 1949:281.

寄 主：梨、石榴、桑。

分 佈：新疆。

891. **Heliococcus zizyphi** Borkhsenius 棗陽腺刺粉蚧 (ASZI, 1986, 1:325; Chen et al., 1993:47; Li et al., 1995(2):9; Tang 1992: 49; Tao, 1999:16; Zhang, 1987[ed.] 1:67)

Heliococcus zizyphi Borchsenius, 1958:161, 170.

別 名：*棗陽粉蚧*，*棘星粉蚧*、*棗粉蚧*。

寄 主：棗、蘋果、沙果、杏、梨。

分 佈：江西、廣東、河南、山東、山西、河北、寧夏。

天 敵：*Marietta picta* (Andre) 豹紋花翅矮小蜂

892. **Kiritshenkella yunnanensis** Borchsenius 雲南枯粉蚧 (Yunn., 1987:477)

寄 主：柑橘。

分 佈：雲南。

893. **Lomatococcus ficiphilus** Borchsenius 緣管粉蚧 (ASZI, 1986, 1:328; Tao, 1999:17; Yunn., 1987:486)

Lomatococcus ficiphilus Borkhsenius, 1960:920, 936.

寄 主：無花果、印度橡膠樹。

分 佈：廣東、雲南、四川。

894. **Maconellicoccus hirsutus** (Green) 木槿曼粉蚧 (Tang 1992:501; Tao, 1999:18)

Phenococcus hirsutus Green, 1908:25.

=*Phenacoccus quarternus* Green, Ramakrishna Ayyar, 1921:345. [nomen nudum].

=*Pseudococcus hibisci* Hall, 1922:17. [Nomen Nudum].

=*Phenacoccus glomeratus* Green, 1922:389.

=*Spilococcus perforatus* De Lotto, 1954:114.

寄 主：柑橘、葡萄、石榴、番石榴、釋迦、海棗(*Phoenix*)、木槿、合歡、天冬、藜(*Chenopodium*)、菊、刺桐、榕、棉、仙人掌、菜豆。

分 佈：臺灣、山西；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、蘇丹、埃及、東非、澳洲等廣佈。

895. **Maconellicoccus pasaniae** (Borchsenius) (Tang 1992:502; Tao, 1999:18)

Parcoccus pashniae Borchsenius, 1962:590.

寄 主：波蘿蜜(泰國)。

分 佈：雲南；泰國(1993 年由泰國進口臺灣波蘿蜜上曾發現)。

896. **Nipaecoccus filamentosus** (Cockerell) 球粉蚧 (ASZI, 1986, 1:330; Chiu et al., 1985:1-8; Lo et Tao, 1966:53-56; Tao, 1963:304-306, 1999:20; Zhou, 1993(2):46)

Dactylpius filamentosus Cockerell, 1893:268.

Nipaecoccus filamentosus, Ferris, 1950:

別 名：*絲鱗粉蚧*。

寄 主：釋迦、柑橘、橙、茶、野獨活、棕櫚、油菜、黃梔子。

分 佈：臺灣、華南；舊北區、東洋區、馬達加斯加、非洲、中美洲。

天 敵：*Cryptolaemus montrouzieri* (Mulsant) 蒙氏瓢蟲

Scymnus (Nephus) ryguus Kamiya 二星小黑瓢蟲

Anagyrus sawadai Ishii 廣角跳小蜂

Leptomastix dactylopii Howard

897. **Nipaecoccus nipae** (Maskell) 波蘿蜜球粉蚧 (Tao, 1999:20)

Dactylopius nipae Maskell, 1893:232.
=*Dactylopius pseudonipae* Cockerell, 1897:302.
=*Ripersia serrata* Tinsley, 1900:66.
=*Dactylopius dubia* Maxwell-Lefroy, 1903:26. [nomen nudum].
=*Pseudococcus magnoliae* Hambleton, 1935:110.

寄 主：波蘿蜜(*Artocarpus*)。

分 佈：福建、廣東、海南；越南、印度、巴基斯坦、朝鮮、蘇聯、歐洲、北美、中美、南美、新西蘭、夏威夷。

898. **Nipaecoccus vastator** (Maskell) 柑橘堆粉蚧 (ASZI, 1986, 1:329; Chao, 1982:93; Chang, 1987:40; Huang, 1990[ed.] 2:202-203; Huang et Gao, 1996:149; Hun., 1992:178; Luo et Jin, 1995:85; 1997:74; Luo et al., 1996:86; NZWDI, 1981:1893; Tang 1992:335; Tang et Li 1989:44; Tao, 1999:21; Yunn., 1987:485; Zhang, 1987[ed.] 1:67; Zhou, 1993(2):46)

Dactylopius viridis Newstead　1894:25.
=*Dactylopius vastator* Maskell, 1894:65.
=*Pseudococcus perniciosus* Mewstead et Willcocks, 1910:138.
=*Pseudococcus solitarius* Brain, 1915:104.
=*Pseudococcus perniciosus* var. *vastator* Newst, 1920:179.
=*Pseudococcus filamentosus* var. *corymbatus* Green, 1922:379.
=*Trionymus sericeus* James, 1936:203.
Nipaecoccus viridis, Ali, 1970:113.

別 名：*橘鱗粉蚧*、*蠟粉蚧*、*堆粉蚧*、*堆蠟粉蚧*、*木槿粉蚧*。

寄 主：柑橘、柚、橙、金橘、黃皮、龍眼、酪梨、波蘿蜜、番荔枝、蓮霧、棗、咖啡、石榴、桑、茶樹、榕樹、木槿、合歡、草棉。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、內蒙古(溫室內)；日本、亞洲南部、菲律賓、越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、爪哇、澳洲、新西蘭、大洋洲、馬達加斯加、非洲、伊朗、伊拉克、約旦、以色列、夏威夷、美國、墨西哥等。

天 敵：*Chrysopa* sp.　草蛉
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant　孟氏隱唇瓢蟲
Scymnus hilaris Motschulsky　小(黑)姬瓢蟲
Scymnus (*Nephus*) *ryguus* Kamiya　二星姬瓢蟲(二星小瓢蟲)
Scymnus sodalis Weise　臺灣小瓢蟲
Scymnus sp.　小毛瓢蟲
寄生性(寄生蜂有四種)
Encyrtidae　跳小蜂科
Anagyrus dactylopii (Howard)

899. **Oracella acuta** (Lobdell) 濕地松粉蚧 (He, 1995, 21(2):47-48; Liu et al., 1996, 18(2):54-59; Tang et Tian, 1995, 2:32-34; Tao, 1999:21; Xu et al., 1992(4):22-24; Yang et Liang, 1996, 18(2):91-97; Young, 1991:158; Zhou et al., 1994:114-118)

Pseudococcus acutus Lobedell, 1930:213.
Oracella acuta, Ferris, 1950.

寄 主：濕地松(*Pinus elliottii*)、火炬松(*Pinus taeda*)、馬尾松(*Pinus*)、 落葉松、裂果沙松。

分 佈：廣東：美國東南部諸州。1988 年從美國喬治亞州引進濕地松接穗帶入廣東。在美國寄生在濕地松、火炬松、萌芽松(短葉松)(*Pinus echinata*)、長葉松(*Pinus*

palustria)、矮松(*Pinus virginiana*)等針葉叢中。

900. **Palmicultor palmarum** (Ehrhorn) 東亞椰粉蚧 (Tang 1992:214; Tao, 1999:21)

Ripersia palmarum Ehrhorn, 1916:245.
=*Pseudococcus oceanicus* Takahashi, 1939:239.
=*Pseudococcus oceanicus* var. *kentiae* Takahashi, 1939:242.
=*Pseudococcus cocitis* Takahashi, 1939:263.
寄 主：椰子(*Cocos nucifera*)、檳榔(*Areca catecha*)、橡膠樹(*Coelococcus amicarum*)。
分 佈：廣東；菲律賓、馬來西亞、泰國、密克羅尼西亞、夏威夷、新熱帶區、新西蘭。

901. **Paraputo citricola** Tang 柑橘簇粉蚧 (Ben-Dov, 1994:283; Tang 1992:598; Tao, 1999:21)

Paraputa citricola Tang, 1992:598.
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

902. **Paraputo sinensis** Borchsenius 秦簇粉蚧 (Ben-Dov, 1994:285; Tang, 1992:312; Tao, 1999:22)

Paraputo sinensis Borchsenius, 1962:224.
寄 主：鳳果、殼斗科。
分 佈：雲南、四川；泰國(1993 年由泰國輸入臺灣的鳳果上曾發現)。

903. **Phenacoccus azaleae** Kuwana 杜鵑綿粉蚧 (Ben-Dov, 1994:309; Tang et al. 1988:45; Tao, 1999:22)

Phenacoccus azaleae Kuwana, 1914:1.
寄 主：李子、山楡。
分 佈：內蒙古；朝鮮、日本。

904. **Phenacoccus fraxinus** Tang 白蠟綿粉蚧 (Xiao, 1992:262)

Phenacoccus fraxinus Tang, 1977, 1:36.
寄 主：柿、核桃、白蠟、重陽木、三懸鈴木。
分 佈：河南、山西。
天 敵：匯斑彎葉瓢蟲
Metaphycus pulvinariae (Howard) 綿蚧闊柄跳小蜂
綿粉蚧長索跳小蜂
綿粉蚧刷盾緣跳小蜂
Pteromalidae 金小蜂科
長盾金小蜂

905. **Phenacoccus mespili** (Signoret) 梨綿粉蚧 (Ben-Dov, 1994:332; Tao, 1999:23)

Pseudococcus mespili Signoret, 1875:367.
Chermes mespili Geoffroy, 1762:508. of Authors [Unavailable Name].
Phenacoccus mespili, Cockerell, 1899:264.
寄 主：梨。
分 佈：新疆；蘇聯、歐洲。

906. **Phenacoccus mumensis** Tang 梅山刺粉蚧 (ASZI, 1986, 1:336; Tang, 1977:34; 1992: 374; Tao, 1999:23)

Planococcus mumensis Tang, 1977:34.
別 名：*美臀紋粉蚧*。
寄 主：梅。

分 佈：浙江(黃岩梅山)。

907. **Phenacoccus pergandei** Cockerell 柿綿粉蚧 (Ben-Dov, 1994:336; Huang, 1990[ed.] 2: 324-325; Tang 1992:543; Tao, 1999:23)
Phenacoccus pergandei Cockerell, 1896:7, 18.
=*Pseudococcus katsurae* Shinji, 1935:776.
寄 主：柿、無花果、蘋果、李、梨、枇杷、核桃、桑、英迷(*Viburnum* spp.)、泡桐、常春藤、狗牙根、野桐、鼠李、忍冬、白蠟樹、跑馬子、懸鈴木、八仙花、朴樹、柳、鐵杉、榎樹、槭樹、吳茱萸等。
分 佈：浙江、陝西、山西、遼寧；朝鮮、庫頁島、日本。
天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

908. **Phenacoccus prodigialis** Ferris 梅綿粉蚧 (Ben-Dov, 1994:338; Tao, 1999:23)
Phenacoccus prodigialis Ferris, 1950:9.
寄 主：梅、*Berberis*。
分 佈：雲南。

909. **Phenacoccus prunicola** Borchsenius 杏綿粉蚧 (Tang 1992:546)
Phenacoccus prunicola Borchsenius, 1962:232.
寄 主：杏樹(*Armeniaca* sp.)、梅、*Berberis*、玫瑰。
分 佈：雲南。

910. **Planococcoides chipponensis** (Takahashi) 知本粉蚧 (Tang 1992: 360; Tao, 1999:23)
Pseudococcus chipponensis Takahashi, 1939:86.
Planococcides chipponensis; Tang, 1992:
寄 主：柑橘(根)。
分 佈：臺灣 (臺東知本)。

911. **Planococcus citri** (Risso) 橘臀紋粉蚧 (ASZI, 1986, 1:334; Ben-Dov, 1994:355; Chao, 1982:93; Chang, 1987:40; Chiu et al., 1985:1-8; Hsieh et Huang, 1981:283; Huang et Chu, 1987:297-305; 307-319; Huang et Gao, 1996:149; Huang et al., 1986:155-161; Hun., 1992:179; Liu et Chang, 1984:87-95; Liu et al., 1981:284; Luo et Jin, 1997:71; Luo et Li, 1998:42; Luo et al., 1996:55; Luo et al., 1996:86; NZWDI, 1981:1894; Su et Wang, 1988:279-288; Tang et al., 1993:132; Tao, 1963:306-307; 1999:24; Wang et Zhang, 1992:162; Wu, 1994:585; Yunn., 1987:479; Zhang, 1987[ed.] 1:67; Zhan et al., 1994(3):23; Zhou, 1993(2):46)
Dorthesia citri Risso, 1813:416.
=*Coccus tuliparum* Bouché,1844:301.
=*Dactylopius alaterni* Signort, 1875:309.
=*Dactylopius ceratoniae* Signort, 1875:311.
=*Lecanium phyllococus* Ashmead, 1879:160.
=*Dactylopius brevispinus* Targioni-Tozzetti, 1881:137.
=*Dactylopius destructor* Comstock, 1881:342.
=*Dactylopius secretus* Hempel, 1900:387.
=*Phenacoccus spiriferus* Hempel, 1900:389.
=*Lecaium phyllococcus* Fernald 1903:99.
=*Pseudococcus citri* var. *coleorum* Marchal, 1908:2 36
=*Pseudococcus cridorum* Lindinger, 1910:7
=*Pseudococcus citri* var. *phenococciformis* Brain 1915:116.
=*Planococcides cubanensis* Ezzat et McConnell, 1956:55.
=*Planococcus citricus* Ezzat et McConnell 1956:69.
別 名：*柑橘粉蚧*，*柑橘臀紋粉蚧*，*柑橘粉蚧*，*橘粉蚧*。
[Citrus mealybug]
寄 主：柑橘、柚、橙、檸檬、黃皮、橄果、釋迦、柿、棗、蓮霧、番石榴、石榴、桑、葡萄、可可、咖啡、人心果、鳳梨、腰果、茶、胡椒、巴豆、梧桐、松

科、茄科植物、木槿、合歡、草棉、紅色美人蕉、黃色美人蕉等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、湖北、華北、內蒙古(溫室內)、東北；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲、美洲等全世界。
天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲
Cryptogonus horishanus (Ohta) 二星姬瓢蟲
Leptomastix dactylopii Howard 跳小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂

912. **Planococcus dorsospinosus** Ezzat et McGonnell 荔枝刺粉蚧 (Ben-Dov, 1994:358; Tang 1992:369; Tao, 1999:24)
Planococcus dorsospinosus Ezzat et McGonnell, 1956:75.
=*Planococcus myrsinephilus* Borchsenius, 1962:585.
=*Planococcus sinensis* Borchsenius, 1962:586.
寄 主：荔枝、龍眼、番石榴、桑、芋、葛。
分 佈：臺灣、香港；菲律賓、泰國、印度、在美國截獲從我國輸入的植物上發現。

913. **Planococcus ficus** (Signoret) 葡萄粉蚧 (Ben-Dov, 1994:359; Cox, 1989:)
Coccus vitis Linnaeus, Nedzel'skii, 1869:19.[Misidentification].
Dactylopius ficus Signoret, 1875:315.
=*Dctylopius subterraneus* Hempel, 1901:388.
=*Pseudococcus citrioides* Ferris, 1922:208.
寄 主：檬果、蘋果、無花果、葡萄、石榴、榕樹等。
分 佈：四川、印度、巴基斯坦、古北區、南非、新熱帶區。

914. **Planococcus kraunhiae** (Kuwana) 紫藤刺粉蚧 (Ben-Dov, 1994:362; Chao, 1982:93; Tang 1992:372; Tao, 1999:24)
Dactylopius kraunhiae Kuwana, 1902:55.
=*Planococcus siakwanensis* Borchsenius, 1962:586.
別 名：*藤氏粉蚧*。
寄 主：柑橘、柿、無花果、咖啡、冬青、齊墩果、懸鈴木。
分 佈：臺灣、雲南；朝鮮、日本、美國。

915. **Planococcus lilacinus** (Cockerell) 南洋刺粉蚧 (Ben-Dov, 1994:363; Chao, 1982:93; Luo et Li, 1998:32; Tang 1992:373; Tao, 1999:24)
Pseudococcus lilacinus Cockerell 1905:128.
=*Pseudococcus tayabanus* Cockerell, 1905:129.
=*Dactylopius crotonis* Green 1906:44. [Momen nudum]
=*Dactylopius coffeae* Newstead, 1908:37.
=*Pseudococcus deceptor* Betrem, 1937:54.
=*Tylococcus maurtiensis* Mamet 1939:579
別 名：*擬柑橘粉蚧*，*咖啡紫粉蚧*，*變葉木粉蚧*。,
寄 主：柑橘、番石榴、檬果、釋迦、可可、咖啡、巴豆、刺桐、腐婢、蓽撥、破布木、丁子香、大戟等。
分 佈：臺灣、海南、華南；日本、菲律賓、越南、柬埔寨、婆羅洲、新幾內亞、爪哇、巴布亞新幾內亞、新西蘭、密克羅尼西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、南非、新熱帶區。
天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲

916. **Planococcus litchi** Cox 荔枝粉蚧 (Ben-Dov, 1994:364; Cox, 1989:48; Tao, 1999:24)

Planococcus litchi Cox, 1989:48.
寄 主：荔枝、枇杷。
分 佈：香港、中國；菲律賓、泰國、日本。

917. **Planococcus minor** (Maskell) 巴豆粉蚧 (Ben-Dov, 1994:365; Huang et al., 1984:431; 1988:157-174; Liu et Chang, 1983:194; Pingtung AC., 1986:46; Tao, 1999:24; Wu, 1994:588)
Dactylopius calceolariae var. *minor* Maskell, 1897:322.
=*Planococcus pacificus* Cox, 1981:48.
Planococcus minor Cox, 1989:52.
別 名：*番石榴粉蚧*。
寄 主：多食性，梨樹、番石榴、百香果、釋迦、可可、咖啡、茄苳、血桐、野桐、聖誕樹、變葉木、含笑花、山珠豆、含羞草、相思樹、大花曼陀羅、印度茄、白千層、白榕、大青、海州常山、龍船花等。
分 佈：臺灣；菲律賓、婆羅洲、印尼、新幾內亞、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、澳洲、新西蘭、馬達加斯加、新熱帶區、南太平洋諸島嶼。

918. **Planococcus morrisoni** (Ezzat et McConnell) 摩利氏粉蚧 (Ben-Dov, 1994:367)
Allococcus morrisoni Ezzat et McConnell, 1956:17.
Planococcus morrisoni, Cox et Ben-Dov, 1968:488.
寄 主：荔枝、*Melicoccus bijugatus* 等
分 佈：菲律賓、西馬來西亞、泰國

919. **Pseudococcus calceolariae** (Maskell) 柑橘棲粉蚧 (ASZI, 1986, 1:336; Ben-Dov, 1994:381; Tang 1992: 239; Tao, 1999:25)
Dactylopius calceolariae Maskell, 1879:218.
Pseudococcus calceolariae, Fernald, 1903:98.
=*Pseudococcus fragilis* Brain, 1912:186.
=*Pseudococcus gahani* Green, 1915:179.
=*Pseudococcus citrophilus* Clausen, 1915:30.
寄 主：柑橘、蘋果、梨、葡萄、柚、柑、橙、鳳梨，寄主很多，已記錄約 30 餘科 250 種植物，因而食性很雜，雙子葉、單子葉植物都爲害。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、湖北、河南、河北；印度、澳洲、新西蘭、馬達加斯加、南非、歐洲、蘇聯、美國、墨西哥、巴西等。
天 敵：*Anagyrus dactylopii* (Howard) 粉蚧長索跳小蜂

920. **Pseudococcus comstocki** (Kuwana) 康氏粉蚧 (ASZI,1986, 1:337; Ben-Dov, 1994:384; Borchsenius, 1960:214; Chen, 1955:169-172; Huang, 1990[ed.] 2:106-108; Hun., 1992:179; Lin, 1971:162-166; Suzhou CS., 1985:247;Tang 1992:242; Tang et al. 1988:34; Tao, 1999:25; Wang et Zhang, 1992:407; Zhang, 1987[ed.] 1:67; Zhou, 1993(2):46)
Dactylopius comstocki Kuwana, 1902:52.
Pseudococcus comstocki, Fernald, 1903:100.
=*Pseudococcus grassi* Leon, 1913:59.
別 名：*桑粉蚧*。
寄 主：柑橘、柚、橙、荔枝、葡萄、蘋果、梨、石榴、鳳梨、桑、茶、樟等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、越南、柬埔寨、印度、斯里蘭卡、加羅林群島、塞班島、大洋洲、非洲、歐洲、北美洲、新熱帶區。
天 敵：草蛉
瓢蟲

Anagyrus dactylopii (Howard) 粉蚧長索跳小蜂
Pseudaphycus malinus Gahan 粉蚧玉棒跳小蜂(粉蚧短角跳小蜂)

921. **Pseudococcus cryptus** Hempel 橘小粉蚧 (ASZI, 1986, 1:336; Ben-Dov, 1994:385; Huang et Gao, 1996:149; Hun., 1992:179; NZWDI, 1981:1894; Tao, 1999:25; Wu, 1994: 588; Zhang, 1987[ed.] 1:67; Zhang et al., 1999(1):13; Zhang et al., 2000(2):13; Zhou, 1993(2):46)
Pseudococcus cryptus Hempel, 1918:199.
=*Pseudococcus citriculus* Green, 1922:377.
別 名：*柑橘蔴粉蚧*。
[Citriculus mealybug]
寄 主：柑橘、石榴、蘋果、李、梨、桃、杏、柿、棗、栗、茶。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、浙江、江蘇、山東、河南、河北、遼寧；日本、菲律賓、越南、孟加拉、印度、斯里蘭卡、佳果列嶼(印度洋)、摩里達斯、非洲、以色列、夏威夷、大洋洲、澳洲、新西蘭、北美、巴西等。
天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲
Anagyrus subalbipes Ishii 粉蚧長索跳小蜂

922. **Pseudococcus gahani** Green 柑棲粉蚧 (Zhang, 1987[ed.] 1:67)
寄 主：葡萄、柑、柚、橙、梨。
分 佈：江西。

923. **Pseudococcus longispinus** (Targioni-Tozzetti) 長尾粉蚧 (ASZI, 1986, 1:337; Ben-Dov, 1994:397; Chao, 1982:93; Huang et Gao, 1996:149; Tang 1992:247; Tao, 1999:25; Wu, 1994:591; Zhou, 1993(2):46)
Coccus adonidum, of suthors (nec Linnaeus, 1767:118).
Dactylopius longispinus Targioni-Tozzetti, 1867:75.
=*Coccus laurinus* Boisduval, 1867:353.
=*Dactylopius pteridis* Signoet, 1875:321.
=*Dactylopius longifilis* Comstock, 1881:344.
Pseudococcus longispinus, Williams et Watson, 1988:190.
[Longtailed mealybug]
寄 主：食性很雜，已知有 34 科植物被爲害，柑橘、番石榴、洋蒲桃、蒲桃、葡萄、柿、鳳梨、桑、松、肖乳香、正榕、相思樹、山決明、海桐、文竹、馬纓丹、槭、百合、天南星、大戟、茜草、芸香、龍舌蘭、蘇鐵、禾本、蘭、薔薇、木犀、五加、錦葵、漆樹、苦檻蘭、夾竹桃、樟、棕櫚、莎草、蝶形花、秋海棠、桃金孃、玄參、報春等科。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、雲南、華南；越南、廣佈于亞洲(東南部)、印尼、巴布亞新幾內亞、南太平洋諸島嶼、澳洲、新西蘭、馬達加斯加、非洲、歐洲、蘇聯、日本、美洲。
天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲

924. **Pseudococcus maritimus** (Ehrhorn) 真葡萄粉蚧 (Ben-Dov, 1994:401; Tang 1992:249, Tao, 1999:26)
Dactylopius maritimus Ehrhorn, 1900:316.
=*Pseudococcus bakeri* Essig, 1910:341.
=*Pseudococcus omnivorae* Hollinger, 1917:271.
寄 主：蘋果、梨、洋梨、杏、懸鉤子、葡萄、桑、楸、朴、柏樹、皂夾、松葉菊、黃水仙、補骨脂、漆樹、旅人蕉、椴樹、馬蹄蓮等。
分 佈：廣東、山東；北美、中南美。

925. **Rastrococcu iceryoides** (Green) 吹綿蠟粉蚧 (Ben-Dov, 1994:435; Tang 1992:411; Tao, 1999:27)
Phenacoccus iceryoides Green 1908:26.
=*Dactylopius* (*Pseudococcus*) *obtusus* Newstead, 1911:164.
Rastrococcus iceryoides, Ferris 1954:55.
=*Rastrococcus capparíae* Avasthi et Shafee, 1983:103.
寄 主：檬果、百香果、柑橘、葡萄、馬櫟樹(*Capparis*)、灰葉、紫珠、月枳(*Murraya*)、野桐。
分 佈：香港；沙勞越、馬來西亞、新加坡、印尼、孟加拉、印度、斯里蘭卡、非洲。

926. **Rastrococcus invadens** Williams 西非蠟粉蚧 (Ben-Dov, 1994:436; Tang 1992:412; Tao, 1999:27)
Rastrococcus invadens Williams, 1986:696.
寄 主：番石榴、無花果、酪梨、腐婢、臭椿、紅厚殼、野桐、大薯、香益等。
分 佈：香港；菲律賓、越南、沙勞越、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、非洲。

927. **Rastrococcus mangiferae** (Green) 檬果蠟粉蚧 (Ben-Dov, 1994:437; Luo et al., 1996:55; Tang 1992:413; Tao, 1999:27)
Pseudococcus mangiferae Green, 1896:393.
=*Phenacoccus ballardi* Newstead, 1917:17.
Rastrococcus mangiferae, Ferris, 1954:55.
寄 主：檬果、柑橘、*Ardisia japonica*.
分 佈：臺灣、海南；馬來西亞、印度、斯里蘭卡。

928. **Rastrococcus spinosus** (Robinson) 多刺蠟粉蚧 (ASZI, 1986, 1:337; Ben-Dov, 1994:439; Chao, 1982:94; Tang 1992: 413; Tao, 1999:27)
Phenacoccus spinosus Robinson, 1918:145.
Rastrococcus spinosus, Ferris, 1954:55.
別 名：*蜂絲平刺粉蚧*，*蜂網粉蚧*。
寄 主：無花果、柑橘、檬果、荔枝、番石榴。
分 佈：臺灣、福建、廣東；菲律賓、越南、寮國、新加坡、印尼、泰國、孟加拉、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

929. **Rhizoecus kondonis** Kuwana 柑橘土粉蚧 (Ben-Dov, 1994:460; Huang et Gao, 1996:149; Tang 1992:69)
Rhizoecus kondonis Kuwana 1923:55.
=*Rhizoecus spinosus* McKenzie, 1960:753.
寄 主：柑橘、禾本科、菊科、薔薇科、唇形科等植物。
分 佈：福建；日本、美國(加州)、危地馬拉。

930. **Xenococcus annandalei** Silvestri 印度賓粉蚧 (Tang 1992:75)
Xenococcus annandalei Silvestri, 1924:312.
寄 主：可可(根部)、菩提樹、榕。
分 佈：香港；越南、馬來西亞、印度、澳洲。

Eriococcidae 絨蚧科

931. **Acanthococcus lagerstroemiae** (Kuwana) 石榴絨粉蚧 (ASZI, 1986, 1:319; Tang et al. 1988:67; Tao, 1999:32; Xiao, 1992:266; Zhao et al., 1998(3):12-14;)
Eriococcus lagerstroemiae, Kuwana, 1907:177-207.
Acanthococcus lagerstroemiae, Börchsenius, 1960:214.

別 名：*石榴蚧蚧*、*紫薇絨蚧*。
寄 主：蘋果、石榴、紫薇(*Lagerstroemia* sp.)。
分 佈：貴州、浙江、江蘇、安徽、山東、山西、河北、北京、天津、內蒙古(通遼市)、遼寧；日本。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲

932. **Asiacornococcus kaki** (Kuwana) 柿絨粉蚧 (ASZI 1986, 1:321; Ai, 1998(4):23; Chao, 1959:241; Chen et Wang, 1987:209; Huang, 1990[ed.] 2:323-324; Huang et Gao, 1996:267; Liu, 1982[ed.]:369; NZWDI, 1981:1795; Sun, 1991:14; Tang et al., 1998(4):31-32; Tao, 1999:31; Wang, 1987[ed.]:252-253; Wang et al., 1999:44; Xiao, 1992:264; Xu, 2000(1):38; Yang et al., 1997(4):27; Yuan., 1987:476; Zhang, 1987[ed.] 1:66; Zhao, 1993:160)
Eriococcus kaki Kuwana, 1931:655.
Asiacornococcus kaki; Tao, 1999:31.
別 名：*柿絨蚧*、*柿蠟蚧*、*柿刺粉蚧*、*柿綿蚧*。
寄 主：柿、香、無花果、*Lagertroemia flosreginae*.
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、陝西、河南、山東、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。
天 敵：草蛉
Adalia bipunctata (Linnaeus) 小二星瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲
七星瓢蟲
深點類瓢蟲
Anagyrus schoenherri (Westwood) 綿粉蚧長索跳小蜂
Microterys rufofulvus Ishii 紅黃花翅跳小蜂

933. **Eriococcus tokaedae** Kuwana 梨絨粉蚧 (ASZI, 1986, 1:321)
Eriococcus tokaedae Kuwana, 1932:143.
寄 主：梨、槭樹、松。
分 佈：四川、河北；日本。

Asterolecaniidae 鍵蚧科 (Lecaniodiaspididae 盤蚧科，球鍵蚧科 Cerococcidae 蠟蚧科)

934. **Asterococcus muratae** (Kuwana) 藤壺鍵蚧 (ASZI, 1986, 1:358; Hun., 1992:182; Tao, 1999:37; Zhou, 1993(2):46)
Cerococcus muratae Kuwana, 1907, 1:177-207.
Asterococcus muratae (Kuwana); Borchsenius, 1960:
=*Asterococcus pyri* Borchsenius, 1960:
寄 主：柑橘、蘋果、梨、枇杷、葡萄、茶、廣玉蘭、玫瑰、珊瑚樹、木蘭、香樟。
分 佈：西藏、四川、貴州、湖南、浙江、江蘇、上海；日本。

935. **Asterolecanium castaneae** Russell 栗新鍵蚧 (Chen, 1999(4):44; Huang et Gao, 1996:262; Liu, 1982[ed.]:359; Wang, 1987[ed.]:224-226; Xiao, 1992:292; Xue, 1994(2):33-34; Zhang, 1987[ed.] 1:75)
Asterolecanium castaneae Russell,
=*Neoasterodiaspis castaneae* (Russell); Xue, 1994(2):33-34.
寄 主：板栗、栗屬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲

936. **Crescoccus candidus** Wang 白生盤蚧 (Wang, 1982:87; Xiao, 1992:290)

Crescoccus candidus Wang, 1982:87.
寄 主：蘋果、板栗、青岡、麻櫟、櫟(*Quercus* sp.)。
分 佈：雲南、四川、貴州。

937. **Phenacobryum bryoides** (Maskell) 橘壺蚧 (Tao, 1999:46)
bryoides Maskell, 1983:84.
寄 主：柑橘。
分 佈：浙江；印度、斐濟。

Kerriidae 膠蚧科 (Tachardiidae, Laccifeidae)

938. **Kerria lacca** (Kerr) 紫膠蚧 (ASZI, 1986, 1:362; Beijing FC., 1980[ed.]:381-386; Chen et Chang, 1995:457; Cheng, 1948:45-54; Hsieh et Huang, 1981:25-33; 1981:119-120; 1982:119-120; 1983:31-40; Hsieh et al., 1978:304; Huang, 1982:146-151; Huang et Hsieh, 1978:304; 1981:103-115; Lee, 1964:210-213; Ou et al., 1984:70-80; Shao, 1991:26; Shih et Hsieh, 1979:175-183; Wang, 1987[ed.]:351-356; Wang et Zhang, 1992:162; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhao, 1995:163-164)
Coccus lacca Kerr, 1782, 71:324.
Laccifer lacca Kerr, 1782, 71:32.
Kerria lacca (Kerr);
寄 主：荔枝、龍眼、釋迦、橄欖、榕屬、黃檀屬、合歡屬、金合歡屬、木豆屬、蘇木、黃檀、榕、茶、黃杞、檉的種、火筒樹、惟囊、馬甲子等是主要寄主植物。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川、湖北；越南、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、東亞。
天 敵：*Eublemma cumabilis* Moore 嗜膠夜蛾(白蟲)
Holcocera pulverea Meyr. 黑蟲
Bracon greeni Ashmead 白蟲繭蜂(ex *Eublemma cumabilis* Moore)
Tachardiaephagus tachardiae Ashmead 黃胸膠蚧跳小蜂
Tetrastichus pupureus Cameron 膠蟲紅眼嚙小蜂

939. **Laccifer decorella** (Maskell) (Tao, 1999:48)
Laccifer decorella Maskell, 1892:
寄 主：梅、茶、*Myrica rubra*, *Gardenia florida*, *Eugenia smithi*, *Pupulus*, *Leucopugon microphyllus*, *Monotoca elliptica*.
分 佈：廣東、浙江；印度、澳洲。

940. **Laccifer fici** (Green) 無花果膠蚧 (Tang, 1974:206; Tao, 1999:48)
Tachardia fici Green, 1903:197.
寄 主：無花果、榕樹(*Ficus bengalensis*)。
分 佈：廣東。

941. **Laccifer greeni** (Chamberlein) 格氏膠蚧 (Chao, 1982:92; Tang, 1974:206; Tao, 1999:49)
Tachardia greeni Chamberlin, 1923, 14:169.
Laccifer greeni,
寄 主：龍眼、荔枝、橡果、無花果、榕樹、欖仁樹。
分 佈：臺灣、福建、華南、西南；菲律賓、泰國。

942. **Metatachardia fukiensis** Zhang 荔枝膠蚧 (Zhang, 1993:274; Tao, 1999:49)
Metatachardia fukiensis Zhang, 1993, 27:274.
寄 主：荔枝、*Mallotus philippinensis*.

分 佈：福建。

943. **Metatachardia myrica** Tang 楊梅翠膠蚧 (ASZI, 1986, 1:363; Tang, 1974:207; Wang et al., 2000(1):30-32)
Metatachardia myrica Tang, 1974:102.
寄 主：楊梅。
分 佈：浙江。

944. **Paratachardina theae** (Green et Mann) 茶角膠蚧 (ASZI, 1986, 1:362; Tang, 1974:206; Wang et al., 2000(1):30; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhou, 1993(2):46)
Tachardina theae Green et Mann, 1907:348.
Paratachardina theae,
別 名：*茶硬膠蚧*。
寄 主：柿、柑橘、橙、金橘、楊桃、楊梅、茶、榕、楓楊、奎寧、梔子。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、湖南、湖北、安徽、浙江；印度。

945. **Tachardina decorella** (Maskell) 輪冠硬膠蚧 (Tang, 1974:206; Wang et al., 2000(1):340)
寄 主：楊梅、茶、梔子、丁子香、白楊等。
分 佈：廣東、浙江。

Kermesidae 紅蚧科 (Kermococcidae, Kermide)

946. **Kermes nawae** Kuwana 栗綠蚧 (Huang et Gao, 1996:261; Hun., 1992:181; Lian et Zhu, 1993:146; Tao, 1999:36; Xiao, 1992:272)
Kermes nawae Kuwana, 1902, 3:49.
別 名：*栗紅蚧*。
寄 主：板栗、茅栗、錐栗。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北、河南；韓國、日本。
天 敵：*Chilocorus rubidus* Hope 黑緣紅瓢蟲
紅蚧蚜
芽枝狀枝孢霉菌
Psilophrys tenuicornis Graham 紅蚧細柄跳小蜂

947. **Kermes vastus** Kuwana 栗紅蚧 (Tao, 1999:37)
Kermes vastus Kuwana, 1907, 1:177-207.
寄 主：板栗、櫟。
分 佈：江蘇、華東、華北；朝鮮、日本。

948. **Kermococcus roboris** (Four) 栗紅蚧 (Chen et al., 1997:176-181; Wang, 1987[ed.]:222-224)
別 名：*栗綠蚧*。
寄 主：板栗、錐栗、茅栗。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南；日本。
天 敵：*Chilocorus rubidus* Hope 黑緣紅瓢蟲
一種小蜂
枝孢霉菌(寄生率可達 60.7%)。

Coccidae 蠟蚧科 (Lecaniidae)

949. **Alecanium hirsutum** Morrison 多毛怪異蚧 (Ben-Dov, 1993:7; Tang 1990:149)
Alecanium hirsutum Morrison, 1921:648.
寄 主：釋迦、丁子香。
分 佈：馬來半島、新加坡。

950. **Cardiococcus formosanus** (Takahashi) 臺灣蚌蠟蚧 (Ben-Dov, 1993:15; Tang 1990:315; Tao, 1999:51)
Inglisia formosanus Takahashi, 1930:34.
Cardiococcus formosanus, Tang, 1991:315
寄 主：沙梨。
分 佈：臺灣。

951. **Ceroplastes centroroseus** Chen 紅帽蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:346; Ben-Dov, 1993:24; Chen, 1974:325; Tang 1990:305; Zhou, 1993(2):46)
Ceroplastes centnroroseus Chen, 1974:325.
Paracerostegia centroroseus, Tang 1990:305
寄 主：橙、柑橘、茶、絲蘭。
分 佈：雲南、四川、貴州、湖南。
天 敵：*Anicetus ohgushii* Tachikawa 紅帽蠟蚧扁角跳小蜂
Microterys speciosus Ishii 蠟蚧花翅跳小蜂

952. **Ceroplastes ceriferus** (Fabricius) 角蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:346; Ben-Dov, 1993:24; Chao, 1982:94; Hun., 1992:183; Luo et Jin, 1995:85; Luo et al., 1996:54; Ma et al., 1995:117; Tang 1990: 298; Tao, 1999:51; Wang et Zhang, 1992:157; Wang et al., 2000(1):30-32; Yunn.1987:494; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhou, 1993(2):46)
Coccus ceriferus Fabricius, 1798:546.
=*Coccus* (*Ceraplastes*) *chilensis* Gray, 1830:7.
=*Ceraplastes australiae* Walker, 1852:1087.
=*Lacca alba* Signoret, 1869:848. [Nomen Nudum].
=*Ceraplastes ehrhorni* Cockerell, 1929:150.
=*Ceraplastes vaysserei* Mahdihassan, 1933:561. [Nomen Nudum].
寄 主：柑橘、蘋果、梨、李、梅、杏、櫻桃、檬果、楊梅、柿、石榴、無花果、酪梨、松、桑、茶、油松、柏、大葉黃楊、柳、椿、櫻、法國梧桐、木槿、月桂、冬青、木蘭、蘇鐵等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡、夏威夷、南太平洋諸島嶼、新西蘭、澳洲、英國、美國、巴拿馬、智利。
天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂

953. **Ceroplastes floridensis** Comstock 佛州蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:345; Ben-Dov, 1993:34; Chang et al., 1982:99; Chao, 1982:94; Huang et Gao, 1996:151; Hun., 1992:183; Ma et al., 1995:117; Tang 1990:306; Wang et Zhang, 1992:157; 1992:406; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhou, 1993(2):46)
Ceroplastes floridensis Comstock, 1881:331.
Paracerostegia floridensis, Tang, 1991:306.
別 名：*龜蠟蚧*、*龜甲蚧*、*龜甲蠟蚧*。
[Florida wax scale]
寄 主：多食性，柑橘、檸檬、梨、蘋果、李、杏、櫻桃、桃、百香果、檬果、番

石榴、安石榴、無花果、芭蕉、月桂、桃金孃、冬青、夾竹桃、茶、榕等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北；日本、亞洲東部、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、中東、北非、西南歐洲、北美、夏威夷、中南美洲、澳洲。

天 敵：*Anicetus ceroplastis* Ishii 蠟蚧扁角跳小蜂

Anicetus ohgushii Tachikawa 蠟蚧扁角短尾跳小蜂

Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂

Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂(夏威夷軟蚧矮小蜂)

Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂(♂若蚧, ♀成蚧)

Coccophagus silvestrii Compere 閩粵食蚧矮小蜂

954. **Ceroplastes japonicus** Green 日本龜蠟蚧 (Beijing FC., 1980[ed.]:199-200; Ben-Dov, 1993:40; Chen et Wang, 1987:213214; Huang, 1990[ed.] 2:311-313; Jiang et Cu, 1988:154; Li, 1997(4):44; Liu, 1982[ed.]:373-374; Liu et al., 1995:42-43; Lu et al., 1994, 20(4):32-33; Luo et al., 1993(3):27-28; Ma et al., 1995:117; Niu et Chen, 1998:30; NZWDI, 1981:1781; Shi et al., 1989-90:82; Suzhou CS., 1985:247; Tang 1990:308; Wang, 1987[ed.]:242-243; Wang, 1996(4):48;Wang et Li, 1995(4):48; Wang et Zhang, 1992:157; 1992:406; Xia, 1993:145; Xiao, 1992:275; Yang et Ren, 1999(5):16-18; Zhang, 1985[ed.]:165-166; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhao, 1993:160; Zheng, 1982:247; Zhou, 1993(2):46)

Ceroplastes floridensis var. *japonica* Green, 1921:258.

Ceroplastes japonica Borchsenius, 1949:181.

Paracerostegia japonica, Tang, 1990:308.

別 名：*龜蠟蚧*，*日本蠟蚧*。

寄 主：多食性，危害植物達 41 科 71 屬 103 種，在山西爲害棗樹及柿子受害甚烈，並爲綠化植物的嚴重害蟲，包括柑橘、蘋果、桃、梨、梅、杏、紅葉李、海棠、枇杷、桑、棗、柿、石榴、茶、油茶、懸鈴木、梔子花、大葉黃楊、山茶花、含笑、六道木、月桂、臘梅、女貞、茶重陽木、複葉槭、羅漢松、常春藤、絲棉木、枸骨、椿、冬青、鄭樹。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、南京、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、天津、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧，我國北方廣大區域；菲律賓、朝鮮、日本、蘇聯、利大意、英國，東亞北部是其分佈爲害區。

天 敵：*Chrysopa formosa* Brauer 麗草蛉

Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲

Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲

Exochomus (*Anexochomus*) *mongol* Barovsky 蒙古光瓢蟲

二星瓢蟲

蝸牛

Anysis sp. 龜蠟蚧長盾金小蜂

Scutellista sp. 長盾金小蜂

Anicetus beneficus Ishii et Yasumatsu 紅蠟蚧扁角跳小蜂

Anicetus ceroplastis Ishii 蠟蚧扁角跳小蜂

Anicetus ohgushii Tachikawa 紅帽蠟蚧扁角跳小蜂

Cerapteroceroides zhengzhouensis Shi 鄭州紋翅跳小蜂

Microterys ceroplastae Prinsloo 龜蠟蚧花翅跳小蜂

Microterys clauseni Compere 柯氏花翅跳小蜂(球蚧花翅跳小蜂)

Microterys speciosus Ishii 蠟蚧花翅跳小蜂

Aphytis sp. 長盾矮小蜂

Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂
Coccophagus chengtuensis Sugonjaev et Pen 成都食蚧矮小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食矮小蜂
Coccophagus silvestrii Compere 閩粵食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂(黑色軟蚧矮小蜂)
Marietta picta (Andre) 豹紋花翅矮小蜂

955. **Ceroplastes pseudoceriferus** Green 偽角蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:344; Ben-Dov, 1993:46; Chao, 1982:95; Hun., 1992:184; Luo, 1991:84; Tang 1990:299; Tao, 1999:52; Wang et Zhang, 1992:157; Wen et Lee, 1986:216-221; Zhang, 1985[ed.]:163-165; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhou, 1993(2):46)
Ceroplastes cerferus (Fabricius), Green, 1921:259. [Misidentification].
Ceroplastes pseudoceriferus Green, 1935:180.
別 名：*角蠟介殼蟲*。
寄 主：柑橘、蘋果、梨、梅、荔枝、檬果、腰果、松、杉、茶、油茶、榕樹、玫瑰、羅漢松。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡、Palaus。
天 敵：*Coccophagus ceroplastae* (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

956. **Ceroplastes rubens** Maskell 紅蠟蚧 (Ben-Dov, 1993:49; Chang et al., 1982:99; Chao, 1982:95; Chen, 1981:49; Chen, 1994(4):33; Chen, 1995(3):34-36; Chen, 1996(1):45; Chen, 1996(4):28; Chen, 1996(4):29; Chen et al., 1997, 14(3):36; Guo, 1997, 14(2):21; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:208-210; Huang et Gao, 1996:151; Huang et al., 1996(2):34-36; Hun., 1992:184; Lin, 1986[ed.]:319-321; Lin, 1995(3):44; Luo, 1991:84; Luo et Jin, 1995:85; Luo et Li, 1998:50; Luo et al., 1996:55; Luo et al., 1996:86; NZWDI, 1981:1896; Sheng et al., 1994(3):37; Shi et al. 1989-90:82; Suzhou CS., 1985:247; Tang 1990:300; Tao, 1999:52; Wang et Zhang, 1992:158; Weng et al., 1994(2):36-38; Wu, 1994:572; Wu et al., 1994:435; Yang et Ren, 1999(5):16-18; Yunn., 1987:494; Zhang, 1985[ed.]:166-167; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1994(2):43; Zhang et al., 1995(4):39; Zhang et al., 1999(1):13; Zhang et al., 2000(2):13; Zheng, 1982:247; Zhou, 1993(2):46)
Ceroplastes rubens Maskell, 1892:214.
=*Ceroplastes ribens minor* Maskell, 1897:309.
=*Ceroplastes myrticae* (Linnaeus), Green, 1909:8.
[Red wax scale]
寄 主：柑橘、蘋果、梨、櫻桃、龍眼、荔枝、檬果、酪梨、無花果、石榴、楊梅、番石榴、蓮霧、蒲桃(香果)、柿、桑、腰果、茶、油茶、馬尾松、雪松、杉、橡膠、樟、柳、椿、冬青、八角金盤、錫蘭肉桂、闌嶼肉豆寇、瓊崖海棠、菲島福木、茄苳、木棉、大葉山欖、紅仙丹花等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、青海、甘肅、陝西、河南、山東、河北；韓國、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、大洋洲(所羅門群島等)、澳洲、Seychelles, 非洲、夏威夷、美國、中美洲。
天 敵：*Anysis* sp. 金小蜂
Anabrolepis extranea Timberlake 柳蠟蚧跳小蜂
Anicetus annulatus Timberlake 環紋扁角跳小蜂
Anicetus beneficus Ishii & Yasumatus 紅蠟蚧扁角跳小蜂
Anicetus ceroplastis Ishii 蠟蚧扁角跳小蜂
Anicetus ohgushii Tachikawa 紅帽蠟蚧扁角跳小蜂

Encyrtus frontatus Mercet 紅蠟蚧跳小蜂
Microterys ceroplastae Prinsloo 龜蠟蚧花翅跳小蜂
Microterys speciosus Ishii 蠟蚧花翅跳小蜂
Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus ishiii Compere 依氏食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)
Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂*
Geniocerus sp 釉小蜂.
Tetrastichus ceroplastae (Girault) 蠟蚧嚙小蜂
Tetrastichus purpureus Cameron 紅眼嚙小蜂
Mymarid 1 sp.

957. **Chloropulvinaria aurantii** Cockerell 橘綠綿蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:349; Ben-Dov, 1993:251; Hun., 1992:184; Jiang et Gu, 1987:43; Luo et Jin, 1997:71; NZWDI, 1981:1891; Shi et Wei, 1998:28-30; Tang 1990:226; Tao, 1999:52; Yunn., 1987:492; Zhang, 1987ed.(1):68; Zhou, 1993(2):46)
Pulvinaria aurantii Cockerell, 1896:48.
=*Lecanium notatum* Maskell, 1897:243.
Chloropulvinaria aurantii, Borchsenius, 1952:
別 名：*綿蚧、柑橘綿蚧、柑橘綠綿蚧、蠟形綿蚧、黃綠絮介殼蟲。*
寄 主：柑橘、檸檬、橙、柚、枇杷、柿、橄欖、人心果、香蕉、茶、山茶、花椒、杜仲、月桂、桂花、夾竹桃等。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、上海、河北；日本、蘇聯、菲律賓、越南、斯里蘭卡、伊朗、非洲、大洋洲、美國。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲(二星瓢蟲,赤星瓢蟲)
Lemnia swinhoei Crotch 赤星瓢蟲
Scymnus hilaris Motschulsky 小(黑)姬瓢蟲
Scymnus (Nephus) ryguus Kamiya 二星小黑瓢蟲
Anicetus annulatus Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂
Metaphycus sp. 綿蚧跳小蜂
Microterys ericeri Ishii 白蠟蟲花翅跳小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂
Marietta picta (Andre) 豹紋花翅矮小蜂

958. **Chloropulvinaria polygonata** Cockerell 多角綠綿蚧 (Ben-Dov, 1993:276; Chiu et al., 1985:1-8; Huang et Gao, 1951:151; Hun., 1992:185; NZWDI, 1981:1891; Peng et al., 1990:323-329; Tang 1990:230; Zhang, 1987[ed.] 1:70)
Pulvinaria polygonata Cockerell, 1905:131.
=*Pulvinaria cellulosa* Green, 1909:262.
=*Pulvinaria nerii* Kanda, 1950:35.
Chloropulvinaria polygonata, Borchsenius, 1957:219.
別 名：*網紋綿蚧、橡果綠綿蚧。*
寄 主：柑橘、檸檬、萊檬、龍眼、橡果、枇杷、咖啡、茶、海桐、梔子花、九里香、米蘭、高粱、菊芋、夾竹桃。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、四川、浙江、江蘇、內蒙古；日本、菲律賓、越南、印度、孟加拉、斯里蘭卡、澳洲。

天 敵：Chrysopide 草蛉科
Coccinellidae 瓢蟲科
蜘蛛
Anicetus annulatus Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂
Clausenia purpured Ishii 粉蚧三色跳小蜂
Microterys ericeri Ishii 白蠟蟲花翅跳小蜂
Coccophagus ceroplastae Howard 斑翅食蚧矮小蜂(蠟蚧斑翅矮小蜂)
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂
Coccophagus silvestrii Compere 閩粵食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakyama 黑色軟蚧矮小蜂

959. **Chloropulvinaria psidii** Maskell 墊囊綠綿蠟蚧 (ASZL, 1986, 1:349; Ben-Dov, 1993:278; Hun., 1992:185; Tang 1990: 231; Tao, 1999:53; Wu, 1994:580; Zhou, 1993(2):46)
Pulvinaria psidii Maskell, 1893:223.
=*Pulvinaria cupaniae* Cockerell, 1893:159.
=*Pulvinaria psidii philippina* Cockerell, 1905:132.
=*Pulvinaria darwiniensis* Froggatt, 1915:414.
=*Lecanium vacuolatum* Green, Dash, 1916:42. [Nomen Nudum].
=*Pulvinaria cussoniae* Hall, 1932:188.
=*Pulvinaria gymnosporiae* Hall, 1932:189.
Chloropulvinaria psidii, Borchsenius, 1957:217.
別 名：*黃綠綿蚧*。
[Green shield scale]
寄 主：釋迦、蘋果、梅、櫻桃、杏、李、咖啡、柑橘、柚、黎檬、橙、洋檸檬、柑橘、番石榴、柿、菠蘿蜜、無花果、桑、檬果、龍眼、星蘋果、咖啡、黃梔花、仙丹花、九 木、鷹爪花、瓜馥木、蘇鐵、茶、山茶、樟、棕櫚、黃連木、楊桐、旋覆花、奎寧。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇、寧夏、甘肅、山東、河南、河北；日本、蘇聯、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡、美國、歐洲、非洲、馬達加斯加、埃及、大洋洲(所羅門群島、新不列顛)、南太平洋諸島嶼、澳洲、紐西蘭、美國、中南美洲。

960. **Chloropulvinaria taiwana** Takshashi 臺灣綠綿蚧 (Ben-Dov, 1993: 284; Tang 1990:232; Tao, 1999:53)
Pulvinaria taiwana Takahashi, 1929:61.
Chloropulvinaria taiwana,Yang, 1982:158.
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

961. **Coccus acutissimus** (Green) 荔枝軟蚧 (Ben-Dov, 1993:65; Tang 1990:72; Tao, 1999:53)
Kermes aurantii Alfonso, 1875:
=*Lecanium asstimilee maryllidis* Cockerell, 1893:
=*Lecanium asstimile amaryllis* Cockerell, 1894:
=*Lecanium acutissimum* Green, 1896, 4:10.
Coccus acutissimus, Fernald, 1903:168.
寄 主：荔枝、龍眼、檬果、菠蘿蜜、蒲桃(*Syzygium jambos*)、檳榔、紫金牛等。

分 佈：臺灣、海南；日本、琉球、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、蘇門答臘、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡、摩里達斯、Kenya、美國、夏威夷、馬利亞那群島、Palaus、西薩摩。

962. **Coccus asiaticus** (Lindinger) 百香果軟蚧 (Ben-dov, 1993:67; Tang 1990:72)

=*Lecanium caudatum* Green, 1896:10.
=*Coccus caudatus*, Fernald, 1903:168. [Secondary Homonym of *Coccus caudatus* Walker].
Coccus asiaticus Lindinger, 1932:201. [Replacement Name].
寄 主：咖啡、百香果、桑寄生等。
分 佈：臺灣；斯里蘭卡、非洲。

963. **Coccus bicruciatus** Green 長軟蚧 (Chao, 1982:95)

別 名：*雙錨蚧*。
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

964. **Coccus capparidis** (Green) 馬槽鄭軟蚧 (Ben-Dov, 1993:68; Tang 1990:72)

Lecanium (*Coccus*) *capparidis* Green 1904:187.
Coccus capparidis, Fullaway 1938:46.
=*Coccus arens* Hodgson 1968:114.
寄 主：柑橘、馬槽鄭、變葉木、念珠藤。
分 佈：印度、斯里蘭卡，埃及、以色列、夏威夷、Kiribati、東加、西薩摩、Bahamas、Honduras、佛羅里達。

965. **Coccus discrepans** (Green) 月枳軟蚧 (Ben-Dov, 1993:71; Tang 1990:73; Tao, 1999:53)

=*Kermes aurantii* Alfonso, 1875:
=*Lecanium asstimile amaryllidis* Cockerell, 1893:
=*Lecanium asstimile amaryllis* Cockerell, 1894:
=*Lecanium acuttissimum* 1896, 4:10.
Lecanium discrepans Green, 1904:204.
Coccus discrepans, Morrison, 1920:654.
寄 主：柑橘、月枳 (*Murraya caloxylon*)、橄果、木瓜、可可等。
分 佈：臺灣、福建、廣東；日本、琉球群島、菲律賓、新加坡、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

966. **Coccus formicarii** (Green) 南亞蟻軟蚧 (Ben-Dov, 1993:72; Tang 1990:84; Tao, 1999:54)

Lecanium formicarii Green, 1896:10.
=*Lecanium globulosum* Maskell, 1897:243.
Coccus formicarii, Mamet, 1954:13.
寄 主：梅屬、橄果、番石榴、龍眼、菠蘿蜜、橄欖、柿、茶、山茶、茄苳、梭樹、榕樹。
分 佈：臺灣、福建、香港；馬來西亞、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加。

967. **Coccus hesperidum** Linnaeus 褐軟蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:347; Ben-Dov, 1993:73; Chang et al., 1982:99; Chao, 1982:95; Hun., 1992:185; Shi et al. 1989-'90:82; Tang, 1990: 73, 86; Tang et al. 1988:82; Tao, 1999:54; Wang et Zhang, 1992:158; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhou, 1993(2):46)

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758, 10:455.
=*Coccus laevis* Costa, 1829:11.
=*Coccus patelliformis* Curtis, 1843:517.
=*Chermes lauri* Boisduval, 1867:340.

=*Lecanium angustatus* Signoret, 1873:398.
=*Lecanium maculatum* Signoret, 1873:400.
=*Kermes auranti* Alfonso, 1875:431.
=*Lecanium alienum* Douglas 1886:77.
=*Lecanium depressum simulans* Douglas, 1887:28.
=*Coccus aurantii* Alfonso,
=*Lecanium minimum* Newstead, 1892:141.
=*Lecanium amaryllidis* Cockerell, 1893:53.
=*Lecanium terminaliae* Cockerell, 1893:254.
=*Lecanium assimile amarylidis* Cockerell, 1893:254. [Nomen Nudum].
=*Lecanium assimile amaryllis* Cockerell, 1894:19.
=*Lecanium ceratoniae* Gennadius, 1895:277.
=*Lecanium nanum* Cockerell, 1896:19.
=*Lecanium pinicola* Maskell, 1897:310.
=*Lecanium faveolum* Cockerell, 1897:52.
=*Lecanium ventrale* Ehrhorn, 1898:245.
=*Lecanium hesperidum pacificum* Kuwana, 1902:30.
=*Lecanium signiferum* Green, 1904:197.
=*Lecanium punctuliferum* Green, 1904:205.
=*Coccus jungi* Chen, 1936:218.
=*Lecanium mauritiense* Mamet, 1936:96.

別 名：*扁堅介殼蟲*，*褐軟蚧*，*扁平堅蚧*。

[Brown soft scale]

寄 主：柑橘、柚、橙、枇杷、櫻桃、蘋果、梨、梅、杏、李、桃、檸果、木瓜、棗、無花果、桑、香蕉、可可椰子、大王椰子、桂花、月季花、菊花、月桂、棕櫚、綠蘭、夾竹桃、木蘭花、龍舌蘭、紫杉、穗花杉、蘇鐵、玉桂、樟、天竺桂、茶、山茶、枸杞、蝙蝠葛、楊、柳、楓、欖仁樹、訶梨勒、瓊崖海棠、紅毛饅頭果、菲島野桐、白花羊蹄夾、厚殼樹、臺灣馬鞭草、萬年青、孤挺花等。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、貴州、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、山東、河南、河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡、阿富汗、大洋洲、澳洲、非洲、歐洲(西部)、蘇聯、美洲、中南美洲。

天 敵：*Aneristus ceroplastes* Howard 蠟蚧扁角跳小蜂
Anicetus annulatus Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂
Metaphycus sp. 綿蚧闊柄跳小蜂
Microterys speciosus Ishii 蠟蚧花翅跳小蜂
Pseudaphycus malinus Gahan 粉蚧玉棒跳小蜂(粉蚧短角跳小蜂)
Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂(蠟蚧斑翅矮小蜂)
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂
Coccophagus silvestrii Compere 閩粵軟蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂(黑色軟蚧矮小蜂)*

968. **Coccus jungi** Chen 圓軟蚧 (Chao, 1982:95; Zhang, 1987[ed.] 1:69)

別 名：*瓊氏軟蚧*。

寄 主：柑橘。

分 佈：福建、江西。

天 敵：小蜂一種

969. **Coccus longulus** (Douglas) 長橢圓軟蚧 (Ben-Dov, 1993:80; Chang, 1987:40; Tang 1990:73, 89; Tao, 1999:54; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhou, 1993(2):46)

Lecanium longulum Douglas, 1887:97.
=*Lecanium chirimoliae* Maskell, 1890:137.
=*Lecanium ficus* Maskell, 1897:243.
=*Lecanium frontale* Green, 1904:192.
=*Coccus elongatus* (Signoret), Sanders, 1909:438. [Erroneous Synonymization].
=*Lecanium* (*Coccus*) *cetium* Kuwana, 1909:162.
=*Lecanium wistariae* Brain, 1920:8.
=*Lecanium kraunhiarum* Lindinger, 1928:107. [Replacement Name for *Lecanium wistariae* Brain].
=*Parthenolecanium wistaricola* Borchsenius, 1957:349. [Replacement name for *Lecanium wistariae* Brain].

寄 主：柑橘、荔枝、酪梨、百香果、葡萄、金合歡、秋海棠等，爲多食性，寄主植物很多。

分 佈：臺灣、江西、廣東、海南島、四川；菲律賓、巴布亞新幾內亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、埃及、中東、歐洲、美國、中美洲、南太平洋諸島嶼、澳洲、新西蘭，廣佈于熱帶、亞熱帶、冷地在溫室內爲害。

天 敵：*Aneristus ceroplastes* Howard 跳小蜂

970. **Coccus macarangicola** Takahashi 馬加蘭軟蚧 (Ben-Dov, 1993:83; Tang 1990:73)

Coccus macarangicola Takahashi, 1952:14.

寄 主：欖果、檳榔、合笑、*Paurotia wrightii*。

分 佈：馬來半島。本種可能在海南會發生。

971. **Coccus moestus** De Lotto 欖果樹軟蚧 (Ben-Dov, 1993:84; Tang 1990:92; Tao, 1999:54)

Coccus moestus De Lotto, 1959, 22:164.

寄 主：欖果、菠蘿蜜(*Artocarpus altilis*)、可可椰子、檳如樹、草海桐等。

分 佈：海南；日本、小笠原群島、密克羅尼西亞群島、非洲、美國、中美洲。

972. **Coccus perlatus** (Cockerell) 柑軟蚧 (Ben-Dov, 1993:86; Tang 1990:74)

Lecanium perlatus Cockerell, 1898:65.
Coccus perlatus, Fernald, 1903:173.

寄 主：柑橘。

分 佈：亞速爾群島(舊北區)、阿根廷。

973. **Coccus pseudomagnoliarus** (Kuwana) 柑橘樹軟蚧 (Ben-Dov, 1993:87; Tang 1991:74)

Lecanium (*Eulecanium*) *pseudomagnoliarum* Kuwana, 1914, 6:7.
=*Coccus citricola* Campbell, 1914:222.
=*Coccus aegaeus* De Lotto, 1973:291.
Coccus pseudomagnoliarum, Ben-Dov, 1993:87.

別 名：*橘灰軟蚧*。

寄 主：柑橘、枳(*Poncirus trifoliata*)等。

分 佈：臺灣、廣東、江蘇；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲、中東、澳洲、美國、墨西哥。

天 敵：*Anicetus annulatus* Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂
Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus ishiii Compere 依氏食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)

Coccophagus japonicus Compere　日本食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker)　賴食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama　黑色食蚧矮小蜂

974. **Coccus viridis** (Green) 綠軟蚧 (Ben-Dov, 1993:91; Cheng et Tao, 1963:80-89; Chiu et al., 1985:1-8; Hun, 1992:185; Luo et Li, 1998:30; Su et Lin, 1986:57-68; 113; Tang 1990:74; Tao, 1999:55; Wu, 1994:575; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhou, 1993(2):46)
Lecanium (*Eulecanium*) *viridis* Green, 11914, 6:7.
Coccus viridis, Fernald, 1903:174.
=*Lecanium* (*Trechocoris*) *hesperidum africanum* Nesvstead, 1906:74. [Nomen Nudum].
=*Coccus hesperidum africanum* Newstead, 1906:73.
=*Lecanium* (*Coccus*) *viride* Green, 1937:299.
=*Coccus viridis viridis* Köhler, 1978:564. [Nomen Nudum].
=*Coccus viridis bisexualis* Köhler, 1978:564. [Nomen Nudum].
別 名：*黃綠介殼蟲*，*綠蚧*，*咖啡綠軟蠟蚧*。
[Green scale]
寄 主：柑橘、硬皮橘、柚、橙、石榴、海棠、龍眼、檸果、番石榴、人心果、納塔爾梅子、咖啡樹、茶、山茶、冬青、錦葵、黃槿花、銀葉樹、過山香、大葉山欖、緬梔、奎寧樹、齊尼加、仙丹花等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇；日本、小笠原群島、菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、巴布亞新幾內亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、所羅門群島、澳洲、夏威夷、南太平洋諸島嶼、馬達加斯加、非洲、歐洲、美國(佛羅里達)、中南美洲。
天 敵：*Aneristus ceroplastes* Howard　跳小蜂
Microterys speciosus Ishii　斑翅跳小蜂
Coccophagus ceroplastae (Howard)　斑翅食蚧矮小蜂
Coccophagus hawaiiensis Timberlake　夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus tibialis Compere

975. **Didesmococcus koreanus** Borchsenius 朝鮮球堅蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:351; Ben-Dov, 1993:106; Chen et Wang, 1987:155; Di, 1993(1):34-35; Huang, 1990[ed.] 2:175-176; Huang et Gao, 1996:236; Jiang et al., 1993(4):26-27; Liang et al., 1997(4):51; Liu et Li, 1998(2):22; Liu, 1996, 22(5):26-27; Liu et al., 1999:46; NZWDI, 1981:1760; Sun et al., 1998(2):73; Tang, 1979:135-137; 1990:101; Tang et Li 1988:95; Tao, 1999:55; Wang, 1987[ed.]:272-274; Wang et al., 1997:22-23; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhou, 1993(2):46; Zuo et al., 1995(3):49)
Didesmococcus koreanus Borchsenius, 1955:388.
別 名：*桃球堅蚧*，*杏球蚧*，*朝鮮球堅蚧*。
寄 主：桃、李、杏、蘋果、梨、櫻桃、梅、擰檸、板栗、葡萄、棗、榆。
分 佈：江西、四川、湖北、青海、寧夏、甘肅、陝西、山東、河南、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。
天 敵：*Cybocephalus nipponicus* Endrödy-Younga　日本方頭甲
Chilocorus rubidus Hope　黑緣紅瓢蟲
Microterys clauseni Compere　柯氏花翅跳小蜂(球蚧花翅跳小蜂)
Coccophagus hawaiiensis Timberlake　夏威夷軟蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker)　賴食蚧矮小蜂

976. **Didesmococcus unifasciatus** (Archangelskaya) 中亞毛球蚧 (Ben-Dov, 1993:106; Tang, 1990:102; Tang & Li, 1988:96; Tao, 1999:55)
Physokermes unifasciatus Archangelskya, 1923:265.
=*Eriochiton amygdalae* Rao, 1939:59.
=*Didesmococcus megriensis* Borchsenius, 1953:283.

Didesmococcus unifasciatus Borchsenius, 1953:282.

寄 主：薔薇科核果類果樹，如桃屬(*Persica*)、扁桃屬(*Amygdalis*)、杏屬(*Aremniaca*)、李屬(*Prunus*)等。

分 佈：內蒙古；巴基斯坦、阿富汗、蒙古、中亞地區靠近新疆的幾個蘇聯加盟共和國。

天 敵：Coccinellidae 瓢蟲科

Noctuidae 夜蛾科

Oratocelis communimacula Hübner

Metaphycus punctipes (Dalman)

Blarorheux cuprina Nik.

Encyrtus sylvinus Dalman

Coccophagus lycimnia (Walker) 軟蚧矮小蜂

977. **Eucalymnatus tessellatus** (Signoret) 網蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:350; Ben-Dov, 1993:120; Chang et al., 1982:100; Tang 1990:105; Yunn., 1987: 490; Zhou, 1993(2):46)

Lecanium tessellatus Signoret, 1873, 5(3):401.

=*Lecanium perforatum* Newstead, 1894:233.

=*Lecanium tessellatum swainsonae* Cockerell, 1897:109.

=*Lecanium tessellatum perforatum* Cockerell, 1897:90.

Eucalymnatus tessellatus Cockerell, 1902:

=*Lecanium subtessellatum* Green, 1904:206.

=*Lecanium obosoletum* Green, 1922;

=*Lecanium tessellatum obsoletum* Green, 1922:1024.

別 名：*龜紋蚧*、*龜紋扁蚧*。

寄 主：柑橘、龍眼、檬果、番石榴、樟、楸、月桂、綠蘭、棕櫚等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、江蘇；日本、蘇聯、馬來西亞、印尼、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、夏威夷、南太平洋諸島嶼、澳洲、馬達加斯加、非洲、歐洲、美國、中南美洲。

天 敵：Fungi

Cephalosporium lecanii Zimm.

Encyrtidae 跳小蜂科

Anicetus annlatus Timberlake

Aneristus ceroplastae Howard

978. **Eulecanium albodermis** Chen 格紋白球蚧 (Ben-Dov, 1993:123; Chen, 1962:284; Tao, 1999:57)

Eulecanium albodermis Chen, 1962, 11:284.

寄 主：李樹、柑橘。

分 佈：四川。

979. **Eulecanium alnicola** Chen 榿木裸蚧 (Ben-Dov, 1993:123; Chen, 1962:283; Tao, 1999:57)

Eulecanium alnicola Chen, 1962, 11:283, 285.

寄 主：榿木(*Alunus* sp.)、李樹 (*Prunus salicina* Lindl.)、柳樹(*Salix babylonica* L.)、楊。

分 佈：四川。

980. **Eulecanium cerasorum** (Cockerell) 櫻桃球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:124; Tang, 1991:159)

Lecanium cerasorum Cockerell, 1900, 9:70.

Eulecanium cerasorum, Fernald, 1903:184.

寄 主：危害很多落葉果樹，如蘋果、核桃、杏、李、櫻桃等

分 佈：山西：朝鮮、日本、印馬地區、美國。

981. **Eulecanium ciliatum** (Douglas) 睫毛堅球蚧 (Ben-Dov, 1993:124; Tang 1991:160; Tao, 1999:57)
Lecanium ciliatum Douglas, 1891:67.
Eulecanium ciliatum, Fernald, 1903:184.
寄 主：蘋果屬、杏樹(*Armeniaca vugaris*)、山楂、胡桃、槭屬(*Acer*)、榆屬(*Ulmus*)、蒙古櫟(*Quercus mongolicas*)、樺樹(*Betula*)、楊、柳、忍冬、榿木(*Alnus hirsuta*)、鼠李、楊等。
分 佈：內蒙古：歐洲。

982. **Eulecanium gigantum** (Shinji) 巨球蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:351; Ben-Dov, 1993: Chen et al., 1993:46; Hun., 1992:186; Tang 1991:165; Tao, 1999:57)
Lecanium gigantea Shinji, 1935, 7:289.
=*Eulecanium diminutum* Borchsenius, 1955:293.
=*Lecanium glandi* Takahashi,1955:72.
Eulecanium gigantea, Wang, 1981:
寄 主：棗、核桃、洋槐、刺槐、紫薇、玫瑰、紫穗槐、櫟等。
分 佈：安徽、江蘇、寧夏、山西、山東、河南、河北、內蒙古、日本、蘇聯。
天 敵：*Blastothrix sericae* (Dalman) 球蚧花角跳小蜂
Encyrtus sasakii Ishii 刷盾短緣跳小蜂

983. **Eulecanium kunmingi** (Ferris) 昆明球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:130; Tang 1990:168; Tao, 1999:58)
Lecanium kunmingi Ferris, 1950, 15:73
Eulecanium kunmingi, Takagi, 1975:4
寄 主：桃、鼠李、火棘。
分 佈：雲南(昆明)。

984. **Eulecanium kunoense** (Kuwana) 日本球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:130; Huang, 1990[ed.] 2:176; Huang et Gao, 1996:235; Tang 1990:169; Wang, 1987[ed.]:272-274)
Lecanium kunoensis Kuwana, 1907, 1:191.
=*Eupulvinaria duranlae* (Takahashi), 1931:
Eulecanium kunoense, Lindinger, 1933:159.
寄 主：薔薇科果樹，蘋果、梨、海棠、桃、杏、李、梅、榆葉梅、櫻桃、山楂等。
分 佈：福建、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北；日本、1896 年前已傳入美國加州，現已很普遍。
天 敵：黑綠紅瓢蟲
Encyrtus sasakii Ishii 刷盾短緣跳小蜂
Metaphycus pulvinariae (Howard) 綿蚧闊柄跳小蜂
Coccophagus chengtuensis Sugonjaev et Pen 成都食蚧矮小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂

985. **Eulecanium kuwanni** (Kanda) 桃球蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:351; Li, 1993(4):42; Lin, 1994:42; Tang, 1979:135-137; Tao, 1999:58; Wang et Zhao, 1985: 119-120; Wang et al., 1996(2):36-37; Xiao, 1992:281; Xue, 1980:213-214)
Lulecanium kuwanai Kanda, 1934, 14:405.
Eulecanium knwanai, Tang, 1991:158. [Mis-spelling].
別 名：*酸球蚧、酸大球蚧、酸球堅蚧、槐花球蚧*。
寄 主：蘋果、桃、杏、紫葉李、國槐、刺槐、紫穗槐、櫻子、楊、柳、合歡、懸鈴木、白榆、槭、白蠟、紫薇、櫟類。
分 佈：雲南、四川、貴州、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、青海、寧夏、甘肅、

陝西、河南、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；日本。

天 敵：*Chilocorus rubidus* Hope 黑緣紅瓢蟲 (卵)

Beijing utila Yang 北京舉肢蜂

Microterys ceroplastae Prinsloo 龜蠟蚧花翅跳小蜂

球蚧藍綠跳小蜂

Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

另有寄生蜂三種

986. **Eulecanium nigrivitta** Borchsenius 雲南球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:131; Tang 1990: 172; Tao, 1999:58)

Eulecanium nigrivitta Borchsenius 1959, 38:174.

寄 主：栗樹(*Castanopsis* sp.)。

分 佈：雲南(昆明)。

987. **Eulecanium pyricola** Tang 梨球堅蚧 (Tang, 1984:127)

Eulecanium pyricola Tang, 1984:127.

寄 主：梨、李、桃、柳。

分 佈：新疆。

988. **Eulecanium rugulosum** (Archangelskya) 天山球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:133; Tang 1990:174)

Lecanium rugulosum Archangelskya, 1939:44

Eulecanium rugulosum, Borchsenius, 1957:395

寄 主：蘋果、梨、李、杏、櫻桃、桃、核桃、山楂、擰拐、榆、七葉樹等。寄主植物很多，危害喬灌木及栽培植物。

分 佈：天山、帕米爾西坡及蘇聯中亞加盟共和國，爲山地種。

天 敵：*Metaphycus punctipes* (Dalman)

Blastothrix sericea (Dalman)

Encyrtus sylvius Dalman

Eucomys incerta Nik.

Eucomys scutellata (Swed.)

989. **Eulecanium tiliae** (Linnaeus) 蘋果球堅蚧 (Ben-Dov, 1993:135; Tang 1990:171)

Coccus tiliae Linnaeus, 1758:456.

=*Coccus capreae* Linnaeus, 1767:741.

=*Coccus alni* Modeer, 1778:23.

=*Coccus mali* Schrank, 1781:295.

=*Coccus salicum* Fabricius, 1781:394.

=*Coccus fuscus* Gmelin, 1790:2221.

=*Coccus aceris* Fabricius, 1794:225.

=*Coccus rubi* Schrank, 1801:144.

=*Coccus pyri* Schrank, 1801:145.

=*Coccus xylostei* Schrank, 1801:145.

=*Coccus aceris campestris* Schrank, 1801:147.

=*Calypticus fascianus* Costa, 1829:14.

=*Lecanium juglandis* Bouché, 1844:299.

=*Coccus aesculi* Kollar, 1848:188. [Nomen Nudem].

=*Lecanium genevense* Targioni-Tozzetti, 1868:731.

=*Lecanium variegatum* Goethe, 1884:125.

=*Lecanium* (*Eulecanium*) *hoferi* King *in* Hofer, 1903:478.

=*Lecanium websteri mirabilis* King *in* Hofer, 1903:482.

Eulecanium tiliae, Fernald, 1903:197.

=*Eulecanium curtisi* Kirkaldy, 1904:257. [Unnecesary replacement name for *Coccus aceris* Fabricius, as redescribed by Curtis, 1838].

=*Eulecanium mali*, Balach, 1932.
寄 主：蘋果、梨、檸檬、葡萄、桑、榕、楊、柳等。
分 佈：印度、巴基斯坦、中亞、歐洲、蘇聯、北美。
天 敵：*Chilocorus rubidus* Hope　黑緣紅瓢蟲

990. **Maacoccus bicruciatus** (Green) 十字脊紋蚧 (Ben-Dov, 1993:170; Tang 1990:112; Tao, 1999:59)
Lecanium bicructatum Green, 1904:214
Maacoccus bicructatus, Ferris, 1921:212
寄 主：柑橘、檬果、胡頹子、叉木樹、梁王茶、丁子香、紅厚殼、七里香。
分 佈：臺灣、浙江；印度、斯里蘭卡、肯尼亞。

991. **Megapulvinaria maxima** (Green) 亞洲大綿蚧 (Ben-Dov, 1993:176; Tang 1990:276; Tao, 1999:60)
Pulvinaria maxima Green, 1904, 40:206.
=*Pulvinaria thespesiae* Green, 1909:259.
=*Eriochiton formosae* Takahashi, 1929:64.
寄 主：釋迦、印度棗、桑、算盤子、*Thespesia populnea*、變葉木等。
分 佈：臺灣、廣西；菲律賓、越南、爪哇、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡。

992. **Metaceronema japonica** (Maskell) 日本捲毛蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:350; Ben-Dov, 1993:184; Hun., 1992:186; Tao, 1999:60; Wang et Zhang, 1992:258; Xiao, 1992:282)
Ceronema eronema japonica Mackell, 1897, 33:243.
=*Eriochiton theae* Green, 1900:
Metaceronema japonica Takahashi, 1955:
=*Euphilippia aquifoliae* Chen, 1973:383.
=*Euphilippia monticola* Wang, 1976:342.
別 名：*日本捲毛蚧*，*刺綿蚧*，*油茶綿蚧*，*茶綿蠟蚧*。
寄 主：蘋果、薔薇、茶、油茶、柃木、山礬、貓兒刺等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江；朝鮮、日本、印度。
天 敵：(已知有 30 餘種，優勢種有 14 種)
草蛉
Coccinellidae　瓢蟲科 7 種
Chilocorus rubidus Hope　黑緣紅瓢蟲
Hyperaspis sinensis (Crotch)　中華顯盾瓢蟲
食蚜蠅
真菌(座殼菌)
Coccophagus hawaiiensis Timberlake　夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama　黑色食蚧矮小蜂
寄生蜂 4 種

993. **Milvicutulus mangiferae** (Green) 檬果原綿蚧 (Ben-Dov, 1993:186; Tang 1990:222; Tang 1990: 247; Tao, 1999:60)
Lecanium mangiferae Green, 1889:249.
=*Lecanium psidii* Green, 1904:225.
=*Lecanium wardi* Newstead, 1917:353.
=*Lecanium desolatum* Green, 1922:1020.
=*Lecanium ixorae* Green, 1922:1022.
=*Coccus kurarnensis* Takahashi, 1939:314.
Milvicutulus mangiferae, Williams et Watson, 1990.
別 名：*南亞烏蛞蚧*。

寄 主：檬果、柑橘類、番石榴、香果(*Eugenia jambos* L.)、無花果、菠蘿蜜(*Artocarpus integrifolia*)、桃金孃、木薑子、黃爽竹桃、破布木、梭樹、丁子香、肉豆蔻、雞蛋花、樟樹等。。

分 佈：臺灣、廣東、香港、浙江；日本、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、巴布亞新幾內亞、泰國、印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、塞昔耳群島、留尼旺島、模里西斯、科摩羅群島、馬達加斯加、非洲、以色列、夏威夷、南太平洋諸島嶼、所羅門群島、美國、中南美洲等很多熱帶、亞熱帶地區亦有記錄。

994. **Paralecanium expansum** (Green) 荔枝鱗片蚧 (Ben-Dov, 1993:203; Tang 1991:127; Tao, 1999:61)

Lecanium expansum Green, 1896, 4:9.
Lecanium (Paralecanium) expansum, Cockerell et Parr. 1899:227.
Paralecanium expansum Fernald, 1093:199.

寄 主：荔枝、楊梅、黃檀、楨楠、榕樹。

分 佈：臺灣；日本、菲律賓、新加坡、爪哇、印度、斯里蘭卡、澳洲。

995. **Paralecanium milleti** Takahashi 扁圓鱗片蚧 (Ben-Dov, 1993:206; Tang 1991:131; Tao, 1999:62)

Paralecanium milleti Takahashi, 1939, 29:114.

寄 主：釋迦、檬果、可可椰子、榕樹等。

分 佈：臺灣；馬來半島。

996. **Parasaissetia nigra** (Nietner) 烏黑副蓋蚧 (Ben-Dov, 1993:209; Lu et Wu, 1991:101-106; Luo et Jin, 1997:71; Luo et Li, 1998:83; Tang 1990:186; Tao, 1999:62; Wu, 1994: 577)

Lecanium nigrum Nietner, 1861:9.
=*Lecanium depressum* Targioni-Tozzet, 1867:29.
=*Lecanium depressum simulans* Douglas, 1887:28.
=*Lecanium begoniae* Douglas, 1892:209.
=*Lecanium caudatum* Green, 1896:10.
=*Lecanium nigrum depressum*, Cockerell, 1896:332.
=*Lecanium nigrum bengoniae* Cockerell, 1896:332.
=*Lecanium (Saissetia) sideroxylum* Kuwana, 1909:162.
=*Lecanium (Saissetia) pseudonigrum* Kuwana, 1909:162.
=*Saissetia cuneiformis* Leonarti, 1913:33.
=*Lecanium signatum* Newtead, 1917:363.
=*Saissetia persicae* Brain, 1920:11.
=*Lecanium nigrum nitidum* Newetead, 1920:191.
=*Lecanium crassum* Green, 1930:287.
Parasaissetia nigra, Takahashi, 1955:26

別 名：*黑軟蚧、香蕉黑蓋蚧、香蕉黑蠟蚧、咖啡烏蚧、橡膠蓋蚧、黑網紋蠟蚧、烏蓋蚧*。.

寄 主：多達 36 科 160 種，有蘋果、梨、番石榴、蒲桃、菠蘿蜜、人心果、無花果、大番荔枝、香蕉、椰子、桑、咖啡、茶、棕櫚、駁骨丹(*Gendarussa vulgaris*)、榕樹、丁香、茄苳(重陽木)、錦帶花(*Diervilla florida* Sied. Et Succ.)、梔子(*Gardenia jasminoides* Ellis)、夾竹桃(*Nerium indicum* Mill)、楊樹(*Populus* spp.)等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南、華南、內蒙古；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、以色列、埃及、剛果、西班牙、澳洲、美國、秘魯，全球亞熱帶、熱帶，冷地可在溫室中危害。

天 敵：*Cryptolaemus montrouzieri* 隱唇瓢蟲
Hoplothrips sp. 薊馬
Chrysoperla carnea carnea (Stephen) 中華草蛉

Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)
Coccophagus japonicus 日本軟蚧矮小蜂
Tetrastichus purpureus 膠蚧紅眼嚙小蜂
Aneristus ceroplastae 蠟蚧斑翅矮小蜂
Encyrtus sp. 跳小蜂
Metaphycus pulvinariae 綿蚧闊柄跳小蜂
Fusarium proliferutum var *minus*

997. **Parthenolecanium corni** (Bouché) 褐盔蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:352; Ai, 1998(4):24; Beijing FC., 1980[ed.] 197; Ben-Dov, 1993:214; Guo, 2000(1):18; Huang, 1990[ed.] 2:178-179; Hun., 1992:187; NZWDI, 1981:1751; Pan, 1995(1):49; Sang et Wang, 1996(3):26; Tang 1990:189; Tao, 1999:62; Wang et Zhang, 1992:158; Wang et al., 1993(4):43; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhao, 1993:160)

=*Coccus coryli* Linnaeus, 1758: partim.
=Coccus xylostei Schr. 1801:
Lecanium corni Bouché, 1844:298.
=*Lecanium vini* Bouché, 1851:112.
=*Coccus tiliae* Fitch, 1851:69.
=*Lecanium cerasifex* Fitch, 1856:
=*Lecanium ribis* Fitch, 1857:427.
=*Lecanium cynosbati* Fitch, 1857:436
=*Lecanium juglandifex* Fitch, 1856:463.
=*Lecanium corylifex* Fitch, 1857:473.
=*Coccus rosarum* Snellen van Volenhoven, 1862:94.
=*Lecanium fitchii* Signoret, 1874:404.
=*Lecanium fuscus* Signoret, 1873:
=*Lecanium rugosum* Signoret, 1874:429.
=*Lecanium tarsalis* Signoret, 1874:430.
=*Lecanium wistariae* Signoret, 1874:433
=*Lecanium robiniarum* Douglas, 1890:318.
=*Lecanium armeniacum* Craw, 1891:12.
=*Lecanium assimile* Newstead, 1892:141.
=*Lecanium robiniae* Towns, 1892:
=*Lecanium canadense* Cockerell, 1895:253.
=*Lecanium caryae canadense* Cockerell, 1895:
=*Lecanium lintneri* Cockerell et Bennett, in Cockerell, 1895:381.
=*Lecanium websteri* King, 1895:
=*Lecanium* (*Eulecanium*) *caryarum* Cockerell, 1898:293.
=*Ledqnium* (*Eulecanium*) *macluraruм* Cockerell, 1898:294.
=*Lecanium* (*Eulecanium*) *kingii* Cockerell, 1898:322.
=*Lecanium crawii* Ehrhorn, 1898:245.
=*Lecanium maclurae* Hunter, 1899:67. [Homonym of *Lecanium maclurae* Fitch].
=*Lecanium kansasense* Hunter, 1899:69.
=*Lecanium* (*Eulecanium*) *aurantiacum* Hunter, 1900:107. [Replacement name for *Lecanium maclurae* Hunter].
=*Lecanium rehi* King, in King et Reh, 1901:61.
=*Lecanium websteri* King, 1901:106.
=*Eulecanium guiguardi* King, 1901:334.
=*Eulecanium rosae* King, 1901:336.
=*Lecanium adenostonae* Kuwana, 1901:402.
=*Eulecanium fraxini* King, 1902:158.
=*Lecanium folsomi* King, 1903:193.
=*Lecanium obturum* Thro, 1903:212.
=*Lecanium corni robiniarum* Marchal, 1908:278.
=*Parthenolecanium cerasi* Osinov, 1914:
=*Lecanium persicae* crudum Green, 1917:202.
=*Palaeolecanium piri* Lindinger, 1932:

=*Eulecanium knechteli* Savescu, 1943:
=*Eulecanium savulescui* Savescu, 1943:
=*Eulecanium mori* Savescu, 1943:
=*Eulecanium sojae* Savescu, 1944:
Parthenolecanium corni, Borchsenius, 1957:356,
=*Parthenolecanium orientalis* Borchsenius, 1957:
=*Eulecanium apuliae* Nuzzaci, 1969:

別 名：*東方盔蚧*，*槐枝堅蚧*，*竹木堅蚧*，*堅蚧*，*扁平球堅蚧*，*糖槭蚧*。

寄 主：李、蘋果、桃、杏、梨、沙果、山楂、柿、葡萄、核桃、茶藨子、榛、洋槐、紫穗槐、刺槐、糖槭、水曲柳、核桃楸、榆、忽布、錦雞兒、木蘭、柳、楊、鐵線蓮、懸鈴木等，其中葡萄、桃、刺槐受害較重。

分 佈：江西、四川、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、山東、河南、陝西、山西、河北、青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯、加拿大、美國、伊朗、北非。

天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲
Blastothrix sericae (Dalman) 球蚧花角跳小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂
蟻

998. **Parthenolecanium orientalis** Borchsenius 東方灰蚧 (Ben-Dov, 1993:221; Borchsenius, 1960:215; Chen et Wang, 1987:183; Tao, 1999:63)
=*Platysaisstia armata* (Takahashi, 1930:
=*Parthenolecanium corni* ssp. *orientalis* Borchsenius, 1957, 66:369.
Parthenolecanium orientalis Borchsenius, 1960:215.

寄 主：桃、杏、李、蘋果、葡萄、柿、酸棗、刺槐、洋槐、紫藤、柳。

分 佈：華東、東北；朝鮮、西伯利亞。

天 敵：*Blastothrix sericae* (Dalman) 球蚧花角跳小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

999. **Parthenolecanium persicae** (Fabricius) 桃盔蠟蚧 (AS:21, 1986, 1:352; Ben-Dov, 1993:221; Hun., 1992:187; Tang 1990:194; Yunn., 1987:490)
Lecanium persicae Fabricius, 1776, 4:1.
Chermes persicae Fabricius, 1776:304.
=*Coccus persicorum* Sulzer, 1776:112.
=*Coccus costatus* Schrank, 1781:589.
=*Chermes clematidis* Gmelin, 1790:2220.
=*Coccus herberidis* Schrank, 1801:146.
=*Lecanium roaarum* Snell, 1862:
=*Lecanium cymbiformis* Targioni-Tozzetti, 1868:730. [Unjustified replacement name]
=*Lecanium persicochilense* Targioni-Tozzetti, 1868:731. [Unjustified replacement name].
=*Lecanium elongatum* Signoret, 1874:404.
=*Lecanium genistae* Signoret, 1874:405.
=*Lecanium mori* Signoret, 1874:407.
=*Lecanium sarothamni* Douglas, 1891:65.
=*Coccus bubaustrale* Cockerell, 1898:
=*Lecanium magnoliarum* Cockerell, 1898:145.
=*Lecanium subaustrale* Cockerell, 1898:
=*Coccus magnoliarum hortensiae* Cockerell, 1903:19.
=*Lecanium frontale* Green, 1904:
=*Lecanium glandi* Kuwana, 1907:67.
=*Lecanium cecconii* Leonardi, 1908:178.
=*Coccus celticum* Kuwana, 1909:
=*Lecanium acaciae* Newstead, 1917:

Parthenolecanium persicae, Lindinger, 1935:
=*Lecanium spinosum* Brittin, 1940:
=*Eulecanium mori* Savescu, 1943:
=*Lecanium persicae goidanichi* Kawecki, 1962:17.
=*Parthenolecanium thymi* Danzig, 1967:152.
寄 主：桃、梅、葡萄、柑橘、桑、虎刺等。
分 佈：雲南、廣東、湖北、浙江、山東、山西、河北、朝鮮、日本、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、歐洲、蘇聯、美國、南美、澳洲、新西蘭。
天 敵：*Coccophagus lycimnia* (Walker) 賴食蚧矮小蜂

1000. **Platysaissetia armata** (Takahashi) 香果臺蠟蚧 (Ben-Dov, 1993:326; Tao, 1999:63)
Saissetia armata Takahashi, 1930:33.
Taiwansaissetia armata, Tao et Wong, 1983:77.
Platysaissetia armata, Tang, 1991:206.
寄 主：香果、饅頭果。
分 佈：臺灣。

1001. **Protopulvinaria mangiferae** (Green) 三角擬綿蠟蚧 (Chang et al., 1982:100; Wang et Zhang, 1992:158; 1992:406)
Coccus mangiferae (Green)
Protopulvinaria mangiferae (Green, 1889:)
別 名：*橡果圓蚧*。
寄 主：柑橘、橡果、山茶、膠木、木沙木利、錫蘭杜英等。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、四川、浙江；東南亞。

1002. **Protopulvinaria pyriformis** (Cockerell) 梨形原綿蚧 (Ben-Dov, 1993:243; Tang 1990: 249; Tao, 1999:64)
Pulvinaria (*Protopulvinaria*) *pyriformis* Cockerell, 1894, 1:309.
=*Pulvinaria newsteadi* Leonard, 1898:279.
=*Pulvinaria plana* Lindinger, 1911:34.
Protopulvinaria pyriformis, Lindinger, 1912:
=*Protopulvinaria agalmae* Takahashi, 1933:39.
寄 主：柑橘、酪梨、番石榴、杜英、羊蹄甲、鴨母樹、山香圓、梔子、常春藤、絡石等。
分 佈：臺灣、香港；日本、越南、模里西斯、科摩羅群島、南非、以色列、西班牙、美國、中南美洲。
天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

1003. **Pseudopulvinaria sikkimensis** Atkinson 錫金假綿蚧 (Ben-Dov, 1993:247; Tang 1990:18; Tao, 1999:64)
Pseudopulvinaria sikimensis Atkinson, 1889, 58:4.
=*Lefroyia castaneae* Green, 1900:21.
=*Crescoccus candidus* Wang, 1982:
寄 主：櫟、栗。
分 佈：雲南；印度、錫金。

1004. **Pulvinaria borchsenii** Danzig 鮑氏綿蚧 (Ben-Dov, 1993:252; Tang 1990:256)
Pulvinaria borchsenii Danzig, 1967:148.
寄 主：山楸、鬼木(*Aralia mandshurica*)、柳葉繡線菊、珍珠梅、柳樹、楊、桤木(*Alnus hirsuta*)、樺樹、衛矛等。
分 佈：蘇聯遠東沿海、庫頁島。

1005. **Pulvinaria citricola** Kuwana 橘綿蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:348; Ben-Dov, 1993:254; Tang 1990:234; Tao, 1999:64; Yum., 1987:492; Zhang, 1987[ed.] 1:69; Zhou, 1993(2):46)

Pulvinaria citricola Kuwana, 1914:3.

=*Pulvinaria nipponica* Lindinger, 1933:50. [Unjustified replacement name].

別 名：*惡性綿蚧*。

寄 主：柑橘、柿、茶、繡球花、錦葵、木槿。

分 佈：雲南、西藏、四川；日本、美國。

天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)

1006. **Pulvinaria floccifera** (Westwood) 綠綿蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:348; Ben-Dov, 1993:261; Chao, 1982:96; Hun., 1992:184; Tang 1990:228; Wang et Zhang, 1992:158; Zhang, 1987[ed.] 1:68; Zhou, 1993(2):46)

Coccus floccifera Westwood, 1870:308.

=*Pulvinaria camelicola* Signoret, 1873:32.

=*Pulvinaria linearis* Targioni-Tozzetti, 1884:398.

=*Pulvinaria brassiae* Cockerell, 1895:135.

=*Pulvinaria floccosa* (Westwood), Newstead 1900:26. [Mis-spelling].

=*Pulvinaria theae* Froggatt, 1915:418.

=*Pulvinaria cesti* Lindinger, 1932:181.

Chloropulvinaria flaccifera, Borchsenius, 1952

別 名：*茶綿蚧*，*茶長綿蚧*。：

寄 主：柑橘、柚、橙、金橘、茶、油茶、樟、冬青、衛茅、紫杉、月桂、櫻、煙草、連翹、榕樹、柳杉等。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、遼寧；亞洲(東部)、越南、日本、蘇聯、印度、中東、非洲、歐洲、大洋洲、澳洲、美國。

天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂

Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)

1007. **Pulvinaria kuwacola** Kuwana 桑綿蚧 (Ben-Dov, 1993:268; Tao, 1999:64)

Pulvinaria kuwacola Kuwana, 1907, 1:188.

寄 主：桑等。

分 佈：陝西、山西、河北；日本。

天 敵：*Anicetus annulatus* Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂

Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂(賽黃盾食蚧矮小蜂)

1008. **Pulvinaria minuscula** Danjig 山楂綿蚧 (Cao et Peng, 1993:24)

寄 主：山楂。

分 佈：山西。

1009. **Pulvinaria okitsuensis** (Kuwana) 日本綠綿蚧 (Ben-Dov, 1993:273; Tang 1990: 229)

Pulvinaria okitsuensis Kuwana, 1914:5.

Chloropulvinaria okitsuensis, Borchsenius, 1957:

寄 主：柑橘、枳殼、茶、茶花、柃木。

分 佈：浙江；日本。

天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂

Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂
Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂

1010. **Pulvinaria torreyae** (Takahashi) 榧杉綠綿蚧 (Ben-Dov, 1993:285; Tang 1990:232)
Pulvinaria torreyae Takahashi 1955:152. [Nomen Nudum].
=*Chloropulvinaria torreyae*, Takahashi, 1955:149.
Pulvinaria torreyae Takahashi, 1956:29.
寄 主：榧樹(*Torreya nucifera*)、粗榧(*Cephalotaxus* sp.)、紫杉(*Taxus cuspi-data*)。
分 佈：朝鮮、日本。

1011. **Pulvinaria vitis** (Linnaeus) 葡萄綿蚧 (Ben-Dov, 1993:288; Tang 1990:254; Tao, 1999:65)
Coccus vitis Linnaeus, 1758:456.
=*Coccus betulae* Linnaeus, 1758:455.
=*Coccus carpini* Linnaeus, 1758:455.
=*Coccus oxyacanthae* Linnaeus, 1758:456.
=*Coccus crataegi* Linnaeus, 1766:742. [Unjustified replacement name to *Coccus oxyacanthae*].
=*Calypticus spumosus* Costa, 1829:10.
=*Coccus salicis* Fitch, 1851:69.
=*Lecanium maclurae* Fitch, 1855:38.
=*Lecanium americanum* Targioni-Tozzetti, 1868:731. [Unjustified replacement name to *Coccus salicis* Fitch].
=*Pulvinaria populi* Signoret, 1873:42.
=*Pulvinaria ribesiae* Signoret, 1873:43.
=*Pulvinaria betulae alni* Douglas, 1891:100.
=*Pulvinaria innumerabilis tiliae* King et Cockerell, 1898:286.
=*Pulvinaria huteri* King, 1901:144.
別 名：*樺樹綿蚧*。
[Cottony Grape Scale, Cottony Vine Scale]
寄 主：薔薇科的山楂、蘋果、梨屬、梅屬、花楸，繡線菊、薔薇屬、葡萄、樺木科的樺樹、杞木、樺櫟等。
分 佈：新疆；蒙古、日本、蘇聯遠東、庫頁島、中亞、歐洲、北美、巴西、新西蘭。
天 敵：*Coccophagus lycimnia* (Walker) 賴食蚧矮小蜂

1012. **Rhodococcus sariuoni** Borchsenius 蘋果球蚧 (ASZI, 1986, 1:352; Ben-Dov, 1993:299; Borchsenius, 1960: 216; Gao, 1993(2):49; Huang, 1990[ed.] 2:147-149; Tang 1979:135-136; 1991: 212; Tang et Li 1988: 98; Tao, 1999:65)
Rhodococcus sariuoni Borchsenius 1955:302.
別 名：*西府球螺蚧*、*沙里院褐球蚧*。
寄 主：蘋果、梨、桃、西府海棠、櫻屬、繡線菊屬等植物。
分 佈：河南、山東、山西、河北、內蒙古、新疆、遼寧；朝鮮。
天 敵：*Chilocorus rubidus* Hope 黑緣紅瓢蟲

1013. **Rhodococcus turanicum** (Archangelskaya) 吐倫褐球蚧 (Ben-Dov, 1993:300; Tang 1991:214; Tao, 1999:65)
Lecanium coryli var. *turanicum* Archangelskaya, 1937:47.
Rhodococcus turanicus Borchsenius 1957:425.
寄 主：薔薇科、鼠李科、虎耳草科、樺木科、胡桃科、榆科等 17 科植物上，特別危害果樹：蘋果、梨、杏、桃、胡枝子。
分 佈：新疆；阿富汗、中亞、蘇聯。

1014. **Saissetia citricola** (Kuwana) 柑橘黑蠟蚧 (Ben-Dov, 1993:304; Tang 1990:216; Tao, 1999:66)
Takahashia citricola Kuwana 1909:153.

=*Pulvinaria marginata* Ferris 1950:74.
Saissetia citricola, Takahashi, 1955:26.
寄 主：柑橘、柿等。
分 佈：雲南、河北；日本。
天 敵：*Coccophagus hawaiiensis* Timberlake　夏威夷食蚧矮小蜂

1015. **Saissetia coffeae** (Walker) 咖啡黑盔蚧 (ASZI, 1986, 1:349; Ben-Dov, 1993:304; Chen, 1981:48; Chiu et al., 1985:1-8; Hun., 1992:187; Tang 1990:217; Tao, 1999:66; Wang et Zhang, 1992:159; Yunn., 1987:492; Zhang, 1987[ed.] 1:70)
Lecanium coffeae Walker, 1852:1079.
=*Lecanium hemispherica* Targioni-Tozzetti, 1867:26.
=*Chermes cycadis* Boisdival, 1867:323.
=*Chermes anthurii* Boisduval, 1867:328.
=*Chermes filicum* Boisduval, 1867:335.
=*Chermes hibernaculorum* Boisduval, 1867:337.
=*Chermes angraeci* Boisduval, 1867:337.
=*Lecanium beaumontiae* Douglas, 1887:95.
=*Lecanium clypeatum* Douglas, 1888:59.
Saissetia coffeae (Walker); Williams, 1957:314.
別 名：*咖啡硬介殼蟲*，*網珠蠟蚧*，*盔形半球蚧*，*盔蠟蚧*，*半球蚧*，*桃丘形蚧*。[Hemispherical scale]
寄 主：危害植物達 15 科 30 多種，包括釋迦、百香果、番石榴、蓮霧、蒲桃、蓮果蒲桃、柑橘、橙、柚、檸檬、山黃皮、荔枝、欖果、毛柿、星蘋果、人心果、酪梨、咖啡、茶、蘇鐵茶、山茶、鐵線蕨、蘇鐵、杉木、楠木、福木、茄苳、雀榕、檀香、山漆、百兩金、棱果紫金牛、桂花、納塔爾梅子、緬梔、山馬茶、奎寧樹、淡紫薇、仙丹花、九芎木、根蘭、臺灣風蘭、秋海棠、黃梔花、棕櫚、南瓜等。
分 佈：廣佈全球，生活于暖地室外，冷地室內；包括臺灣、福建、江西、浙江、江西、廣東、廣西、雲南、四川、內蒙古；朝鮮、日本、琉球、菲律賓、越南、柬埔寨、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、南太平洋諸島嶼、夏威夷、澳洲、紐西蘭、塞昔耳群島、留尼旺島、模里西斯、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、蘇聯(溫室植物)、美國、中南美洲、。
天 敵：*Anysis saissetia* Ashmead　蚧黑褐金小蜂
Anicetus annulatus Timberlake　軟蚧扁角跳小蜂
Coccophagus ceroplastae (Howard)　斑翅食蚧矮小蜂(蠟蚧斑翅矮小蜂)
Coccophagus lycimnia (Walker)　賴食蚧矮小蜂

1016. **Saissetia oleae** (Olivier) 欖珠蠟蚧 (ASZI, 1986, 1:350; Ben-Dov, 1993:313; Chang et al., 1982:100; Chao, 1982:97; Huang, 1990[ed.] 2:301; Hun., 1992:188; Tang 1990:220; Tang & Li 1988:87; Tao, 1999:66; Wang, 1987[ed.]:208-209; Yunn., 1987:491; Zhou, 1993(2):46)
Coccus oleae Olivier, 1791:95.
=*Coccus palmae* Howorth, 1812:307.
=*Coccus testudo* Curtis, 1843:443.
=*Lecanium cassiniae* Maskell, 1890:15.
別 名：*橄欖蚧*，*橄欖盔蚧*，*砂皮半蠟蚧*，*砂皮球蚧*，*砂皮半球蚧*，*雙脊硬蚧*。
寄 主：柑橘、番橄欖、蘋果、荔枝、龍眼、檬果、葡萄、番石榴、無花果、咖啡、茶、薔薇、棉、木豆、麻、桉樹、榕、樸等。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、內蒙古；日本、菲律賓、越南、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、太平洋諸島嶼、模里西斯、科摩羅群島、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、蘇聯、美國、夏威夷。
天 敵：*Chilochorus bipustulatus*　雙斑唇瓢蟲

Schiellista cyanea 長盾金小蜂
Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂
Autoba scitula 紫柳白蟲

1017. **Sphaerolecanium prunastri** (Fonscolombe) 杏樹梨球蚧 (Ben-Dov, 1993:322; Chen et Wang, 1987:155; Sun, 1984:378-379; Tang, 1990:142; Tao, 1999:66; Wang et al., 1993(1):44)
Coccus prunastri Fonscolombe, 1834:211.
=*Lecanium blanchardi* Targioni-Tozzetti, 1868:731. [Unjustified replacement name].
=*Lecanium rotondum* Signoret, 1873:428.
Sphaerolecanium prunastri, Sulc, 1908:36.
=*Eulecanium piligerum* Leonardi, 1917:195.
別 名：*杏球壁蚧*。
寄 主：危害薔薇科核果類果樹，如桃屬(*Persica*)、李屬(*Prunus*)、杏屬(*Armeniaca*)、櫻屬(*Cerasus*)、扁桃屬(*Amygdalus*)等。
分 佈：河南、陝西、甘肅、河北；日本、中亞、北非、歐洲、蘇聯、美國。
天 敵：*Coccophagus lycimnia* (Walker) 賴食蚧矮小蜂

1918. **Takahashia japonica** (Cockerell) 日本紐綿蚧 (Ben-Dov, 1993:326; Chao, 1982:97; Suzhou CS., 1985:247; Tang 1990: 292; Tao, 1999:66; Wang et al., 2000(1):30; Zhang, 1987ed.(1):66; Zheng, 1982:247; Zhou, 1993(2):46)
Pulvinaria (*Takahashia*) *japonica* Cockerell, 1896:20.
Takahashia japonica, Kuwana, 1902:61.
=*Takahashia wuchangensis* Tseng, 1947:21.
別 名：*白環蚧*、*桑紐綿蚧*、*桑紐蚧*、*紐綿蚧*。
寄 主：柑橘、李、核桃、楊梅、桑、茄芝、槐、合歡、楓香、菊等。
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南；朝鮮、日本。
天 敵：*Encyrtus sasakii* Ishii 刷盾短緣跳小蜂
Pseudaphycus malinus Gahan 粉蚧玉棒跳小蜂

1019. **Vinsonia stellifera** (Westwood) 七角星蠟蚧 (Ben-Dov, 1993:338; Tang 1990:311; Tao, 1999:67)
Coccus stelliferus Westwood, 1871:3.
=*Vinsonia pulchella* Signoret, 1872:34.
Vinsonia stelliferus, Signoret, 1877:608.
寄 主：柑橘、檬果、柿、梔子。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓、馬來半島、蘇門答臘、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、小尼西亞群島、非洲、中南美，廣佈于熱帶、亞熱帶，在遠東及歐洲溫室內也有記錄。

Diaspididae 盾蚧科
(Chou, 1982, 1:195; 1985, 2:197-431; 1986, 3:435-771; Tao, 1999:67-122; Zhang et al., 1996(2):22; Zhou, 1993(2):46)

1020. **Abgrallaspis cyanophylli** (Signoret) 茶銹盾蚧 (Chou, 1985, 2:306; ASZI 1986, 1:295; He et al., 1991:58-60; Hun., 1992:188; Li et Liao, 1990:68-70; Tao, 1999:67; Yunn., 1987:473)
Aspidiotus cyanophylli Signoret, 1896:119.
Abgrallaspis cyanophylli (Signoret); Balachowsky, 1948:
別 名：*黃尖盾蚧*、*灰翹圓盾蚧*、*茶長本圓蚧*。
寄 主：柑橘、番石榴、無花果、木菠蘿、枇杷、檬果、釋迦、酪梨、可可、番櫻桃、朱蕉、芭蕉、木瓜、可可椰子、海棗、茶、山茶、桂花、樟樹、棕、土當歸、瓶本、桉、甘薯、水龍骨、愈瘡木、茄、木薯、大戟、葉下珠、角豆樹、紫藤、黃楊、六道木、Haronga、杜棟、蓮葉桐、朴、紫藤、六道木、

木蘭、九重葛、樅木、杜鵑、素馨、女貞、夾竹桃、雞蛋花、山梅花、炮仗竹、奎寧樹、*Cyanophyllum*、仙人掌、仙影拳、銀毛球、*Astrophyllum*、姜花、柏寄生、藜、Anthrophy-llum、薯蕷、蘆筍、菠蘿、安祖花、Mondo、龍香蘭、鶴望蘭、Howea、肯特棕、散尾葵、*Pritchardia*、甘蔗、水塔花、露兜樹、蘇鐵、木蘇鐵。

分 佈：臺灣、福建、廣東、浙江，華南各省區、北方溫室內；日本、印尼、新幾內亞、印度、斯里蘭卡、中東、馬達加斯加、非洲、英國、歐洲、蘇聯、中美洲、南美洲、大洋洲、夏威夷。

1021. **Abgrallaspis degeneratus** (Leonardi) 山茶鈹盾蚧 (Chou, 1985, 2:308; Tao, 1999:68)

Chrysomphalus degeneratus Leonardi 1896:345.
Abgrallaspis degeneratus Balachowsky, 1948:

寄 主：柑橘、茶、山茶、素馨、木犀、冬青、樅木。

分 佈：浙江、江蘇；朝鮮、日本、蘇聯、意大利、希臘、美國。

1022. **Abgrallaspis palmae** (Cockerell) 長棘盾蚧 (ASZI, 1986, 1:296, Chou, 1985, 2:308; Tao, 1999:68)

Aspidiotus rapax var. *palmae* Cockerell, 1892:5.
=*Aspidiotus unguiculatus* Leonardi, 1914:199.
=*Gonaspidiotus ungulatus* MacGillivray, 1921:432.
=*Aspidiotus javanensis* Kuwana et Matsumura, 1931:
=*Aspidiotus javanensis* Kuwana, 1943:654, 658.

別 名：*棕鈹盾蚧*。

寄 主：柑橘、欖果、木瓜、香蕉、椰子、可可、咖啡、木菠蘿、無花果、酪梨、龍鳳梨、海棗、油椰、古柯、木薯、槍彈木、馬錢子、愈瘡木、花葉蘭、水塔花、蘇鐵、*Stanhope*、*Karatus*、*Aechmea*。

分 佈：廣東、雲南、山東；日本、新加坡、印尼、非洲、歐洲、蘇聯、美國、西印度、巴拿馬、圭亞那、特立尼特。

1023. **Andaspis citricola** Young & Hu 柚安盾蚧 (Young & Hu, 1981:216; Tao, 1999:69)

Andaspis citricola Young et Hu, 1981:216.

寄 主：柚葉。

分 佈：雲南。

1024. **Andaspis crawii** (Cockerell) 錐栗安蠟蚧 (Chou, 1982, 1:190; Tao, 1999:69)

Mytilaspis crawii Cockerell, 1896:21.
=*Mytilaspis crawii* var. *canaliculata* Maskell, 1897:304.
=*Lepidosaphes canaliculata* MacGillivray, 1921:280.
Andaspis crawii, Rao, 1952:

寄 主：錐栗、櫟、淋漓柯、米櫧、木半夏、翻白葉樹。

分 佈：臺灣；日本、印尼。

1025. **Andaspis hawaiiensis** (Maskell) 夏威夷安蠟蚧 (Chou, 1982, 1:189; Tao, 1999:69)

Mytilaspis flava var. *hawaiiensis* Maskell, 1895:47.
=*Mytilaspis fomorum* var. *hawaiiensis* Leonardi, 1904:64.
=*Lepidosaphes moorsi* Doane et Ferris, 1916:401.
Andaspis hawaiiensis MacGillivray, 1921:94.

寄 主：柑橘、梨、桃、安石榴、栗、蒲桃、合歡、金合歡、紅豆、茄、紫薇、素馨、罌子桐、金虎尾、繡球花、含羞草、指甲花、槍彈木、臘醋、好望角美樹、*Seafordia*。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、山東；日本、印度、斯里蘭卡、非洲、美國、中美洲、大洋洲、夏威夷。

1026. **Andaspis micropori** Borchsenius 荔枝安盾蚧 (ASZL 1986, 1:286; Chou, 1982,1:191; Tao, 1999:70)

Andaspis micropori Borchsenius, 1958:173.

寄 主：荔枝。

分 佈：廣東；日本。

1027. **Andaspis mori** Ferris 桑安盾蚧 (Chou, 1982, 1:192; Tao, 1999:70)

Andaspis mori Ferris, 1952, 17:21, 22.

寄 主：桑，枸樹、黃連木(枝幹上)、櫟等。

分 佈：臺灣、福建、雲南。

1028. **Andaspis yunnanensis** Ferris 雲南安盾蚧 (Chou, 1982, 1:192; Tao, 1999:70)

Anadaspis yunnanensis Ferris, 1953:59.

寄 主：李(枝條上)。

分 佈：雲南。

1029. **Aonidiella aurantii** (Maskell) 橘紅腎盾蚧 (ASZL 1986, 1:286; Cai, 1995(4):36-37; Chang, 1987:40; Chao, 1982:97; Chou, 1985, 2:292; He et al., 1991:58-60; Huang et Gao, 1996:153; Hun., 1992:189; Li et Liao, 1990:68-70; Lu, 1989:207-217; Lu, 1989:218-223; Su, 1983:253-259; Tang et Lin 1989:125; Tao, 1999:71; Wu, 1994:593; Xie et Ren, 1994(1):4-6; Zhang, 1987[ed.] 1:70)

Aspidiotus aurantii Maskell, 1879:199.

=*Aspidiotus citri* Comstock, 1881:8.

=*Aspidiotus coccineus* Gennadius, 1881:189.

=*Aonidia gennadii* Targioni-Tozzetti, 1884:151, 153.

Aonidiella aurantii, Berlese, 1896:

=*Chrysomphalus citri* Lindinger, 1935:132.

=*Chrysomphalus coccineus* Lindinger, 1949:

别 名：*紅圓蚧，紅圓蹄盾蚧，紅腎圓盾蚧，橘紅圓腎盾蚧，加州圓蚧。*

[California red scale]

寄 主：柑橘、枸橘、墨西哥橘、檸檬、油橄欖、橡果、香蕉、椰子、無花果、蘋果、梨、桃、梅、李、山楂、蠟梨、木菠蘿、柿、葡萄、桑、核桃、木瓜、番櫻桃、栗、懸鉤子、胡頹子、酪梨、山核桃、松、銀杏、蘋婆、香蕉、朱蕉、枸子、奈爾李、木梅、茶、山茶、漆樹、油桐、蓖麻、苘麻、甘薯、辣椒、茄、蘆筍、葵迷、棱骨木、忍冬、梓、夜香樹、夾竹桃、雞蛋花、尖葉木、木犀、丁香、連翹、楮、素馨、女貞、金葉樹、山茱萸、杜鵑花、桃葉珊瑚、常春藤、絲木、按木、紅千層、白千層、紅膠木、檉柳、鼠李、衛矛、冬青、肖乳香、黃連木、黃楊、楝、香椿、葉下珠、紫藤、好望角樹、想思樹、羊蹄甲、山扁豆、角豆樹、刺桐、染料木、皂莢、一葉豆、毒豆、黃蝴蝶花、洋槐、槐樁、玫瑰、繡線菊、石斑木、懸鈴木、海桐花、樟、月桂、洋臘梅、木蘭、鵝掌楸、小蘗、銀樺、哈克木、榆、櫟、榛、杞木、楊、木麻黃、棕、金鍾柏、柳杉、落羽杉、南美杉、土三七、大麗花、金盞花黃錦帶、寒丁子、苦楹藍、黃鍾花、藍花楹、比格諾藤、婆婆納、釣鍾柳、賽亞麻、鼠尾草、藍花藤、假連翹、海州常山、福祿考、長春花、仙客來、紫金牛、倒挂金鍾、仙人掌、荊柊、蜀葵、多貝牙、解寶葉、鐵松、爬山虎、白欽、大戟、田青、鳳仙花、鐵線蓮、芍藥、商陸、九重葛、杓蘭、竹竽、望鶴蘭、蕨尾、肖蕨尾、君子蘭、龍舌蘭、蘆薈、鈴蘭、龍血樹、沿階草、絲蘭、假葉樹、新西蘭麻、莎草、露兜、虹豆、蘇鐵、柳、桂花、海棗、棕櫚、

Caprosma, *Jaco-bina*, *Libonia*, *Mackeya*, 十萬錯(*Asystasia*), *Benthamia*, *Toxicophlaca*, *Tubemantana*, *Greyia*, *Poinsettia*, 鶴鶉(*Trichilia*), *Exebergia*, *Pataero-xylon*, *Kennedya*, *Castenospermum*, *Trichocladus*, *Doryanthus*, *Elionurus*.

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、河北、遼寧；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、中東、歐洲、非洲、馬達加斯加、大洋洲、夏威夷、美國、中美洲、南美洲。

附 註：本種多數國家列爲檢疫對象，爲柑橘等熱帶果樹的危險性害蟲。

天 敵：*Comperiella bifasciata* Howard 雙帶巨角跳小蜂

Thomsonisca typica

Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂(蠟蚧矮小蜂)

Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂

Aphytis proclia (Walker) 桑盾蚧黃矮小蜂

Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

Encarsia elongata (Dozier) 長恩矮小蜂

Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛長纓恩矮小蜂

Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂

Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

Pteroptrix smithi (Compere) 斯氏四節矮小蜂

1030. **Aonidiella citrina** (Coquillett) 橘黃腎圓蚧 (ASZI, 1986, 1:285; Chang, 1973:36; Chao, 1982:97; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chiu et al., 1985:1-8; Chou, 1985, 2:295; Huang et Gao, 1996:154; Hun., 1992:189, Ren et al., 1994(4):31; Tang & Li 1989: 127; Tang & Li 1989:127; Tong, 1995(2):40; Tao, 1999:71; Wang et Zhang, 1992:159; 1992:404; Wu, 1994:597; Xie et Ren, 1994(1):4-6; Zhang, 1987[ed.] 1:70; Zhang et al., 1996(1):38-39; Zhou et al., 1993(3):44-45)

Aspidiotus citrinus Coquillet, 1891:29.

=*Aspidiotus aurantii* var. *citirnus* Howard, 1894:228.

Aonidiella citrina, Nel, 1933:

別 名：*黃圓蚧*、*褐黃圓蚧*、*黃圓蹄盾蚧*、*黃腎圓盾*。

[Yellow scale]

寄 主：柑橘、蘋果、梨、無花果、油橄欖、番櫻桃、胡頹子、枸橘、酪梨、葡萄、可可椰子、山龍眼、齊墩果、茶、山茶、桂花、茉莉、月桂、薔薇、玫瑰、山桂花、扁葉蒲葵、木屏、樹杞、楊桐、女貞、素馨、菝葜、英蒾、桃葉珊瑚、桉樹、樅木、常春藤、衛矛、冬青、黃楊、石楠、十大功勞、龍舌蘭、蜘蛛抱蛋、棕櫚、羅漢松、日本黑松、*Arbutus*, *Leptospermum*, *Choisya* 等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、山西、河北、青海、內蒙古；日本、蘇聯、菲律賓、印度、南洋群島、加羅林群島、夏威夷、非洲、馬達加斯加、中東、澳洲、美國、中美洲、阿根廷。

附 註：本種多數國家列爲檢疫對象。

天 敵：*Comperiella bifasciata* Howard 雙帶巨角跳小蜂

Comperiella indica

Thomsonisca typica

Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂

Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂

Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂(盾蚧長纓矮小蜂)

Pteroptrix albocincta (Flanders) 淺三角片四節矮小蜂

Pteroptrix chinensis (Howard)　中華四節矮小蜂

1031. **Aonidiella inornata** MacKenzie 蘇鐵腎盾蚧 (Chou, 1985, 2:298; Lee et Wen, 1977:196-201; Pingung, AC., 1986:35; Tang et Li 1989:129; Tao, 1999:71; Tsai, 1970:144)
Chrysomphalus aurantii Robinson, 1917:24.
Aonidiella inormata MacKenzie, 1933:10, 29, 30.
別 名：*圓蚧*，*木瓜赤圓蚧*。
寄 主：檸果、柑橘、木瓜、椰子、檳榔、西谷椰子、朱蕉、龍血樹、胡椒、褐鱗木、夾竹桃、波志加草、*Campsosperma*, *Hedyotis*.
分 佈：臺灣、香港、海南、雲南、河北、內蒙古、遼寧；菲律賓、新幾內亞、關島、加羅林島、夏威夷、澳洲。

1032. **Aonidiella orientalis** (Newstead) 東方腎盾蚧 (Chou, 1985, 2:296; Huang, 1990[ed.] 2:382-384; NZWDI, 1981:1987; Tao, 1999:71)
Aspidiotus orientalis Newstead, 1894:26.
=*Aspidiotus osbeckiae* Green, 1896:4.
=*Aspidiotus* (*Chrysomphalus*) *pedronis* Green, 1905:341.
=*Aspidiotus* (*Aonidiella*) *taprobanus* Green, 1905:344.
=*Aspidiotus* (*Aonidiella*) *cocotiphagus* Marlatt, 1908:14.
=*Chrysomphalus pedroniformis* Cockerell et Robinson, 1915:107.
=*Aspidiotus orientalis cocotiphagus* Merrill et Chaffin, 1923:204.
Aonidiella orientalis McKenzie, 1937:327, 330.
別 名：*木瓜圓蚧*。
寄 主：木瓜、香蕉、椰子、檸果、柑橘、無花果、釋迦、棗、柿、番櫻桃、咖啡、茶、山茶、茄、甘藷、蓖麻、牛角瓜、檳榔青、棕櫚、楝、枸橘、印度枳、羊蹄甲、山扁豆、黃檀、羅槐子、玫瑰、木姜子、雞爪樹、檀香、金錦香(*Osbeckia*)、龍舌蘭、王棕(*Roystonea*)、羅漢松、蘇鐵、 *Myrrhinium*, *Weinmannia*.
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、河北；菲律賓、印度、斯里蘭卡、中東、南非、馬達加斯加、澳洲、美國、中美洲、巴西。
天 敵：*Chilocoris circumdatus* Gyll.　黑緣瓢蟲
Comperilla bifasciata Howard　雙帶跳小蜂
Aphytis sp.　黃矮小蜂

1033. **Aonidiella pini** Young 松片圓蚧 (Young, 1988:189; Tao, 1999:71)
Aonidiella pini Young, 1989, 8:189.
寄 主：濕地松(*Pinus elliottii* Engelm)、火炬松(*P. taeda* Linnaeus)。
分 佈：四川。

1034. **Aspidotus anningensis** Tang et Chu 安寧圓盾蚧 (Tang, 1983:18; Tao, 1999:73)
Aspidiotus anningensis Tang et Chu, 1983, 2:18.
=*Aspidiotus cryptomeriae* Ferris, 1953: (*nec* Kuwan, 1902).
寄 主：松。
分 佈：雲南。

1035. **Aspidiotus cryptomaeriae** Kuwama 柳杉圓蚧 (Chou, 1985, 2:267; Hun., 1992:189; Tao, 1999:73)
Aspidiotus cryptomeriae Kuwana, 1902, 3(3):69.
寄 主：榧、粗榧、馬尾松、黑松、雲南油松、檜柏、柳杉、冷杉、黃杉、雲杉、鐵杉、東北紅豆杉、檜扁柏、刺柏、日本花柏、柳。

分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、湖南、浙江、山東；朝鮮、庫頁島、日本、俄羅斯。

1036. **Aspitiotus destructor** Signoret 透明圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:287; Chang, 1973:35-36; 1987:40; Chao, 1982:102; Chen, 1975:447; Chu et al., 1985:1-8; Chou ,1985, 2:269; Luo, 1991:84; Luo et Li, 1998:21; Luo et al., 1996:55; Ma et al., 1995:118; Pingtung AC., 1986:64; Tao, 1999:73; Wu et Tao, 1976:141-155; Tsai, 1995:44; Wang et Zhang, 1992:159; Yunn., 1987:471; Zhang, 1985[ed.]:162-163; Zhang, 1987[ed,] 1:70; Wang et Zhang, 1992:404; Zhou et al., 1993:18-20;)

Aspidiotus destructor Signoret, 1869:120.
=*Aspidiotus transparens* Green, 1890:20.
=*Aspidiotus fallax* Cockerell, 1893:225.
=*Aspidiotus cocotis* Newstead, 1893:186.
=*Aspidiotus lataniae* Green, 1893:40, 49. (*nec* Signoret).
=*Aspidiotus stransparens* var. *simillimus* Cockerell, 1899:395.
=*Aspidiotus simillimus traslucens* Fernald, 1903:278.
=*Aspidiotus oppugnatus* Silvestri, 1915:258.
=*Aspidiotus destructor transparens* Green, 1915:44.
=*Aspidiotus translucens* Cockerell et Robinson, 1915:106.
=*Aspidiotus excisus* Arhangelskay, 1929:190. (nec Green).
=*Aspidiotus vastatrex* Leroy, *in* Ferris, 1941:49.
Temnaspidiotus destructor,Tang, 1993:

別 名：*椰圓蚧*，*黃薄輪心蚧*，*柳圓盾蚧*，*香蕉淡圓介殼蟲*，*淡圓蚧*。

[Coconut scale]

寄 主：香蕉、柑橘、柚、可可椰子、檳榔、象牙椰子、油椰、海棗、無花果、柿、釋迦、酪梨、梅、葡萄、橄果、棗、蒲桃、木瓜、番石榴、獼猴桃、咖啡、可可、腰果、番櫻桃、羅望子、黃椰子、海芋、胡椒、肉荳蔻、茶、山茶、姜、甘蔗、木薯、蓖麻、玉蘭、林投、九節木、烏桕、玉笑葛藤、白肉榕、日本女貞、梓、楸、戰捷木、冬青、枹木、榕樹、樟、月桂、朴、羊蹄甲、山扁豆、黃檀、桃花心木、木果楝、油桐、變葉木、三葉膠、衛矛、櫃如樹、棕櫚、紅殼果、紫薇、王芯、櫃如樹、雞蛋花、千金子藤、海欖雌(*Avicenia*)、薔香、大戟、天竺葵、艾麻草、桑寄生、蘇鐵、枇杷、*Sarcocephalus*, 杜英山、*Lophira*, *Wormia*, *Poinsettia*, 英樂豆、木姜子、*Chaetachma*, *Neodypsis*, 散尾葵、網籽草(*Dictyospermum*)及各種橡膠樹。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧；日本、菲律賓、印尼、緬甸、印度、非洲、馬達加斯加、歐洲、蘇聯、澳洲、新西蘭、夏威夷、卡羅林島、馬紹爾群島、沙羅門島、新卡里多尼亞、斐濟、塞摩亞、美國、中美洲、南美洲。

附 註：本種爲柑橘、香蕉、橄果、木瓜、椰子、茶等熱帶的重要害蟲，在葉及嫩枝或果實上發生，繁殖迅速，爲害嚴重，多數國家列爲檢疫對象。

天 敵：*Chilocorus circumdatus* (Gyllenhal) 黑邊紅瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲
Chilocorus nigritus Fabricius 黑背唇瓢蟲
Pharoscymnus taoi Sasaji 四星小黑瓢蟲
Telsimia nitida Chapin 粉白小黑瓢蟲
圓星小瓢蟲
Cybocephalus gibbulus Erichson 黃胸小黑薊蟲
Aphelinus chrysomphali Mercet 矮小蜂
Aphytis sp.
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

1037. **Aspidiotus hederae** (Vallot) 1829) 佛手圓盾蚧 (Tang et Li, 1989:142; Zhang, 1987[ed.] 1:71)

Aspidiotus hederae (Vallot, 1829:)

寄 主：佛手 (*Citrus medica*)、女貞、夾竹桃、桂花、錦帶花、鐵樹、文竹、扁竹、珊瑚、絲蘭、茉莉。

分 佈：內蒙古(溫室)。

1038. **Aspidiosts nerii** Bouché 圓盾蚧 (Chou, 1985, 2:263; Huang, 1990[ed.] 2:301; Hun, 1992:190; Tao, 1999:73; Wu, 1994:601; Zhang, 1987[ed.] 1:71)

=*Aspidiotus hederae* Signoret,

Aspidiotus nerii Bouché, 1833:52.

=*Aspidiotus genistae* Westwood, 1840:118.

=*Chermes aloes* Boisduval, 1867:330.

=*Chermes ericae* Boisduval, 1867:345.

=*Chermes cycadicola* Boisduval, 1867:345.

=*Diaspis bouchei* Targioni, 1867:14.

=*Aspidiotus affinis* Targioni, 1868:736

=*Aspidiotus caldesii* Targioni, 1868:736.

=*Aspidiotus denticulatus* Targioni, 1868:

=*Aspidiotus villosus* Targioni, 1868:736.

=*Aspidiotus hedere* Signoret, 1869:856.

=*Aspidiotus budleiae* Signoret, 1869:115.

=*Aspidiotus ceratoniae* Signoret, 1869:118.

=*Aspidiotus epidendri* Signoret, 1869:121.

=*Aspidiotus gnidii* Signoret, 1869:122.

=*Aspidiotus ilicis* Signoret, 1869:123.

=*Aspidiotus limoni* Signoret, 1869:125.

=*Aspidiotus myricinae* Signoret, 1869:125.

=*Aspidiotus ulicis* Signoret, 1869:132.

=*Aspidiotus vriesciae* Signoret, 1869:134.

=*Aspidiotus lentisci* Signoret, 1869:601.

=*Aspidiotus osmanthi* Signoret, 1869:621.

=*Aspidiotus capparis* Signoret, 1869:639.

=*Aspidiotus myrsinae* Signoret, 1877:670.

=*Aspidiotus atherospirmae* Maskell, 1879:198.

=*Aspidiotus oleae* Colvee, 1880:39.

=*Aspidiotus corynocarpi* Colvee, 1881:39.

=*Aspidiotus oleastri* Colvee, 1882:12.

=*Aspidiotus affinis* Comstock, 1883:72.

=*Aspidiotus sophorae* Maskell, 1884:121.

=*Aspidiotus carpodeti* Maskell, 1885:21.

=*Aspidiotus* (*Diaspidiotus*) *villosus* Cockerell, 1897 :19.

别 名：*棕櫚圓蚧*、*長春藤圓蚧*、*薄圓蚧*。

[Oleander scale]

寄 主：鳳梨、木菠蘿、橡果、桑、枇杷、蘋果、梨、李、梅、櫻、柑橘、檸檬、棗、石榴、柿、葡萄、無花果、酪梨、橄欖、椰子、檳榔、釋迦、木梅、蘋婆、茶薦子、芭蕉、朱蕉、蘇鐵、海棗、棕櫚、刺葵、白楊、櫟、朴樹、榆、木蘭、含笑、海桐、薔薇、金合歡、刺槐、黃楊、冬青、茶、山茶、花椒、枸杞、枸、蓖麻、油桐、巴豆、甘藍、茄子、煙草、蘆筍、梓、桑虬、楊、櫟、朴、沙針、檀香、小葉、木蘭、想思樹、合歡、羊蹄甲、皂莢、槐、洋槐、紫藤、香椿、楝、漆、黃連木、肖乳香、連翹、樗、素馨、桉樹、女貞、木犀、丁香、*Phillyrea*、*Banksia*、銀樺、哈克木、歐洲堅果、蔥木、八角金盤、常春藤、*Meryta*、月橘、懸鈴木、泡桐、棕櫚、*Chamerops*、Howea、

肯特棕、蒲葵、*Pritchardia*、*Ptychosperma*、*Rhopalostylis*、*Sabal*、*Washingtonia*、紫杉、雪松、松、柏、金鐘柏、*Callitris*、蘇鐵、忍冬、英蓬、梔子、芸香、*Coprosma*、尖葉木、夾竹桃、雞蛋花、長春花、*Toxphlea*、豹皮花(*Stopelia*)、桃葉珊瑚、歐石南、*Arbutus*、*Axalea*、*Argania*, *Euelea*、仙客來、紫金牛、杜鵑花、胡頹子、瑞香、金絲桃、衛矛、木通、車桑仔、*Heterodendron*、鼠李、美洲茶、白歛、爬山虎、山扁豆、角豆樹、紫荊、金雀花、染料木、鷹豆、荊豆、*Aderocarpus*、*Calycotome*、*Tipuana*、*Perkinsonia*、*Coleonena*、*Correa*、毛櫻桃、玫瑰、繡線菊、海桐花、菊、旋復花、飛廉、*Bachygrottis*、風鈴草、苦檻藍、老鼠勒、十萬錯(*Asytasya*)、黃鍾花、婆婆納、釣鐘柳、金魚草、曼陀羅、酸漿、水蘇、*Sideritis*、薄荷、鼠尾草、迷選香、牡荊、假連翹、福祿考、旋花、牽牛、醉魚草、鉤吻、仙人掌、仙人鞭、蟹腳林、*Rhipsalis*、秋海棠、岩薔薇、*Halimium*、半日花、梵天花、大戟、*Poinsottia*、*Stigmatophylla*、伐薾(*Fagonia*)、拉瑞阿(*Larrea*)、繡球、虎耳草、岩白菜、腕帶花、青鎖龍、長生花、桂竹香、含笑、*Atherosperma*、*Permus*、鐵絲蓮、石竹、日中花、佛蓮、蓼、*Muehlenbeckia*、馬兜鈴、美洲寄生子、蔦尾、*Aristes*、望鶴蘭、*Chysis*、蘭草、*Oncidium*、龍舌蘭、弧挺花、*Furcraea*、*Tamus*、蘆薈、阿福花、鈴蘭、龍血樹、脂麻掌、*Lapageria*、新西蘭麻、假葉樹、虎尾蘭、菠蘿、鴛花、絲蘭、花葉蘭、馬蹄蘭、莎草、露兜、麻黃等。

分　佈：全國各省區，江西、雲南、浙江、江蘇、山東、山西等；日本、菲律賓、越南、印度、斯里蘭卡、中東、非洲、馬達加斯加、歐洲、蘇聯、澳洲、新西蘭、夏威夷、卡羅林群島、新喀里多尼亞、加拿大、美國、中美洲、南美洲。

天　敵：*Chilocorus* sp.　瓢蟲
Exochomus sp.
Aphelinus sp.
Aphytis chrysomphali (Mercet)　黃金矮小蜂
Aphytis holoxanthus DeBach　褐圍蚧黃矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere　嶺南黃矮小蜂
Encarsia auranti (Howard)
Encarsia citrinus (Craw)　纓恩矮小蜂

1039. **Aspidiotus spinosus** Comstock 刺圓盾蚧 (Chou, 1985, 2:268)

Aspidiotus spinosus Comstock, 1883:57, 70.
=*Aspidiotus cydoniae* Newstead, 1897:74. (*nec* Comstock).
=*Aspidiotus persearum* Cockerell, 1898:240.

寄　主：葡萄、無花果、山茶、油桐、木蘭、樟、月桂、懸鈴木、英蓬、棕櫚、桄榔、蒲葵、柵杉、玫瑰、覆盆子、衛矛、紅毛丹、大蘇鐵、蘆筍、脂麻掌、拔契、石斛、大戟、*Lycaste*、*Lagunaria*、*Caralluma* 及各種仙人掌科植物。

分　佈：江蘇；日本、馬來亞、馬達加斯加、中東、英國、歐洲、蘇聯、美國、中美洲、夏威夷。

1040. **Aspidiotus transpareus** Green 琉璃圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:287)

寄　主：柑橘、枇杷、葡萄、黃楊。

分　佈：臺灣、浙江。

1041. **Aulacaspis actinidiae** Takagi 彌猴桃白輪蚧 (Chou, 1985, 2:368; Tao, 1999:74)
Aulacaspis actinidiae Takagi, 1970:99.
寄 主：彌猴桃。
分 佈：臺灣。

1042. **Aulacaspis amamiana** Takagi 大缺白輪蚧 (Chou, 1985, 2:370; Tao, 1999:74)
Aulacaspis amamiana Takagi, 1961, 24:76.
寄 主：木莓(*Rubus* sp.)。
分 佈：廣東、雲南；日本。

1043. **Aulacaspis citri** Chen 柑橘白輪蚧 (Chen, 1954:165; Chou , 1982, 1:134; Tang et Li 1989: 178; Tao, 1999:74)
Aulacaspis citri Chen, 1954, 4(2):165, 168.
寄 主：柑橘(甜橙)等。
分 佈：四川、內蒙古。

1044. **Aulacaspis crawii** (Cockerell) 珠蘭白輪蚧 (ASZI, 1986, 1:287; Chao, 1982:97; Chou, 1982, 1:132; Hun., 1992:190; Sichuan ASA, PPRI, 1979:46-47; Tao, 1999:74)
Diaspis crawii Cockerell, 1898:190.
=*Aulacaspis fulleri* Zimmerman, 1948:381. (*nec* Cockerell).
別 名：*橘白輪蚧*，*白輪蚧*，*牛奶子白輪蚧*，*柑橘白輪盾蚧*，*茶花白輪蚧*，*胡頹盾蚧蟲*。
寄 主：柑橘、懸鉤子、胡頹子、茶花、米蘭、木槿、九里香、牛乳子、菝葜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、湖南、山西、內蒙古；日本、夏威夷、美國(加州)。
天 敵：*Coccobius fulvus* (Compere et Annecke) 褐黃異角矮小蜂

1045. **Aulacaspis difficilis** (Cockerell) 胡頹子白輪蚧 (Chou, 1982, 1:138; Tao, 1999:75)
Chionaspis difficilis Cockerell, 1896, Suppl. 1:20.
Aulacaspis fifficilis, Takahashi et Matsumura, 1956:
寄 主：胡頹子。
分 佈：臺灣、雲南、浙江、山西；日本。
天 敵：*Azotus perspeciosus* (Girault) 雙帶花角矮小蜂

1046. **Aulacaspis longanae** Chen 龍眼白輪蚧 (ASZI, 1986, 1:289; Chou, 1985, 2:373; Tao, 1999:75)
Aulacaspis longanae Chen et al., 1980, 5(3):292.
寄 主：龍眼、樟(葉面)。
分 佈：四川。

1047. **Aulacaspis megaloba** Scott 大葉白輪蚧 (Chou, 1982, 1:139; Tao, 1999:75)
Aulacaspis megaloba Scott, 1952, 17:36, 38.
寄 主：懸鉤子(枝條上)。
分 佈：廣東、香港、雲南。

1048. **Aulacaspis rosae** (Bouché) 玫瑰白輪蚧 (Chao, 1982:98; Chou, 1982, 1:128; Tao, 1999:76; Wang et al., 2000(1):30; Wu, 1994:604)
Aspidiotus rosae Bouché, 1833:53.
Aulacaspis rosae Cockerell, 1896:259.
[Rose scale]
別 名：*玫瑰盾蚧蟲*。

寄 主：梨、懸鉤子、刺莓、楊梅、橡果、薔薇、玫瑰、素藍、覆盆子、樟、烏桕、椿、楠、羅漢紅、龍芽草、蘇鐵。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、四川、西藏、陝西、浙江、江蘇、山西、河北、內蒙古；朝鮮、日本、菲律賓、爪哇、泰國、中東、歐洲、蘇聯、澳洲、夏威夷、加拿大、北美洲、中美洲、西印度群島、南美洲。
天 敵： *Encyrtus sasakii* Ishii 跳小蜂
Archenomus bicolor Howard 雙色短索矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

1049. **Aulacaspis rosarum** Borchsenius 月桂白輪蚧 (Hun., 1992:191; Wang et al., 2000(1):30; Xiao, 1992:295)
別 名：*黑銳白輪蚧*、*擬薔薇白輪蚧*。
寄 主：楊梅、懸鉤子、月季、薔薇、七里香、金櫻子、蘭花、樟樹、蘇鐵、烏桕。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、湖南、浙江、江蘇、山東。
天 敵：蠼螋
瓢蟲
盔唇瓢蟲
黑襟毛瓢蟲
小黑瓢蟲
寄生性(二種寄生蜂)

1050. **Aulacaspis saigusai** Takagi 懸鉤子白輪蚧 (Chou, 1985, 2:376; Tao, 1999:76)
Aulacaspis saigusai Takagi, 1970:91.
寄 主：莓（*Rubus floribundopaniculatus*）。
分 佈：臺灣、海南。

1051. **Aulacaspis tubercularis** (Newstead) 橡果白輪蚧 (Chang et al., 1982:100; Chou, 1982, 1:135; Tao, 1999:77; Tsai, 1970:144)
Diaspis (*Aulacaspis*) *rosae* Maxwell-Lefroy, 1903:45. (nec Bouché)
Aulacaspis (*Diaspis*) *tuberculatis* Newstead, 1906:45.
=*Aulacaspis cinnamomi* Newstead, 1908:34.
=*Diaspis* (*Aulacaspis*) *cinnamomi* var. *mangiferae* Newstead, 1911:86.
=*Diaspis mangiferae* Ayyar, 1919:13.
別 名：*白圓盾蚧*。
寄 主：橡果、龍眼、柑橘、椰子、玉桂、樟、楠、木姜子。
分 佈：臺灣、廣東、海南、四川；日本、印尼、泰國、印度、毛里西斯、馬達加斯加、非洲、中東、西印度群島、新加里多尼亞、新吉白利基、羅德里格斯。

1052. **Aulacaspis yabunikkei** Kuwana 樟白輪蚧 (Hun.1992:191; Tao, 1999:77; Wang et Zhang, 1992:159)
=*Parlatoria cingala* Shiraki, 1913:97.
=*Aulacaspis cinnamomi* Ferris, 1921:212.
Aulacaspis yabunikkei Kuwana, 1926:32.
別 名：*日本白輪蚧*、*雅樟白輪蚧*。
寄 主：胡頹子、樟、天竺桂、櫟木、新木姜子。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、四川、貴州、浙江；朝鮮、日本、東南亞、爪哇。
天 敵：*Aleurodothrips fasciapennis* (Franklin) 斑翅薊馬

Scymnus sp. 瓢蟲
Cecidomyiidae 癭蚊科
Encyrtidae 跳小蜂科
Signiphoridae 橫盾小蜂科
Aphytis sp.
Coccobius fulvus (Compere et Annecke)
Tetrastichus purpureus (Cameron)

1053. **Bigymnaspis bullata** (Green) 柑橘瓢盾蚧 (Chou, 1985, 2:218; Tao, 1999:77)
Aonidia bullata Green, 1896, 1:68, 72.
Bigymnaspis bullata Cockerell et Parrott, 1899:
寄 主：柑橘。
分 佈：廣東；斯里蘭卡。

1054. **Chionaspis montana** Borchsenius 山瓢盾蚧 (Tao, 1999:78)
Chionaspis montana Borchsenius, 1949, 30:347.
寄 主：蘋果屬、楊、柳。
分 佈：新疆、內蒙古；蘇聯。

1055. **Chionaspis salicis** (Linnaeus) 柳雪盾蚧 (Chou, 1982, 1:82; Tang et Li 1989:171; Tao, 1999:79)
Coccus salicis Linnaeus, 1758, 10, 2:456.
= *Coccus cryptogamus* Dalmon, 1826:167.
=*Aspidiotus vaccinii* Bouché, 1851:111.
=*Aspidiotus populi* Bouché, 1851: 111 (*nec* Bearensprung).
=*Mytilaspis maquarti* Targioni-Tozzetti, 1868:737.
=*Mytilaspis cryptogama* Targioni-Tozzetti, 1968:
=*Chionaspis aceris* Signoret, 1869:442.
=*Chionaspis alni* Signoret, 1869:443.
=*Chionaspis fraxini* Signoret, 1869:445.
=*Chionaspis vaccinii* Signoret, 1869:448.
=*Lecanium myrtilli* Kaltenbach, 1874:420.
=*Aspidiotus saliceti* Kaltenbach, 1874:587.
=*Chonaspis sorbi* Douglas, 1893:130.
Chionaspis salicis, Reh, 1904:
=*Aspidiotus salicifex* Ferris, 1941:48.
=*Aspidiotus pyri* Sachtleben, 1944:74 (*nec* Lichtenstein).
寄 主：梨、葡萄、酯栗、各種楊樹、柳、榆、櫟、赤楊、樺、榛、枸子、花椒、金雀花、染料木、衛矛、楓、鼠李、半日花、棟木、椴、歐石南、杜鵑花、越橘、素馨、女貞、丁香、繡球、南燭、喇叭茶、熊果。
分 佈：青海、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；中東、北非、歐洲、蘇聯。
天 敵：*Archenomus bicolor* Howard 雙色短索矮小蜂
Archenomus lauri Mercet 勞里短索矮小蜂
Encarsia gigas (Tshumakova) 黃胸蚜虱矮小蜂
Encarsia proclia (Walker) 桑盾蚧黃矮小蜂

1056. **Chionaspis saitamensis** Kuwana 青楓齊盾蚧 (Shen et al., 1994:353-356; Tao, 1999:79)
Chionaspis saitamensis Kuwana, 1928, 1:11.
寄 主：板栗。
分 佈：浙江；日本。

天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
Aphytis spp. 黃矮小蜂

1057. **Chionaspis subcordicalis** Green 橡果雪盾蚧 (Chou, 1982, 1:86)
Chionaspis subcorticalis Green, 1905:351.
寄 主：橡果、菠蘿蜜、木豆、黃花稔、番茄。
分 佈：廣東、雲南；爪哇、斯里蘭卡、毛里西斯。

1058. **Chionaspis vitis** Green 葡萄雪盾蚧 (Chou, 1982, 1:87)
Chionaspis vitis Green, 1896:3.
寄 主：葡萄、橡果、胡頹子、粗糠柴、桑寄生、解寶葉、鐵莧菜、單葉豆、秋茄樹。
分 佈：臺灣；日本、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡。

1059. **Chrysomphalus aonidum** (Linnaeus) 褐圓蚧 (Chang, 1958:118-120; Chang, 1973:37; Chen, 1981:49; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chen, 1996(4):29; Chen et Wang, 1987:235-236; Chen et al., 1997, 14(2):32; Cheng et Tao, 1963:313-322; Chiu et al., 1985:1-8; Chou, 1985:284; Gan et al., 1993:347-348; He et al., 1991:58-60; Huang, 1990[ed.] 2:204-205; Huang et Gan, 1996:153; Huang et al., 1994(3):41-42; Huang et al., 1996(2):34-36; Hun., 1992:192; Jiang, 1997, 14(1):34; Jie et Wang, 1996(2):11; Li et Liao, 1990:68-70; Lu, 1989:218-223; NZWDI, 1981:1897; Shi et al., 1989-'90:82; Su, 1983:253-259; Tao, 1999:80; Tao et Chiu, 1960:137-138; Tao et Wu, 1968:59-60; 1969:145; Wang et Zhang, 1992:159; Wen, 1999(2):23; Wu, 1994:608; Zhang, 1987[ed.] 1:71; Zhao et al., 1992, 14(3):138-142; Zeng, 1995(2):46)
Coccus aonidum Linnaeus, 1758:145.
=*Chrysomphalus ficus* Ashmead, 1880:
別 名：*黑褐圓盾蚧*，*褐圓金頂盾蚧*，*鳶紫褐圓蚧*，*茶褐圓蚧*。
寄 主：柑橘、檸檬、葡萄、椰子、無花果、香蕉、蘋果、梨、桃、李、山楂、枇杷、橡果、栗、棗、柿、石榴、楊梅、番石榴、釋迦、木菠蘿、酪梨、板栗、油橄欖、椰子、檳榔、海棗、桑、銀杏、香蕉、松、杉、柏、南美杉、紫杉、羅漢松、茶、山茶、百合、花椒、蓖麻、蘆筍、芋、油桐、黃麻、梓樹、木犀、尖葉木、女貞、素馨、桉、紅千層、番櫻桃、欖仁樹、檉柳、紅厚殼、木槿、鼠李、槭、衛矛、冬青、黃楊、漆樹、葉下珠、巴豆、變葉木、枸橘、洋槐、刺桐、角豆樹、羊蹄甲、相思樹、石斑木、石楠、月桂、木蘭、檀香、樟，歐洲堅果、桑屬、櫟、柳、竹、棕櫚、蘇鐵、雙子蘇鐵、莢迷、梔子、龍船花、水團花、比格諾藤、夾竹桃、黃花夾竹桃、雞蛋花、玫瑰樹、雞骨常山、槍彈木、金葉樹、長春花、杜鵑花、桃葉珊瑚、常春藤、紅膠木、車桑仔、阿開木(*Blighia*)、福木、南蛇藤、檳榔青、玫瑰、紫菀、金盞花、大丁草、刺子莞、耐寒菫菜、牽牛花、蠶、假連翹、鷺鷥茉莉、假虎刺、黃蟬花、紫金牛、玉芯、散沫花、仙人掌、秋海棠、大風子、大戟、羅望子、巢菜、山扁豆、漫疏、石竹、鷹爪花、商陸、蓼、石斛、竹芋、美人蕉、望鶴蘭、旅人蕉、龍舌蘭、菝契、虎尾蘭、沿階草、新西蘭麻、龍血樹、朱蕉、蜘蛛抱蛋、蘆薈、石橘子、八角金盤、蒟芋、水芋、新西蘭椰子、莎草、龐草、薑、金茅、狗牙根、露兜、白千層、秋茄樹、巴拿馬草、肯特棕、拉唐棕、*Coprosma*, *Markhamia*, *Toxicophilaea*, *Royena*, *Argania*, *Leucopogon*, *Oreopanax*, *Sciadophyllum*, *Leptospermum*, *Angophora*, *Pterospermum*, *Protorhus*, *Sclerocarya*, *Poinsettia*, *Ptaeroxylon*, *Listia*, *Castarospermum*, *Brexia*, *Cotyledon*, *Muehlenbeckia*, *Brassia*, *Coelogyna*, *Odontoglossum*, *Ocidium*, *Vandn*, *Ixia*, *Doryanthus*, *Furcraea*, *Calostemma*, *Mondon*, *Nolina*, *Anthurium*, *Pritchardia*, *Caryota*, *Dictyosperma*, *Howea*.
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、

浙江、江蘇、陝西、山東、河北、北京、內蒙古；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、留尼旺島、厭里達斯、埃及、中東、歐洲、澳洲、夏威夷、加羅林島、新加尼多尼亞、薩摩亞群島、澳洲、美國、中美洲、南美洲。

天 敵：*Chrysopa vulgaris* var. *anpingensis* Peterson 草蛉
Chilocorus circumdatus Sch. 黑邊紅瓢蟲
Chilocorus grassitti Miyatake 圓黑小瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲
Chilocorus nigritus Fabricius 黑背唇瓢蟲
Chilocorus renipustulatus Scruba, 腎斑瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲(二星瓢蟲,赤星瓢蟲)
Chilocorus similis Rossi 小赤星瓢蟲(二星黑瓢蟲)
Coelophora congener (Schoenherr) 紅星盤瓢蟲
Lemia circumusta Mulsant 紅基盤瓢蟲
Telsimia emarginata Ghapin 整胸寡節瓢蟲
Telsimia nigra (Weise) 裂胸寡節瓢蟲
Cybocephalus niponicus Endrödy-Yonga 日本方頭甲
Comperiella bifasiatus Howard 雙帶跳小蜂
Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂
Aphytis holoxanthus DeBach 褐圓蚧黃矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂
Aphytis maculicornis Masi 斑角矮小蜂(斑點矮小蜂)
Azotus perspeciosus (Girault) 雙帶花角矮小蜂
Coccophagus hawaiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂
Encarsia citrinus (Mayr) 長纓恩矮小蜂(盾蚧長纓矮小蜂)
Encarsia elongata (Dozier) 長恩矮小蜂
Encarsia inquirenda (Silvestri) 糠蚧恩矮小蜂
Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂
Pteroptrix smithi (Compere) 斯氏四節矮小蜂

1060. **Chrysomphalus bifasciculatus** Ferris 擬褐葉圓蚧 (Hun., 1992:192; Li et Liao, 1990:68-70; Wang et Zhang, 1992:1160; Zhang, 1987[ed.] 1:71)
Chrysomphalus bifasciculatus Ferris, 1938, S11:199.
別 名：*醬褐圓盾蚧*，*橙褐圓盾蚧*，*擬褐金頂盾蚧*。
寄 主：柑橘、柚、香蕉、李、杏、番荔枝、無花果、木瓜、胡頹子、油橄欖、椰子、海棗、木犀、茶、英迷、桂花、夾竹桃、女貞、桃葉珊瑚、常春藤、八角金盤、檵木、Gillbertia、白歛、衛矛、南蛇藤、阿拉伯茶、冬青、漆樹、黃楊、枸橘、*Laurocerasus*、海桐花、月桂、樟、*Hakea*、櫟、望鶴蘭、*Libertia*、蜘蛛抱蛋、*Mondo*、沿階草、莎草、露兜、蘇鐵、光榔
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、內蒙古；日本、蘇聯、美國(加州)、夏威夷。
天 敵：*Marietta carnesi* (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂

1061. **Chrysomphalus dictyospermi** (Morgan) 紅褐圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:291; Chou, 1985, 2:288; Hun., 1992:193; Tao, 1999:80; Wang et al., 2000(10:30-32; Wu, 1994:611; Zhang, 1987[ed.]1:71)

Aspidiotus dictyospermi Morgan, 1889, 25:352.
=*Aspidiotus dictyospermi* var. *arecae* Newstead, 1893:185.
=*Aspidiotus mangiferae* Cockerell, 1893:255.
=*Aspidiotus arecae* Cockerell, 1894:129.
=*Aspidiotus dictyospermi* var. *jamaicensis* Cockerell, 1894:129.
Chrysomphalus dictyospermi Maskell, 1895:
=*Chrysomphalus minor* Berlese, 1896:346.
=*Chrysomphalus dictyospermi* var. *mangiferae* Cockerell, 1899:369.
=*Chrysomphalus mangiferae* Leonaldi, 1899:199, 218.
=*Chrysomphalus dictysopermi* var. *minor* Maskell, 1904:246.
=*Aspidiotus agrumincola* De Gregorio, 1915:125, 136 , 164.
=*Chrysomphalus jamaucebsis* Malenotti, 1917:114.
=*Chrysomphalus castigatus* Marnet, 1936:94.
=*Chrysomphalus dictyospermatis* Lindinger, 1949:44.

別 名：*橙圓金頂盾蚧*，*橙褐葉圓蚧*，*橙紅褐圓盾蚧*。

[Dictyospermum scale]

寄 主：柑橘、檬果、無花果、木菠蘿、椰子、檳榔、香蕉、葡萄、柿、石榴、番石榴、酪梨、楊梅、釋迦、蓮霧、梨、杏、枇杷、蘋婆、檸檬、胡頹子、桑、松、油橄欖、西印度椰子、海棗、茶、山茶、肉豆蔻、蘆筍、芋、忍冬、雞蛋花、假虎刺、丁香、素馨、桉、槍彈木、桃花珊瑚、虬木、八角金盤、常春藤、紅千層、白千層、番櫻桃、紫薇、紅厚殼、藤黃、木槿、女貞、冬青、衛矛、蠟、蜜果、黃楊、鼠李、爬山虎、黃連木、漆樹、肖乳香、檳榔青、變葉木、巴豆、枸杞、芸香、金虎尾、相思樹、合歡、羊蹄甲、朱纓花、角豆樹、紫荊、金雀花、蘇鐵、大蘇鐵、刺桐、皂莢、槐、羅幌子、無憂花、玫瑰、栀子、懸鈴木、海桐花、天竺葵、忍冬、夾竹桃、衛矛、木蘭、樟、月桂、桑屺、哈克木、櫟、朴、楊、柳、紫杉、南美杉、柏、金鐘柏、棕櫚、蒲葵、姜果棕、大葉椰、白藤、澤米、木麻黃、苔檻藍、老鴉嘴、比格諾藤、黃蟬花、醉魚草、紫金牛、風車子、玉蕊、仙人掌、瓶木、大戟、天竺葵、瀑疏、商陸、美人蕉、姜花、鳶尾、海里康、旅人蕉、望鶴蘭、龍舌蘭、蜘蛛抱蛋、朱蕉、山管蘭、龍血樹、新西蘭麻、假葉樹、絲蘭、水塔花、馬蹄蓮、臭荽、蓬萊蕉、莎草、露兜、土沉香、海濱葡萄、山黃麻、蘭草、巴拿馬草、拉唐棕、散尾棕、*Bahia*、吊燈樹(*Kigelia*)、*Arbutus*、吊鍾花、*Spermoleps*, *Metrosiderus*, 美洲稔(*Feigoa*)、*Rheedia*、翅子樹(*Pterospermum*)、中美木棉(*Pachira*)、*Mystroxylon*、*Lithraea*、香肉果(*Casimiroa*)、*Calodendron*, *Brexia*, *Muehlenbeckia*, *Banksia*, *Chaetachme*, *Hiconia*, *Odontoglossum*, *Epidendron*, *Cypridedium*, 貝母蘭 (*Coelogyne*), *Fureraea*, *Doryanthes pincenectata*, *Anthericum*, *Chamaerops*, 網籽草(*Dictyospermum*), *Drymophloeus*, *Howea*, *Hyophorbia*, *Sabal*.

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、浙江、江蘇、山東、河南、山西、陝西、河北；日本、菲律賓、越南、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、摩里西斯、留尼旺、非洲、中東、歐洲、蘇聯、美國、中美洲、南美洲、夏威夷、加羅林島、喀萊多尼、薩摩亞、東加。

天 敵：*Comperiella bifasciata* Howard 雙帶巨角跳小蜂
Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂
Aphytis proclis (Walker) 桑盾蚧黃矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

Encarsia inquiranda (Silvestri) 棘蚧恩矮小蜂
Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛長纓恩矮小蜂

1062. **Chrysomphalus mume** Tang 梅圓盾蚧 (Tang, 1984:35; Tao, 1999:81)
Chrysomphalus mume Tang, 1984, 2:35.
寄 主：梅。
分 佈：雲南。

1063. **Cornuaspis beckii** (Newman) 紫(牡)蠣蚧 (Chang, 1973:38; Chiu et al., 1985:1-8; Chou, 1982, 1:169; Wu, 1994:633; Zhang, 1987[ed.] 1:72)
Coccus beckii Newman, 1869:217.
=*Aspidiotus citricola* Packard, 1869:527.
=*Coccus anguinus* Boisduval, 1870.
=*Mytilaspis fulva* Targioni-Tozzetti, 1872:131.
=*Mytilaspis flavescens* Targioni-Tozzetti, 1876:84.
=*Mytilaspis citricola* var. *tasmaniae* Masbell, 1897:303.
=*Mytilaspis tasmaniae* Cockerell, 1899:
=*Mytilaspis pinnaeformis* Newstead, 1901:194, 204. (*nec* Bouché)
Cornuaspis beckii (Newman); Borchsenius, 1963:
別 名：*紫蛇蚧*，*紫牡蠣盾蚧*。
[Purple scale]
寄 主：柑橘、柚、檸檬、梨、無花果、葡萄、可可、酪梨、胡椒、連香樹、桂花、紫杉、巴豆、變葉木、安匝木、櫟、桂樹、沙棘、冬青、玫瑰、九里香、枸橘、*Banksia*, *Wigandia*。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇；日本、菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、歐洲、蘇聯、美國、南美洲、澳洲、大洋洲。

1064. **Cornuaspis cupressi** (Borchsenius) 柏牡蠣蚧 (Chen, 1996, 22(2):27; Tao, 1999:82)
Lepidosaphes cupressi Borchsenius, 1958, 8(2):169, 175.
Cornuaspis cupressi Borchsenius, 1963:
寄 主：蘋果、楊梅、懸鉤子、柿、玫瑰等。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇。

1065. **Diaspidiotus perniciabilus** Wang et Zhang 危枝圓盾蚧 (Wang et Zhang, 1994:326; Xu et al., 1993:147)
Diaspidiotus perniciabilus Wang et Zhang, 1994, 19:326-327.
寄 主：板栗。
分 佈：安徽。

1066. **Diaspidiotus perniciosus** (Comstock) 梨枝圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:292; Huang, 1990[ed.] 2:108-110; Wang et Zhang, 1992:161; 1992:404; Zhao, 1993:160; Zhao et al., 1998(4):29)
Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881:)
Quadraspidiotus perniciosus, Ferris, 1938:259.
Diaspidiotus perniciosus, Borchsenius, 1950:229.
寄 主：蘋果、山楂、李、梨、櫻桃、桃、杏、酸橙、苦橙、穗狀醋栗、柿、胡桃、茶、女貞、棉及其他核果類和仁果類植物。
分 佈：廣東、廣西、四川、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、陝西、河南、山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；亞洲東部、南非、澳洲、新西蘭、夏威夷、美洲。

天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點瓢蟲
Chilocorus renipustulatus (Scriba) 腎斑唇瓢蟲
Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga 日本方頭甲
Aphytis proclis (Walker) 桑盾蚧黃矮小蜂
Encarsia gigas (Tshumakova) 黃胸蚜虱矮小蜂
Encarsia aurantii (Howard)

1067. **Diaspis boisduvali** Signoret 椰子盾蚧 (Chou, 1982, 1:119; Tao, 1999:83; Wu, 1994:614)
Diaspis boisduvalii Sugbiret, 1869, 4:432.
=*Aulacaspis boisduvali* Cockerell, 1893:
=*Diaspis cattleyae* Cockerell, 1902:
[Biosduval scale]
寄 主：椰子、檳榔、棕櫚、蒲葵、海棗、大葉椰、竹芋、仙人掌、龍舌蘭、芭蕉、望鶴蘭、新西蘭麻、常春藤、桑寄生、海里康、果子蔓、西印度椰子、阿瑞蓋利、比氏鳳梨、露兜。*Bactris, Chamerops, Euterpe, Kentia, Lantania, Washingtonia, Aechmea, Ctenanta, Pleiochiton, Mirsine, Baccharis* 以及許多蘭科植物。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南；日本、爪哇、斯里蘭卡、中東、非洲、英國、歐洲、蘇聯、美國、中美洲、巴西、夏威夷。
天 敵：*Pteroptrix chinensis* (Howard) 中華四節矮小蜂

1068. **Diaspis bromelliae** (Kerner) 鳳梨盾蚧 (Chou, 1982, 1:120; Tao, 1999:83; Wu, 1994:616)
Coccus bromeliae Kerner, 1778, 20:52.
Diaspis bromelliae, Curtis, 1843:
=*Diaspis tillandsiae* Del Guercio, 1894:156.
[Pineapple scale]
寄 主：鳳梨、甘蔗、海棗、龍舌蘭、美人蕉、雞尾蘭、水塔花、阿瑞蓋利、油橄欖、木槿、常春藤、素馨、*Chamaerops, Nidularium, Tillandsia, Brassia, Oncidium* 等。
分 佈：臺灣、海南島；日本、緬甸、埃及、亞速爾島、南非、馬烏利基、歐洲、蘇聯、美國、墨西哥、巴西、阿根廷、夏威夷、斐濟。
天 敵：*Aphytis chrysomphali* Mercet 黃金矮小蜂
Aphytis proclia Walker 桑盾蚧黃矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

1069. **Diaspis echinocacti** (Bouché) 仙人掌盾蚧 (Chou, 1982, 1:121; Tao, 1999:83; Wu, 1994:618)
Aspidiotus echinocacti Bouché, 1833:53.
=*Diaspis calyptroides* Costa, 1835:20.
=*Diaspis cacti* Comstock, 1883:93, 95.
=*Diaspis opuntiae* Newstead, 1893:188.
=*Diaspis opunticola* Newstead, 1893:281.
=*Diaspis cacti* var. *opuntiae* Cockerell, 1893:256.
=*Diaspis cacti* var. *opunticola* Cockerell, 1894:462.
=*Diaspis calyptroides* var. *opuntiae* Cockerell et Parrott, 1899:277.
=*Diaspis calyptroides* var. *cacti* Charmoyk 1899:29.
=*Diaspis echinocacti cacti*, Fernald, 1903:230.
=*Diaspis echinocacti opuntiae*, Fernald, 1903:230.
=*Diaspis dactylproides* Bodenheimer, 1949:67.
[Cactus scale]
寄 主：各種仙人掌科植物，如仙人掌、仙人鞭、仙人球、絨仙人球、曇花、量天

尺、蟹爪仙人掌、*Erdisia, Melocactus* 等。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、西藏、陝西、江蘇、山西、北京(北方在溫室中)、內蒙古；日本、東亞、印度、馬德拉島、留尼旺島、馬達加斯加、北非、中東、西歐、蘇聯、夏威夷、美國、西印群島、秘魯、巴西、阿根廷。

天 敵：*Aphytis chrysomphali* (Mercet) 黃金矮小蜂
Aphytis debachi Azim 德氏黃矮小蜂
Aphytis holoxanthus DeBach 褐圓蚧黃矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂

1070. **Dynaspidiotus britannicus** (Newstead) 冬青狹腹盾蚧 (ASZI, 1986, 1:293; Tao, 1999:85; Wang et Zhang, 1992:405; Yunn., 1987:471;)
Aspitiotus britannicus Newstead, 1896, 32:279.
Dynaspidiotus britannicus Ferris, 1938:
寄 主：海棠、木瓜、桃金孃、茶、冬青、黃楊、女貞、常春藤、杉、月桂、角豆樹、楮木。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、安徽、江蘇、陝西、甘肅、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧。
天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1071. **Fiorinia citri** Young 橙蛻盾蚧 (Tao, 1999:86; Young, 1987:124)
Fiorinia citri Young, 1987, 7:124.
寄 主：橙(*Citrus sinensis* (L.))葉部。
分 佈：雲南。

1072. **Fiorinia fioriniae** (Targioni-Tozzetti) 單蛻盾蚧 (ASZI, 1986, 1294; Chou, 1982, 1:105; Hun., 1992:194; Tang et Li 1989:155; Tao, 1999:86; Wu, 1994:620)
Diaspis fioriniae Targioni-Tozzetti, 1867:14.
=*Chermes arecae* Boisduval, 1868:282.
=*Fiorinia pellucida* Targioni-Tozzetti, 1868:
=*Fiorinia camelliae* Comstock, 1881:329.
=*Fiorinia palmae* Green, 1896:39.
[Fiorinia scale]
別 名：*尖角盾蚧，團盾蚧*。
寄 主：柑橘、無花果、檬果、酪梨、柿、番櫻桃、椰子、象牙椰子、檳榔、海棗、松、茶、山茶、肉荳蔻、檀香、桂、羅漢松、落葉松、柏、紫杉、美洲杉、竹、椿、柳、榆、朴、楨楠、桉、九丁樹、山橘子、木棟樹、藤黃、樅木、常春藤、馬利筋、巴豆、澳洲堅果、宜祖花、龍血樹、朱蕉、新西蘭麻、假葉樹、望鶴蘭、棕櫚、扇軸棕、蒲葵、羊齒、蘇鐵、椿、杉、榆、柏、樟樹、烏桕、櫟。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、湖南、湖北、寧夏、內蒙古；日本、菲律賓、馬德拉、斯里蘭卡、摩里西斯、馬達加斯加、非洲、歐洲、蘇聯、澳洲、夏威夷、新加里多尼亞、馬爾太、美國、南美洲。
天 敵：*Archenomus lauri* Mercet 勞里短索矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

1073. **Fiorinia formosensis** Takahashi 珍珠蓮圓盾蚧 (Chou, 1985, 2:362; Tao, 1999:86)

Fiorinia formosenus Takahashi, 1933, 60:50.
寄 主：無花果、榕樹。
分 佈：臺灣。

1074. **Fiorinia japonica** (Kuwana) 日本蛻盾蚧 (Hun. 1992:194; Tao, 1999:86; Xiao, 1992:297; Zhang, 1987[ed.] 1:72)
Fiorinia fioriniae var. *japonica* Kuwana, 1902, 3, 3:79.
別 名：*松針蚧*、*日本單蛻盾蚧*、*日本尖角盾蚧*。
寄 主：馬尾松、油松、樟子松、黑松、雪松、羅漢松、日本冷杉、雲杉、檜。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、四川、湖南、江蘇、河南、山東、河北、北京；日本、菲律賓、北美。

1075. **Fiorinia minor** Mashell 小圓盾蚧 (Chou, 1982, 1:110, Tao, 1999:87)
Fiorinia camelliae var. *minor* Mashell, 1897, 29:307.
=*Fiorinia fioriniae minor* Fernald, 1903:247.
=*Fiorinia chinensis* Ferris, 1921:216.
Fiorinia minor, Ferris, 1938:4.
寄 主：無花果、薜荔、山茶、朴、棕櫚。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、浙江；澳洲。

1076. **Fiorinia myricae** Young 楊梅蛻盾蚧 (Tao, 1999:87; Young, 1987:128)
Fiorinia myricae Young, 1987, 7:127.
寄 主：楊梅(*Myrica rubra* Sieb. & Zuee.)葉部。
分 佈：江西(南昌)。

1077. **Fiorinia pinicola** Mashell 松蛻盾蚧 (Chou, 1982, 1:109; Hun., 1992:194; Tao, 1999:87)
Fiorinia pinicola Mashell, 1897, 33:242.
=*Fiorinia camelliae* Mashell, 1898:232. (*nec* Comstock).
=*Fiorinia juniperi* Ferris, 1921:215. (*nec* Leonardi).
=*Fiorinia pruinosa* Ferris, 1950:
別 名：*多腺蛻盾蚧*，*松圓盾蚧*。
寄 主：無花果、楊梅、粗榧、馬尾松、南亞松、柏、羅漢松、石櫟、海桐花、山茶、玉蘭、檜柏。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、海南、廣西、雲南、湖南、浙江；日本、葡萄牙。

1078. **Fiorinia pinicorticis** Ferris 松皮圓盾蚧 (Chou, 1982, 1:112; Tao, 1999:87)
Fiorinia pinicorticis Ferris, 1950, 15:77.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

1079. **Fiorinia proboscidaria** Green 象鼻圓盾蚧 (Chou, 1982, 1:107; Tao, 1999:87; Zhang, 1987[ed.] 1:72)
Fiorinia proboscidaria Green, 1900, 13:256.
寄 主：柑橘、蒲桃、茶、胡椒、白樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；日本、印度、斯里蘭卡、斐濟。

1080. **Fiorinia taiwana** Takahashi 臺灣圓盾蚧 (Chou, 1985, 2:364; Tao, 1999:88; Wang et al., 2000(1): 30-32)
Fiorinia taiwana Takahashi, 1934, 63:24.

=*Fiorinia taiwana* var. *arengae* Takahashi, 1934:
寄 主：楊梅、青楓樹等。
分 佈：臺灣、福建、浙江、安徽。

1081. **Fiorinia theae** Green 茶蛻盾蚧 (ASZI, 1986, 1:295; Chou, 1982, 1:106; Hun., 1992:194; Wu, 1994:622; Yunn., 1987:194; Zhang, 1987[ed.] 1:72)
Fiorinia theae Green, 1900:3.
=*Fiorinia turpiniae* Takahashi, 1934:
別 名：*茶圓盾蚧*、*茶單蛻盾蚧*、*茶尖角盾蚧*。
[Tea scale]
寄 主：柑橘、茶、山茶、油橄欖、冬青、柃、*Caryola* (菲律賓)、*Ostodes* (斯里蘭卡)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、雲南、四川、湖南、浙江、江蘇；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、美國、中美洲。
天 敵：*Encarsia elongata* (Dozier) 長恩矮小蜂

1082. **Fiorinia turpiniae** Takahashi 山香圓圓盾蚧 (Chou, 1982, 1:111; Tao, 1999:88)
Fiorinia theae var. *turpiniae* Takahashi, 1934, 63:21.
Fiorinia turpiniae Ferris, 1950:78.
寄 主：柑橘、山香圓。
分 佈：臺灣、江西、廣東、香港、雲南、四川；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、美國、墨西哥、中美。

1083. **Fiorinia yunnanensis** Hu 雲南蛻盾蚧 (Hu, 1984:213; Tao, 1999:88)
Fiorinia yennanensis Hu, 1984, 4:213.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南(昆明)。

1084. **Genaparlatoria pseudaspidiotus** (Lindinger) 甲盾蚧 (Chou, 1985, 2:240; Tao, 1999:89)
Parlatoria pseudaspidiotus Lindinger, 1905, 22:131.
=*Parlatoria mangiferae* Marlatt, 1908:28.
Genaparlatoria pseudaspidiotus, MacGillivray, 1921:
寄 主：檬果、石斛、仙人指甲蘭、毛舌蘭、萬代蘭、大戟。
分 佈：雲南；日本、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、爪哇、印度、斯里蘭卡、蘇丹、南非、英國、德國、美國、夏威夷。

1085. **Greeniella fimbriata** (Ferris) 櫻囿盾蚧 (Chou, 1985, 2:326; Tao, 1999:90)
Decoraspis fimbriata Ferris, 1955, 20:32.
Greeniella fimbriata Borchsenius, 1966:
寄 主：番櫻桃。
分 佈：廣東。

1086. **Greeniella lahoarei** (Takahashi) 臺囿盾蚧 (Chou, 1985, 2:326, 405; Tao, 1999:90)
Aonidias (*Greeniella*) *lahoarei* Takahashi, 1931, 22:219.
Greeniella lahoarei Borchsenius, 1966:
寄 主：番櫻桃。
分 佈：臺灣。

1087. **Hemiberlesia cyanophylli** (Signoret) 黃炎盾蚧 (ASZI, 1986, 1:295; Shiao, 1979:267-276; Zhang,

1987[ed.] 1:72)
Aspidiotus cyanophylli Signoret, 1869:119.
Hemiberlesia cyanophylli, Takagi, 1969:78.
別 名：*棕櫚蚧*。
寄 主：柑橘、檬果、香蕉、無花果、酪梨、椰子、可可、蘭、茶、山茶、月桂、黃梔花、蘇鐵、油棕櫚、棕櫚、朴樹、接骨木、枹櫟龍、馬鈴薯、竹筍、南瓜。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、陝西；日本、印尼、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、地中海、歐洲、英國、蘇聯、美國、中美洲、南美洲、夏威夷。
天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1088. **Hemiberlesia implicata** Maskell 葡萄圓蚧 (Chang, 1987:40; Tao, 1999:91; Wang et Su, 1987:165)
Aspidiotus iimplicatus Maskell, 1897, 33:241.
寄 主：葡萄(莖、枝條)、*Campanula*.
分 佈：臺灣。

1089. **Hemiberlesia lataniae** (Signoret) 棕突圓蚧 (Chang, 1973:36; 1987:40; Chang et al., 1982:100; Chao, 1982:99; Chou, 1985, 2:302; Hu, 1986:223; Hun., 1992:195; Su et Wang, 1988:279-288; Tao, 1999:91; Wang et Su, 1989:44-50; 151-156; Wu, 1994:622)
Aspidiotus lataniae Signoret, 1869, 9(4):124.
=*Aspidiotus cydoniae* Comstock, 1881:295.
=*Aspidiotus punicae* Cockerell, 1893:225.
=*Aspidiotus diffinis* var. *lateralis* Comstock, 1894:130.
=*Aspidiotus* (*Hemiberlesia*) *crawii* Cockerell, 1897:8, 9, 23.
=*Aspidiotus* (*Diaspidiotus*) *greeni* Cockerell, 1897:12, 27.
=*Aspidiotus cydoniae* var. *tecta* Mashell, 1897:240.
=*Aspidiotus implocatus* Maskell, 1897:241.
=*Aspidiotus cydoniae punicae* Fernald, 1903:256.
=*Aspidiotus cydoniae crawii* Fernald, 1903:256.
=*Aspidiotus punicae* MacGillivray, 1921:
=*Aspidiotus askleniae* Sasaki, 1935:864.
別 名：*茶圓蚧*、*棕櫚盾蚧*、*棕櫚櫛圓盾*、*櫛圓盾蚧*。
[Latania scale]
寄 主：蘋果、梨、杏、枇杷、橘柚、山楂、懸鉤子、柑橘、葡萄、石榴、毛柿、山核桃、棗、菠蘿蜜、核桃、桑、桑蛇、釋迦、羅望子、檬果、人心果、番石榴、檳榔青、酪梨、木瓜、番櫻桃、蓮蜜蘋果、蘋婆、香蕉、椰子、檳榔、鼠李、枸杞、茄子、扁豆、木豆、雲實、合歡、金合歡、角豆樹、側柏、小冠花、黃檀、車軸草、荊豆、洋槐、鷹爪豆、三捻、刺桐、山螞蝗、杜鵑花、水冬瓜、羊蹄甲、扁葉軸木、鳳凰木、*Andica*, *Mundulea*, *Tupuana*, 漆樹、黃連木、肖乳香、蜜果、楝、福木、忍冬、多青、衛矛、女貞梅、楓香、黃楊、常春藤、八角金盤、樅木、薯蕷、*Tamus*, 蒸菜、天蒸、藜、櫟、榆、紫菫、女貞、油橄欖、木犀、*Phillirea*, 蓖麻、油桐、大戟、葉下珠、*Hura*, *Yulophylla*, 樟、木姜子、 *Ravensavia*, 梾、紅千層、白千層、愛神木、*Nerosideros*, 瑞香、紫薇、散沫花、大風子、白楊、柳、蜀葵、木槿、朱槿、梵天花、 *Lagunaria*, 金絲桃、懸鈴木、秋海棠、仙人掌、銀毛球、*Cactus*, 倒挂金鍾、山桃草、馬兜鈴、商陸、桑寄生、珊瑚藤、洋臘梅、常綠鉤吻、假虎刺、夾竹桃、黃花夾竹桃、雞蛋花、山馬茶、*Vinca*, 馬纓丹、馬鞭草、老鴉嘴、苦檻藍、迷迭香、水蘇、廣防風、*Sideritis*, 艾、菊、紫菀、澤蘭、旋復花、腫柄菊、*Stenocline*, 虎耳草、茶藨子、卡噴特木、伽藍菜、銀樟、

岩薔薇、紅樹、吉貝、昂天蓮、賣比、巴岐拉、辣木、破布木、歐石南、*Theophrasta*, 金葉樹、槍彈木、藜蘆、*Rofiena*, *Astrochlaena*, *Wiganclia*, *Zygozynum*, 海葡萄、竹節蓼、草海桐、婆婆納、比格諾藤、加拉巴木、黃鐘花、木麻黃、 *Epidendrum*, 唐菖蒲、美人蕉、芭蕉、鶴望蘭、巴西棕、蒲葵、海棗、散尾葵、*Corypha*, 網籽草、*Howea*, *Hyophorbe*, 肯特椰、拉唐棕、*Pritchardia*, *Ptichosperma*, 蘆筍、龍血樹、菝葜、玉茄、*Conhnia*, *Colostemma*, 龍舌蘭、甘蔗、玉米、棕葉蘆、蓬萊蕉、喜林芋、莎草、露兜、藤露兜、檜、柏、雪松、金鏈柏、蘇鐵、棕櫚、茶、報歲蘭。

分　佈：臺灣、福建、廣東、雲南、貴州、湖南、湖北、浙江、江蘇、山東；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、摩利西斯、留尼旺、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、美國、中美洲、南美洲、大洋洲。

天　敵：*Cybocephalus nipponicus* Endrödy-Younga　日本方頭甲
Aphytis lingnanensis Compere　嶺南黃矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂

1090. **Hemiberlesia massonianae** Tang 馬尾榧圓盾蚧 (Tang, 1984, 2:50; Tao, 1999:91)
Hemiberlesia massonianae Tang, 1984, 2:50.

寄　主：馬尾松。

分　佈：廣東。

1091. **Hemiberlesia pitysophila** Takagi 松突圓蚧 (Huang, 1991:21; Pan et al., 1987:177-189; 1991:155-157; Tao, 1999:91; Wu, 1994: 626; Xiao, 1992:298; Yang et Liang, 1996, 18(2):91-97; Young, 1987:190)
Hemiberlesia pitysophila Takagi, 1969:79.

寄　主：琉球松(*Pinus luchuensis* Mayr)(琉球)、馬尾松(*P. massoniana* Lamb.)、濕地松(*P. elliotti* Engelm.)、加勒比松(*P. caribaea* Morelet)、火炬松(*P. taeda* L.)、黑松(*P. thunbergii* Parl.)。

分　佈：臺灣、廣東、香港、澳門、海南；琉球。

天　敵：*Amblyseius* (s. str.) *nicholsi* Ehara et Lee　尼氏鈍綏螨
Amblyseius (s. str.) *herbicolus* (Chant)　草鈍綏螨
Amblyseius (s. str.) *newsami* (Evns)　紐氏鈍綏螨
Anystis baccarum (Linnaeus)　圓果大赤螨
Ancyloteryx octopunctata Fabricius　八斑絹草蛉
Chrysopa kulingensis (Navas)　牯嶺草蛉
Phlaeothripidae　管蓟馬科
Karnyothirips flavipes (Jones)　黃腿長鬃蓟馬
捕虱管蓟馬
Chilocorus circumdatus (Gyllenhal)　紺緣唇瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silverstri　紅點唇瓢蟲
Telsimia sp.　寡節瓢蟲
Cybocephalus niponicus Endrödy-Younga　日本方頭甲
Aphytis huidongensis Huang　惠東黃矮小蜂
Archenomuc lauri Mercet　勞里短索矮小蜂
Coccobius azumai Tachikawa　花角矮小蜂
Encarsia citrinus (Mayr)　長纓恩矮小蜂(盾蚧長纓矮小蜂)
Encarsia amicula Viggiani et Ren　友恩矮小蜂

Encarsia sp. 突圓蚧麗矮小蜂
Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂
梨圓蚧扑虱矮小蜂

1092. **Hemiberlesia rapax** (Comstock) 狹唛盾蚧 (ASZI, 1986, 1:296; Chou, 1985, 2:300; Wu, 1994:628; Yunn, 1987:473)
=*Aspidiotus camelliae* Signoret, 1869:117. (*nec* Boisduval).
Aspidiotus rapax Comstock, 1881:307.
=*Aspidiotus conversus* Comstock, 1881:295.
=*Aspidiotus acuminatus* Targioni-Tozzetti, 1881:151.
=*Aspidiotus evonymi* Targioni-Tozzetti, 1888:420.
=*Diaspis circulatus* Green, 1896:5.
=*Aspidiotus* (*Hemiberlesia*) *tricolor* Cockerell, 1897:25.
=*Aspidiotus lacunae* Cockerell, 1899:22.
=*Hemberlesia argentina* Leonardi, 1911:237.
Hemiberlesia rapax, Ferris, 1943:10.
別 名：*榔子褐盾蚧*。
[Greedy scale]
寄 主：柑橘、芸香、梨、蘋果、桃、杏、山楂、枇杷、奈爾李、檳榔、橄欖、無花果、桑、桑屺、核桃、獼猴桃、龍眼、柿、葡萄、鼠李、檬果、番櫻桃、番石榴、栗、蘋婆、梔子、繡線菊、棟、茶、山茶、柳、白楊、冬青、槭、樺、肖乳香、漆樹、油桐、黃楊、樑、桉、相思樹、扁軸木、染料木、牧豆樹、葫蘆、Hohena, 連翹、白蠟樹、素馨、女貞、油橄欖、木犀、丁香、榆、懸鈴木、小檗、玉蘭、紫薇、金絲桃、岩薔薇、胡頹子、魷木、八角金盤、常春藤、欖仁樹、雞蛋花、夾竹桃、黃花夾竹桃、蒲葦、賽丁子、*Coprosma*, 仙人掌、秋海棠、木莓、九重葛、商陸、鳳仙花、大戟、裸實、草野牡丹、倒挂金鐘、桃葉珊瑚；山欖、*Citharexylon*, 馬纓丹、紫葳藤、黃鐘花、莢蓮、*Halleria*, 婆婆納、菁檻藍、菊、飛蓬、旋復花、*Bacchiaris*, 毛舌蘭、*Philippia*, 鶴望蘭、*Furcrea*, 蘆薈、蘆筍、朱蕉、新西蘭麻、玉茄、青蘿竹、刺竹、南美杉、蘇鐵。
分 佈：臺灣、福建、雲南、江蘇；日本、印尼、爪哇、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、歐洲、蘇聯、美國、墨西哥、巴西、阿根廷。
天 敵：*Thysanus merceti* Malenotti
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

1093. **Howardia biclavis** (Comstock) 擬桑盾蚧 (ASZI, 1986, 1:296; Chou, 1982, 1:124; Tao, 1999:91; Wu, 1994:630)
Chionaspis biclavis Comstock, 1883:98.
=*Aspidiotus theae* Green, 1890:13.
=*Chionaspis biclavis* var. *detecta* Mashell, 1895:49.
[Mining scale]
別 名：*雙錘盾蚧*。
寄 主：柑橘、無花果、核桃、栗、石榴、木瓜、檬果、咖啡、釋迦、蘋果、梨、檳榔、柿、人心果、羅望子、荔枝、海棠、胡椒、肉豆蔻、油橄欖、茶、山茶、石楠、石斑木、女貞、素馨、木槿、樟、金合歡、銀合歡、紫藤、羊蹄甲、烏梅、紫薇、蒲葦、雞眼藤、忍冬、朴、銀樺、巴豆、欖仁樹、丁子香、似梨木、山欖、刺罐木、大風子、腮脂樹、破布木、風車子、木麻黃、路枯馬木、大戟、鐵莧菜、杜英、紅爵床、秋海棠、黃蟬花、雞蛋花、黃鐘花、

比格諾藤、阿開木、庫盤尼、腫柄菊、刺葫蘆。 *Royena*, *Andira*, *Mundurea*, *Poinsetia*, *Genipa*, *Trichilia*, *Tabenaemontana*, *Microglossa*, *Clusia* 等。

分 佈：臺灣、廣東、雲南；日本、小笠原群島、印尼、印度、斯里蘭卡、摩里西斯、馬達加斯加、非洲、歐洲、美國、墨西哥、巴西、大小安的列斯島、特立尼特。

1094. **Insulaspis gloverii** (Packard) 長蠟盾蚧 (ASZI, 1986, 1:301; Chang, 1973:39; Chou, 1982, 1:174; Huang et Gao, 1996:155; Hun., 1992:196; Ma et al., 1995:118; Tao, 1999:92; Wang et Zhang, 1992:160; 1992:405; Wu, 1994:635; Yunn., 1987:465; Zhang, 1987[ed.] 1:72)

Coccus gloverii Packard, 1869, 1:527.

=*Mytiella sexspina* Hope, 1921:341.

Insulaspis gloveri, Borchsenius, 1963:

別 名：*長蛇蚧*、*長(牡)蠣蚧*、*柑橘長蠣蚧*。

[Glover scale]

寄 主：柑橘、橙、柚、檸檬、黎檬、金橘、枸橘、櫻桃、無花果、番石榴、橄欖、葡萄、鳳梨、椰子、茶、衛矛、梾、柳、棕櫚、木蘭、黃楊、玉蘭、綠蘭、虎刺黃楊、柳、金松、變葉木、假虎刺、杉樹等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、蘇聯、越南、緬甸、泰國、印度、斯里蘭卡、伊朗、以色列、土耳其、馬達加斯加、非洲、歐洲、美國、黑西哥、中美、南美、夏威夷、大洋洲、澳洲。

天 敵：*Scymnus hilaris* Motschulsky 小(黑)瓢蟲

Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂

Aphytis cornuaspis Huang 長蠣蚧黃矮小蜂

Encarsia auranti (Howard)

Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

Encarsia elongata (Dozier) 長恩矮小蜂

Encarsia inquiranda (Silverstri) 棘片蚧恩矮小蜂

Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂

Marlattiella prima Howard 長白蚧長棒矮小蜂

1095. **Insulaspis japonica** (Kuwana) (Tao, 1999:92)

Mytilaspis pomerum var. *japonica* Kuwana, 1902, 3, 3:89.

Insulaspis japonica Borchsenius, 1963:

寄 主：松屬、*Tsuga* (臺灣油松)、鐵杉。

分 佈：臺灣、雲南、山東、北京。

1096. **Insulaspis maskelli** (Cockerell) 馬氏蠣蚧 (Chou, 1982, 1:181; Tao, 1999:92; Yuong, 1982:220)

=*Mytilaspis pallida* var.? Maskell, 1895:46.

=*Mytilaspis newsteadi* Suc., 1895:

=*Mytilaspis pallida* var. *maskelli* Cockerell, 1897, 27:46.

=*Lepidosaphes pallida* Kirkaldy, 1902:111.

=*Lepidosaphes newsteadi* Ferris, 1938:SII-146 (nec Sulc).

Insulaspis maskelli, Borchsenius, 1963:

寄 主：櫻、粗榧、榆、羅漢松、柳杉、土杉、紫杉、雲杉、紅杉、圓柏、金松、冬青、槭。

分 佈：臺灣、福建、海南、浙江、內蒙古；朝鮮、日本、蘇聯、斯里蘭卡、夏威夷、美國。

1097. **Insulaspis pinea** Borchsenius (Tao, 1999:93)
Insulaspis pinea Borchsenius, 1964, 43:164, 168.
寄 主：松。
分 佈：香港。

1098. **Insulaspis pineti** (Borchsenius) 松長蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:297; Chou, 1982, 1:179; Tao, 1999:93)
Lepidosaphes pineti Borchsenius, 1958, 5:170, 175.
Insulaspis pineti Borchsenius, 1963:
別 名：*松小(牡)蠣蚧*。
寄 主：馬尾松。
分 佈：廣東、浙江、江蘇、山東、北京。

1099. **Insulaspis pini** (Mashell) 杉長蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:297; Tao, 1999:93)
Poliaspis pini Maskell, 1897, 33:242.
=*Mytilococcus pinorum* Lindinger, 1957:
Insulaspis pini Borchsenius, 1963:
別 名：*松(牡)蠣蚧*。
寄 主：榧、松屬之赤松、黑松、冷杉屬、羅漢松屬等植物、樅。
分 佈：臺灣、華南、江蘇、上海、山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、日本。

1100. **Insulaspis pinicolous** (Chen) (Tao, 1999:93)
Lepidosapphes pinicolous Chen, 1937:385.
Insulaspis pinicolous Borchsenius, 1963:
寄 主：松。
分 佈：山東、北京。

1101. **Insulaspis yanagicola** (Kuwana) 槐長蠣蚧 (ASZI, 1986, 1:297; Tao, 1999:93)
Lepiddossaphes yanagicola Kuwana, 1925, 2:19.
=*Lepidosaphes ataunicola* Siraiwa, 1939:
寄 主：核桃、桑、柳、赤楊、榆、白蠟樹、槐、衛矛。
分 佈：雲南、山東、山西。
天 敵：*Chilocorus kuwanae Silvestri* 紅點唇瓢蟲
Aleurodothrips fascipennis Franklin 斑翅管蓟馬
Aphelinus sp.
Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂
Aphytis lepidosaphes Compere 紫蠣蚧黃矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂
Coccobius fulvus (Compere et Annecke) 褐黃異角矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

1102. **Lepidosaphes conchiformoides** Borchsenius 梅蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:299; Chou, 1982, 1:174; Tao, 1999:95)
=*Lepidosaphes conchiformis* Kuwana, 1925:5. (*nec* Gmelin 1789).
Lepidosaphes conchiformoides Borchsenius, 1958:168, 174.
寄 主：蘋果、梨、李、梅、櫻桃(加害小枝和果實)。
分 佈：四川、湖北、山東、河北、遼寧；朝鮮。

1103. **Lepidosaphes coreana** (Borchsenius) (Chou, 1982, 1:161; Tao, 1999:95)
Paralepidosaphes coreana Borchsenius, 1962:865.
Lepidosaphes coreana, Chou, 1982:161.
寄 主：蘋果、楓、丁香。
分 佈：遼寧。

1104. **Lepidosaphes cupressi** Borchsenius 柏牡蠣蚧 (Chou, 1982, 1:173; Tao, 1999:95; Wang et al., 2000(1):30)
Lepidosaphes cupressi Borchsenius, 1958:169, 175. (*nec* Lindinger).
=*Lepidosaphes folicola* Borchsenius, 1961:252. (n. n. for *cupressi* Borchsenius)
寄 主：蘋果、柿、楊梅、胡頹子、馬尾松、柏、檜、玫瑰。
分 佈：福建、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、南京；日本。

1105. **Lepidosaphes latrochitinosa** Green 側骨(牡)蠣蚧 (Chou, 1982, 1:162)
Lepidosaphes laterochitinosa Green, 1925:41.
=*Lepidosaphes kamakurensis* Takahashi, 1929:75. (*nec* Kuwana, 1925).
=*Lepidosaphes blandhiae* Takahashi, 1931:379.
=*Parainsulaspis blandiae* Borchsenius, 1963:1163.
寄 主：柑橘、橡果、鳳梨、椰子、檳榔、番石榴、葡萄、茶、木薯、菠蘿、蘆筍、土茯苓、茴香、藤黃、厚皮香、木麻黃、夜香樹、雞蛋花、三葉膠、美玉蕊、雞腳常山、紅樹、海蓮、紫金牛、朱砂根、木橘、鈴木、杜莖山、楨楠、糖膠樹、鵝掌柴、蘇鐵、旅人蕉、鶴望蘭。
分 佈：臺灣、廣東、雲南；日本、菲律賓、馬來西亞、密克羅尼西亞、英國。

1106. **Lepidosaphes malicola** Borchsenius (Tao, 1999:95)
Lepidosaphes malicola Borchsenius, 1947:142.
=*Lepidosaphes kirgisica* Borchsenius, 1949:
寄 主：桃、馬尾松、柳。
分 佈：新疆。
天 敵：*Archenomus lauri* Mercet 勞里短索矮小蜂

1107. **Lepidosaphes okitsuensis** Kuwana 楨(牡)蠣蚧 (Chou, 1982, 1:165)
Lepidosaphes okitsuennsis Kuwana, 1925:3, 33.
寄 主：榧、粗榧、檜。
分 佈：浙江、山東；日本。

1108. **Lepidosaphes piniphilus** Borchsenius 南鱗盾蚧 (Chou, 1982, 1:164; Hun., 1992:196, Wang et Zhang, 1992:1160; Zhang, 1987[ed.] 1:72)
別 名：*松針長蠣蚧*、*松針牡蠣蚧*、*松細鱗盾蚧*。
寄 主：馬尾松、羅漢松。
分 佈：江西、湖南、廣州、四川、浙江、江蘇、南京；日本。

1109. **Lepidosaphes pinnaeformis** (Borché) 角眼(牡)蠣蚧 (Chou, 1982, 1:166)
Aspidiotus pinnaeformis Borché, 1851:111.
=*Mytilaspis machili* Maskell, 1893:230.
=*Lepidosaphes tuberculata* Malenotti, 1917:183.
=*Lepidosaphes cymbidicola* Kuwana, 1925:4, 27.
=*Lepidosaphes ezokihadae* Kuwana, 1932:147.
=*Lepidosaphes cinnamomi* Takahashi, 1933:48.
寄 主：柑橘、肉桂、樟、鉤、楨楠、紅楠、木蘭、八角、含笑、石斛、建蘭、卡

特利亞蘭、蘇鐵、野木瓜、膜葉交趾木、*Tetradymia*.

分 佈：臺灣、海南；日本、印尼、印度、歐洲、英國、蘇聯、美國、夏威夷、大安提里斯島。

天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1110. **Lepidosaphes pyrorum** Tang 梨蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:298; Chou, 1985, 2:384; Tao, 1999:95)

Lepidosaphes pyrorum Tang, 1977, 1:202.

別 名：*浙梨牡蠣蚧*。

寄 主：梨樹。

分 佈：山西。

1111. **Lepidosaphes salicina** Borchsenius 柳(牡)蠣蚧 (Chou, 1982, 1:159; Liu, 1982[ed.]:254-255; Tang et Li, 1989:151; Tao, 1999:95; Xiao, 1992:300)

Lepidosaphes salicina Borchsenius, 1958:171.

別 名：*柳蠣盾蚧*。

寄 主：核桃、棗、胡頹子、茶藨子、稠李等多種果樹，以及楊、柳、榆、樺、椴、白蠟、黃檗、紅瑞木、忍冬、衛矛、丁香、銀柳、薔薇。

分 佈：河南、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、蒙古。

天 敵：*Harmonia axyridis* (Pallas) 異色瓢蟲

Exochomus mongolis Bareovsky 蒙古光瓢蟲

方斑瓢蟲

Anabrolepis extranea Timberlake 柳蠣蚧跳小蜂

Aphytis proclia (Walker) 桑盾蚧黃金矮小蜂(體外寄生)

1112. **Lepidosaphes tubelorum** Ferris 東方蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:300; Chou, 1982, 1:161; Wang et Zhang, 1992:405; Yunn., 1987:463; Zhang, 1987[ed.] 1:72)

Lepidosaphes tubelorum Ferris, 1921:216.

別 名：*梣蠣(牡)蠣蚧*。

寄 主：梨、李、杏、櫻桃、海棠、葡萄、柿、棗、板栗、花椒、桑、楊、柳、冬青、連香樹、樺、槭、白蠟樹、厚朴、茶、山茶、丁香、屺木、繡球、山梔、燈籠樹、青莢蒾、鉤樟、烏桕。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、安徽、湖北、河南、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

1113. **Lepidosaphes ulmi** (Linnaeus) 榆蠣盾蚧 (ASZI, 1986, 1:300; Chao, 1982:99; Chou, 1982, 1:156; Hun., 1992:197; Liang et al., 1996, 22(3):33-34; Tao, 1999:96; Wang et Zhang, 1992:405; Wang et al., 2000(1):30-32; Wu, 1994:637; Yunn., 1987:463; Zhang, 1987[ed.] 1:73)

Coccus ulmi Linnaeus, 1758, 10, 1:455.

=*Diaspis linealis* Costa, 1835:21.

=*Aspidiotus conchiformis* Curtis, 1843:735.

=*Aspidiotus falciformis* Baetensprung, 1849:168.

=*Aspidiotus pomorum* Bouché, 1851:110.

=*Aspidiotus juglandis* Fitch, 1855:739.

=*Lepidosaphea conchiformis* Shimer, 1868:373. (*nec* Gmelin 1789).

=*Mytilaspis pomocorticis* Riley, 1873:73.

=*Mytilaspis ulmicorticis* Riley, 1874:246.

=*Mytilaspis vitis* Goethe, 1884:118.

=*Mytilaspis ulicis* Douglas, 1886:249.

=*Mytilaspis ceratoniae* Gennadios, 1895:CCLXXVII.

=*Mytilaspis pomorum* var. *candidus* Newstead, 1901:82.
=*Mytilaspis pomorum* var. *ulicis* Newstead, 1901:200.
=*Lepidosaphes ceratoniae* Fernald, 1903:307.
=*Lepidosaphes ulmi vitis* Fernald, 1903:317.
=*Lepidosaphes ulmi candida* Fernald, 1903:317.
=*Lepidosaphes vulva* Nel, 1933:441, 443.
=*Lepidosaphes ulmi-cottini* Koroneos, 1934:61, 80.
=*Lepidosaphes ulmi-rosae* Koroneos, 1934:65, 80.
=*Mytilococcus saliceti* Lindinger, 1936:149.
=*Lepidosaphes ulmi bisexualis* Schmutterer, 1951:129.
別 名：*牡蠣蚧*，*大蛞蚧*，*榆蠣籠蚧*。
[Oystrshell scale]
寄 主：梨、蘋果、杏、桃、李、梅、櫻桃、山楂、榅桲、酸栗、柑橘、柿、葡萄、核桃、板栗、棗、楊梅、無花果、銀杏、胡頹子、油橄欖、花椒、鼠李、沙棘、茶藨子、英遂、番櫻桃、茶、油茶、枸杞、玫瑰、楊、柳、女貞、樸、香椿、樟、楝、槭、洋槐、栾、榆、白榆、丁香、杞、樺、榛、椴、山毛櫸、小蘗、黃楊、漆樹、唐棣、雪實、木豆、金雀花、染料木、毒豆、鷹爪豆、荊豆、田菁、繡線菊、委陵菜、鐵線蓮、老鸛草、榆橘、大戟、蓖麻、黃櫨、七葉樹、山茱萸、木木、熊果、歐石南、喇叭茶、酸果蔓、越橘、忍冬、雪果、藥用白前、帚石楠、*Sarothamnus spartocytisus*。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、甘肅、寧夏、河南、山東、山西、河北、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、中東、歐洲、加拿大、美國、南美洲、澳洲等亦普遍分佈。
天 敵：*Chilocorus geminus* Zaslavskii 孿斑唇瓢蟲
Anabrolepis zetterstediti Westwood 榆蠣蚧跳小蜂
Archenomus lauri Mercet 勞里短索矮小蜂
Aphytis proclia (Walker) 桑盾蚧黃矮小蜂
Archenomus bicolor Howard 雙色短索矮小蜂
Azotus perspeciosus (Girault) 隻帶花角矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Encarsia gigas (Tshumakova) 黃胸摸虱矮小蜂

1114. **Leucaspis japonica** Cockerell 梨長白盾蚧 (Zhang, 1987[ed.] 1:73)
寄 主：蘋果、沙果、梨、桃、梅、李、杏、櫻桃、柑橘、無花果、棗、柿、茶、油茶、油桐、刺槐、黃楊、樸、榆、玫瑰。
分 佈：江西。

1115. **Leucaspis vitis** (Takahashi) 葡萄白盾蚧 (Chang, 1987:40; Chou, 1985, 2:200, 393; Tao, 1999:96)
Leucodiaspis vitis Takahashi, 1935, 66:19.
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

1116. **Lindingaspis ferrisi** McKenzie 橘林盾蚧 (Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:322; Tao, 1999:97)
Lindingaspis ferrisi McKenzie, 1950:100.
別 名：*林圓盾蚧*。
寄 主：柑橘、龍眼、荔枝、橄果、胡桐。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南。
天 敵：*Aphytis lindingaspis* Huang 費氏圓蚧黃矮小蜂

1117. **Lindingaspis rossi** (Mashell) 夾竹桃林盾蚧 (Chang, 1987:40; Chou, 1985, 2:321; Tao, 1999:97)

Aspidiotus rossi Mashell, 1891, 23:3.

=*Aonidiella subrossi* Laing, 1929:25.

=*Chrysomphalus niger* Laing, 1931:493.

別 名：*錢褐圓盾蚧*。

寄 主：柑橘、葡萄、椰子、香蕉、檬果、無花果、石榴、番石榴、梨、山楂、檳柠、胡頹子、酪梨、歐洲堅果、木莓、油橄欖、可可椰子、枸子、玫瑰、相思樹、羊蹄甲、角豆樹、染料樹、紫藤、沙橘、夾竹桃、忍冬、黃錦帶、六道木、梔子、梓樹、比格諾藤、夾竹桃、黃花夾竹桃、雞骨常山、馬錢子、丁香、女貞、素馨、柃、連翹、桃花珊瑚、常春藤、紅膠木、桉、紅千層、白千層、番櫻桃、玉蕊、木槿、車桑仔、槭、衛矛、南蛇藤、冬青、漆、肖乳香、黃楊、巴豆、粗糠柴、臭椿、海桐花、懸鈴木、繡球、馬櫪櫪、小蘗、芍藥、沙針、桑寄生、海葡萄、銀樺、哈克木、櫟、楊、柳、羅漢松、雪松、南美杉、柏、肖楠、樅、紅杉、金鍾柏、假連翹、海欖雌、海索草、蒿、婆婆納、倒挂金鍾、石竹、石斛、蘆筍、朱蕉、絲蘭、新西蘭麻、鳶尾、望鶴蘭、龍血樹、露兜、蘇鐵、大蘇鐵、大沙葉(*Pavetta*), *Asystavia*, *Stiphelia*, *Leptospermum*, 茼麻, *Capaniospsis*, *Diploglottis*, *Rhinocarpus*, *Ricinocarpus poinsettia*, *Exebergia*, 非洲棕 (*Khaya*), *Owenia*, *Cleistanthus*, *Coisya*, *Howea*, *Sebotia*, *Castanospermum*, *Stenocarpus*, *Banksia*, *Bukinghamia*, *Chaetochme*, *Ionopsis*, *Onciditus*, 蝶蘭、萬代蘭 (*Vanda*), *Lomandra* 發生在葉上。

分 佈：臺灣、福建；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、摩里西斯、馬德拉、非洲、地中海、歐洲、美國、南美、夏威夷、新喀里多尼亞、薩摩亞。

天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅緣唇瓢蟲

Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

1118. **Lopholeucaspis japonica** (Cockerell) 梨白片盾蚧 (ASZL 1986, 1:301; Borchsenius, 1960: ; Chen, 1996(1):45; Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:201; Shi et al., 1989-'90:82; Tao, 1999:97; Wu, 1994:639; Xiao, 1992:302; Zhang, 1985[ed.]:153-159)

Leucaspis japonica Cockerell, 1879, 8:53.

=*Leucaspis japonica* var. *darviniensis* Green, 1916:61.

別 名：*長白蚧*、*梨長白蚧*、*楊白片盾蚧*、*日本長白盾蚧*。

寄 主：柑橘、蘋果、梨、杏、櫻桃、桃、李、梅、山楂、核桃、柿、無花果、葡萄、楊、茶、油茶、月季、玫瑰、白玫瑰、薔薇、芍藥、繡球、牡丹、櫻花、木蘭、楓香、楓、槭、樺、楊桐、燈籠樹、金雀花、丁香、榆、小葉櫸樹、槐、榕樹、赤楊、吊鍾花、海桐花、櫟、石楠、皂角、花椒、黃刺玫、小葉女貞、冬日青衛矛。

分 佈：臺灣、建福、江西、廣東、四川、湖南、安徽、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、天津、北京、山西、遼寧；朝鮮、日本。

天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲

Coccobius fulvus (Compere et Annecke) 褐黃異角矮小蜂

Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

Marlattiella prima Howard 長白蚧長棒矮小蜂

Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂

1119. **Lopholeucaspis massoniae** Tang 松白片盾蚧 (Tang, 1980:203; Tao, 1999:97)

Lopholeucaspis massoniae Tang, 1980, 23(2):203.

寄 主：馬尾松。
分 佈：福建(廈門)。

1120. **Melanaspis smilacis** (Comstock) 菝葜黑盾蚧 (Chou, 1985, 2:323, 403; Tao, 1999:98)
Aspidiotus smilacis Comstock, 1883:69.
=*Aspidiotus marlatti* Parrott, 1899:282.
=*Aspidiotus bromiliae* Leonardi, 1899:175-7.
=*Targionia marlatti* Fernald, 1903:
=*Aspidiotus multiclavata* Green et Laing, 1923:126.
=*Pseudischnaspis anassurum* Lindinger, 1932:26.
Melanaspis smilacis, McKenzie, 1939:
寄 主：鳳梨、菝葜。
分 佈：臺灣；非洲、南歐、蘇聯、美國、中美洲。

1121. **Metaspidiotus stauntoniae** (Takahashi) 木瓜刺圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:302; Chou, 1985, 2:276; Zhang, 1987[ed.] 1:73)
Aspidiotus stauntoniae Takahashi, 1933:59.
=*Aspidiotus transparens* Kuwana, 1933:3, 18.
Metaspidiotus stauntoniae, Takagi, 1969:
別 名：*矛盾蚧*。
寄 主：柑橘、胡頹子、野木瓜、黃櫨、八角金盆、常春藤、桃葉珊瑚、榕、珍珠蓮(冰粉樹)、杜莖山、茉莉。
分 佈：臺灣、江西、浙江；日本。

1122. **Morganella longispina** (Morgan) 長毛盾蚧 (Chao, 1982:100; Chou, 1982, 2:278; Tao, 1999:98)
Aspidiotus longispina Morgan, 1889, 25:351.
=*Aspidiotus* (*Morganellas*) *maskelli* Cockerell, 1897:22.
=*Aspidiotus* (*Morganellas*) *longinus* Cockerell, 1897:24.
=*Aspidiotus longispina* var. *ornata* Maskell, 1898:225.
Morganella longispina Fernald, 1903:
=*Aspidiotus ornatus* Ferris, 1941:46.
寄 主：柑橘、檬果、無花果、咖啡、油橄欖、石榴、番木瓜、酪梨、楊桃、桑、歐洲堅果、蘋婆、胡頹子、茶、山茶、香椿、朴、含笑、懸鈴木、羊蹄蒾、皂莢、木槿、紫薇、桉、紅膠木、楞、素馨、女貞、夾竹桃、黃鐘花、石斛、*Gramatophyllum*, *Arthrocarpum*, *Calodendron*, *Cupania*, *Peddica*.
分 佈：福建、廣東、雲南、貴州、內蒙古；日本、印度、斯里蘭卡、澳洲、南非、中美洲、巴西、夏威夷、新喀里多尼亞、薩摩亞。

1123. **Mycetaspis personata** (Comstock) 冕盾蚧 (Chou, 1985, 2:319; Tao, 1999:99)
Aspidiotus personatus Comstock, 1883, 2:56, 66.
Mycetaspis personata McGillivray, 1921:
寄 主：檳榔、椰子、芭蕉、木菠蘿、無花果、釋迦、酪梨、杏、梨、柑橘、檬果、蜜果、葡萄、石榴、番櫻桃、楊梅、番石榴、油橄欖、棕、鳳尾蕨、水塔花、果子蔓、鐵蘭、花葉蘭、柳、月桂、山扁豆、刺桐、卡拔木、三葉膠、衛矛、山茶、瑞地亞木、散沫花、魚木、夾竹桃、黃花夾竹桃、牛角瓜、梔子、拉唐棕、南美稔、*Sabal*, *Aechmea*, *Caraguata*, *Apeiba*, *Myrteola* (在葉上)。
分 佈：香港；菲律賓、斯里蘭卡、新加坡、非洲、伊朗、德國、捷克、英國、中美、南美。

1124. **Mytilaspis conchifomis** (Gmelin) 梅牡蠣盾蚧 (Hun., 1992:197; Tsai, 1970:144; Xiao, 1992:303)

Coccus conchiformis Gmelin, 1789:2221.
=*Lepidosaphes conchiformioides* Borchsenius, 1958:
別 名：*沙棗密蠟蚧*，*蘋果密蠟蚧*。
寄 主：梨、蘋果、梅、櫻桃、柿、沙棗、月季。
分 佈：福建、四川、湖南、浙江、上海、安徽、湖北、青海、甘肅、寧夏、新疆、河南、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、波蘭。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
二星瓢蟲
多星瓢蟲
寄生蜂(寄生赤雌蚧，寄生率 15% 左右)

1125. **Neopinnaspis harperi** McKenzie 并蠟蚧 (Chou, 1982, 1:194; Tao, 1999:100)
Neopinnaspis harperi McKenzie, 1949:124.
寄 主：楊梅、無花果、核桃、柿、石榴、梨、杏、山楂、懸鉤子、酪梨、枸子、油橄欖、山花、石楠、玫瑰、素馨、桲、楊、柳、櫟、木蘭、冬青、黃楊、木槿、六道木、金合歡、雲實、金雀花、角豆樹、夾竹桃、海桐花、肖乳香、哈克木、鼠刺、槲寄生、扁櫸幹、加州桂、澳洲堅果、美洲茶、阿查拉、斯巴曼木、 *Laurocerasus*, *Lagunaria*, *Arbutus* 等。
分 佈：臺灣；日本、美國。

1126. **Octaspidiotus pinicola** Tang 濕地松蠟蚧 (Tang, 1984, 2:26; Tao, 1999:101)
Octaspidiotus pinicola Tang, 1984, 2:26.
寄 主：濕地松。
分 佈：雲南。

1127. **Octaspidiotus stauntoniae** (Takahashi) (Tao, 1999:101)
Aspidiotus stauntoniae Takahashi, 1933, 60:54.
寄 主：柑橘、榕樹等。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇。

1128. **Parainsulaspis laterochitinosa** (Green) 側堅付長蠟 (Chang, 1987:40; Hu, 1986:215; Tao, 1999:103)
Lepidosaphes laterchitinosa Green, 1925, 41:41.
=*Lepidosaphes kamakurensis* Kuwana,1925:
=*Lepidosaphes bladhiae* Takahashi, 1931:
Parainsulaspis laterochitinosa, Borchsenius, 1963:
寄 主：栗樹、葡萄。
分 佈：臺灣、海南、雲南。

1129. **Parainsulaspis piniphila** (Borchsenius) (Tao, 1999:103)
Lepidosaphes piniphilus Borchsenius, 1958, 8:171, 176.
Parainsulaspis piniphila Borchsenius, 1963:
寄 主：黑松、馬尾松等。
分 佈：廣東、澳門、江西、江蘇。

1130. **Parainsulaspis pitysophila** (Takagi) 松瘤盾蚧 (Hua., 1992:195; Tao, 1999:103)
Hemiberlesia pitysophila Takagi, 1970, 33:16.
別 名：*松瘤蠟盾蚧*，*金松牡蠟蚧*，*臺松副長蠟蚧*。
寄 主：濕地松、火炬松、金松。

分 佈：臺灣、廣東、廣西、湖南、浙江、江蘇；日本。

1131. **Paralepidosaphes coreana** Borchsenius (Tao, 1999:103)
Paralepidosaphes coreana Borchsenius, 1962, 41:865, 870.
=*Paralepidosaphes ulicola* Xu, 1981:
寄 主：蘋果、榆、玫瑰等。
分 佈：遼寧；朝鮮、日本。

1132. **Paralepidosaphes tubulorum** (Ferris) 茶蠟蠣盾蚧 (Hun., 1992:199; Tao, 1999:1103; Zhang, 1985[ed.]:159-161)
Lepidosaphes tubulorum Ferris, 1921, 12:216.
別 名：*茶牡蠣蚧*，*烏桕蠟蠣蚧*，*東方蠣盾蚧*。
寄 主：板栗、桑、茶、柳、楝、冬青、白蠟、丁香、繡球、烏桕。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、浙江、江蘇、河北；朝鮮、日本。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
Encarsia spp.
Nectria flammea (Tul.) Ding 腥紅菌

1133. **Parlagena buxi** (Takahashi) 黃楊粕片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:306; Tao, 1999:104)
Gymnaspis buxi Takahashi, 1936, 10:220.
=*Parlagena inops* McKenzi, 1945:
寄 主：棗、黃楊、瓜子金、衛矛、榆。
分 佈：浙江、江蘇、河北、北京、山西。

1134. **Parlatoreopsis chinensis** (Marlatt) 華盾蚧 (ASZI, 1986, 1:305; Chou, 1985, 2:244; Tang et Li 1989:117; Tao, 1999:104)
Parlatoria chinensis Marlatt, 1908, 16:30.
Parlatoreopsis chinensis, Lindinger, 1932:
別 名：*黑片盾蚧*，*中華糠片蚧*。
寄 主：蘋果、梨、杏、李、梅、枇杷、山楂、無花果、棗、核桃、胡頹子、花椒、油橄欖、石楠、黃櫨、枸子、玫瑰、繡線菊、火棘、樗、楝、柳、合歡、洋槐、決明、羊蹄甲、女貞、丁香、側柏、茶藨子、海桐花、衛矛、鹽膚木、黃連木、鼠李、英蒾、山茱萸、七葉樹、椴。
分 佈：臺灣、廣東、山西、山東、河北、北京、天津、遼寧、濟南、煙台。

1135. **Parlatoreopsis pyri** (Marlatt) 梨星片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:306; Chou, 1985, 2:245; Tang et Li 1989:118; Tao, 1999:104)
Parlatoria pyri Marlatt, 1908, 16:30.
Parlatoreopsis pyri, Lindinger, 1932:186.
別 名：*梨華盾蚧*，*梨糠片蚧*。
寄 主：梨、蘋果、李、沙果。
分 佈：福建、浙江、江蘇、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1136. **Parlatoria camelliae** Comstock 茶片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:304; Chang, 1973:33-34; Chang et al., 1982:100; Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:224; Hun., 1992:198; Tao, 1999:104; Zhang, 1987[ed.] 1:73)
Parlatoria pergandii var. *camelliae* Comstock, 1883:114.
Parlatoria camelliae Morrison, 1939:8, 31.
別 名：*山茶蚧*，*山茶片盾蚧*，*紅褐盾蚧*。
寄 主：柑橘、枸橘、無花果、橄果、李、葡萄、楊梅、油橄欖、茶、茶花、山茶、

素馨、木槿、楓、槭、楝、櫟、樟、犬樟、石楠、小葉、柃木、黃楊、冬青、木犀、杜鵑、崖石榴、榕、樟、茉莉、月桂、巴豆、蚊母樹、印度枳、變葉木、*Azalea*, 林投、魯花樹、報歲蘭。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、內蒙古；日本、印度。

1137. **Parlatoria cinerea** Doane et Hdden 灰片盾蚧 (Chou, 1985, 2:234; Tao, 1999:105; Tsai, 1970:144)

Parlatoria cinerea Doane et Hadden, 1909, 41:299.
=*Parlatoria pseudopyri* Kuwana et Muramatsu, 1932:8.
=*Parlatoria fluggeae* var. *brasiliensis* Cost Lima, 1934:134.
=*Parlatoria braziliensis* McKenzie, 1945:53.

寄 主：柑橘、檬果、玫瑰、素馨、梔子、莢蒾、九重葛(在葉反面)。

分 佈：臺灣、廣東、海南、浙江；日本、越南、印尼、泰國、印度、以色列、非洲南部、意大利、西班牙、美國、墨西哥、巴西、阿根廷。

1138. **Parlatoria crotonis** Douglas 巴豆片蚧 (Chang, 1987:40, Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:395; Tao, 1999:105; Zhang, 1987[ed.] 1:73)

Parlatoria proteus var. *crotonis* Douglas, 1887, 23:242.
=*Parlatoria pergandei* var. *crotonis* Cockerell, 1892:334.
=*Parlatoria greeni* Banks, 1906:222, 231.

別 名：*巴豆蚧*。

寄 主：檬果、柑橘、葡萄、椰子、巴豆、變葉木、榕、八角、素香、月桂、石斛、香葉樹、槭、*Inocarpus*.

分 佈：臺灣；菲律賓、馬達加斯加、幾內亞、意大利、英國、美國、巴拿馬、圭亞那、巴西、新喀里鼻尼亞、安的列斯群島。

1139. **Parlatoria desolator** McKenzie (Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:236; Tao, 1999:105)

=*Parlatoria proteus* var. *virescens* Mashell, 1897:241. (*nec* Maskell, 1897).
=*Parlatoria virescens* McKenzie, 1945:75.
Parlatoria desolator, McKenzie, 1960, 49:206.

寄 主：蘋果、梨、杏、桃、桃金孃。

分 佈：福建、香港、浙江；新西蘭。

1140. **Parlatoria fluggeae** Hall 一葉萩片盾蚧 (Chou, 1985, 2:235; Tao, 1999:105)

Parlatoria fluggeae Hall, 1929, 20:359.

寄 主：無花果、苧麻、桑椹、一葉萩。

分 佈：臺灣；非洲。

1141. **Parlatoria mytilaspiformis** Green (Tao, 1999:106)

Parlatoria mytilaspiformis Green, 1899, 2:104.

寄 主：柑橘、茶花。

分 佈：臺灣。

1142. **Parlatoria oleae** (Colvee) 橄欖片盾 (Chou, 1985, 2:232; Huang, 1990[ed.] 2:301; Tao, 1999:106)

Diaspis oleae Colvee, 1880, 14:40.
=*Parlatoria calianthina* Berlese et Leonard, 1896:346.
=*Parlatoria affinis* Newstead, 1897:97.
=*Diaspis squamosus* Newstead et Theobald, 1904: :
=*Parlatoria judaica* Bodenheimer, 1924:59.
=*Parlatoria pergandii* Bodenheimer, 1943. (*nec* Comstock).
=*Parlatoria morrisoni* Bodenheimer, 1944:82. (*nec* McKenzie).

寄 主：柑橘、蘋果、桃、檸檬、山楂、葡萄、楊梅、棗、柿、石榴、番櫻桃、毛櫻桃、核桃、無花果、桑、胡頹子、油橄欖、梅子、覆盆子、櫟、柳、楊、懸鈴木、桑蛇、月桂、槐、洋槐、皂莢、臭椿、漆樹、相思樹、黃楊、黃連木、冬青、女貞、梣、梓、檉柳、連翹、唐棣、歐查、小檗、十大功勞、含笑、薔薇、繡線菊、花楸、七葉樹、肖乳香、鼠李、岩薔薇、常春藤、山茱萸、丁香、素馨、夾竹桃、忍冬、雪果、英蓮、黃鐘花、醉魚草、錦雞兒、虎耳草、鐵線蓮、美洲寄生子、仙人掌、蘆筍、鈴蘭、新西蘭麻、假葉樹、紅門蘭、*Laurocerasus*, *Padus*.

分 佈：陝西、新疆；印度、巴基斯坦、阿富汗、北非、中東、歐洲、蘇聯、美國、巴西、阿根廷、澳洲。本種加害莖、枝及葉，爲害極嚴重。

天 敵：*Archenomus lauri* Mercet　勞里短索矮小蜂

Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂

1143. **Parlatoria pergandei** Comstock 糠片盾蚧 (ASZL 1986, 1:305; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(4):27; Chiu et Lee, 1982:171-177; Chiu et al., 1985:1-8; Chou, 1985, 2:237; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.]:207-208; Huang et Gao, 1996:155; Hun., 1992:198; Luo, 1993:84; Luo et Jin, 1995:85; Ma et al., 1995:118; Shi et al. 1989-90:82; Tang et Li 1989:114, Tao, 1999:106; Tong, 1995(2):40; Wang et Zhang, 1992:160; Wu, 1994:641; Zhang et Zhang, 1995(3):26)

Parlatoria pergandii Comstock, 1881:327.

=*Parlatoria sinensis* Maskell, 1897:241.

=*Parlatoria proteus* var. *pergandei* Cockerell, 1899:397.

別 名：*糠片蚧，灰點蚧，柑橘圓黑點蚧*。

[Chaff scale]

寄 主：柑橘、柚、橙、檸檬、蘋果、梨、梅、櫻桃、檸檬、無花果、柿、酪梨、腰果、椿、榕、茶、油茶、山茶、巴豆、薔薇、朴、月桂、樟、大葉黃楊、枸骨、十大功勞、印度枳、赫蘭、安修里昂 (*Anthurium*)、黃楊、衛矛、藤黃、紅千層、番櫻桃、桃葉珊瑚、木犀、木槿、茉莉、老鴉嘴、石筆木(*Tutcheria*)、*Severina*, 墨蘭、檜木、珍珠蓮、床頭紅等

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、西藏、四川、安徽、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、內蒙古、遼寧；日本、菲律賓、印尼、泰國、緬甸、印度、非洲、中東、歐洲、蘇聯、美國、中美洲、南美洲、澳洲、新西蘭。

天 敵：*Aphytis aonidiae* Mercet　長緣毛矮小蜂

Aphytis chrysomphali Mercet　黃矮小蜂

Aphytis mytilaspis Baron　雜食矮小蜂

Aphytis proclia Walker　桑盾蚧黃矮小蜂，短緣毛矮小蜂

Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂

Encarsia citrinus agillor (Berlese)　柑橘矮小蜂

Encarsia inquirenda (Silvestri)　糠蚧恩矮小蜂

Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli)　單毛長纓恩矮小蜂

Encarsia perniciosi (Tow.)

Marietta carnesi Howard　瘦柄花翅矮小蜂(斑翅矮小蜂)

Pteroptrix chinensis (Howard)　中國矮小蜂

1144. **Parlatoria pini** Tang 油松盾蚧 (Tang, 1984, 2:91; Tao, 1999:1106)

Parlatoria pini Tang, 1984, 2:91.

寄 主：油松。

分 佈：河北(北京)。

1145. **Parlatoria pinicola** Tang 杭州松片盾蚧 (Tang, 1984, 2:93; Tao, 1999:106)

Parlatoria pinicola Tang, 1984, 2:93.

寄 主：五葉松。

分 佈：浙江(杭州)。

1146. **Parlatoria piniphila** Tang 昆明松片盾蚧 (Tang, 1984, 2:81; Tao, 1999:106)

Parlatoria piniphila Tang, 1984, 2:81.

寄 主：松。

分 佈：雲南(昆明)。

1147. **Parlatoria proteus** (Curtis) 黃片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:305; Chao, 1982:100; Chou, 1985, 2:230; Hun., 1992:198; Tao, 1999:106; Wu, 1994:643; Yum., 1987:463; Zhang, 1987[ed.] 1:73)

Aspidiotus proteus Curtis, 1843:676.

=*Diaspis parlatoria* Targioni-Tozzetti, 1867:14.

=*Parlatoria orbicularis* Targioni-Tozzetti, 1868:735.

=*Parlatoria selenipedii* Signoret, 1869:450.

Parlatoria proteus Signoret, 1869:

=*Aspidiotus targionii* Del Guercio, 1894:148.

別 名：*黃片蚧*。

[Proteus scale]

寄 主：柑橘、金橘、蘋果、梨、桃、李、梅、柿、檳榔、梔子、海棗、楊梅、番櫻桃、檬果、葡萄、蒲桃、香蕉、桃金孃、蓬萊蕉、羅漢松、松、建蘭、石斛、棉、仙人指甲蘭、敦盛草、老鴉嘴、墨蘭、鳳尾蘭、蘇鐵、亮絲草、水塔花、喜林芋、蘆薈、萬年青、蜘蛛抱蛋、虎尾蘭、玉茹、龍葉蘭、竹芋、欖、犬樟、山梅花、茶、山茶、厚皮香、欖仁樹、變葉木、假葉樹、大澤米、榕樹、巴豆。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、香港、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、山東、河南、山西；日本、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、摩里西斯、非洲、歐洲、美國、黑西哥、中美洲、巴西。

1148. **Parlatoria theae** Cockerell 茶片盾蚧 (Chang, 1987:40; Chou, 1985, 2:227; Hun., 1992:198; Tao, 1999:107; Wang et al., 2000(1):30-32)

Parlatoria theae Cockerell, 1896, 1:21.

=*Parlatoria theae* var. *viridis* Cockerell, 1896:21.

=*Parlatoria theae* var. *euonymi* Cockerell, 1897:591, 592.

=*Parlatoria viridis* Cockerell, 1897:592.

=*Parlatoria pergandei* var. *dives* Bellio, 1929:234.

=*Parlatoria dives* McKenzie, 1945:53.

=*Parlatoria euonymi* Mckenzie, 1945:53.

別 名：*茶糠片蚧*。

寄 主：蘋果、梨、枇杷、柑橘、酪梨、柿、葡萄、山楂、茶蘼子、胡頹子、茶、日本茶、山茶、檵、楓、雀舌油、變葉木、大戟、冬青、正木、朴、木犀、丁香、扶芳藤、木槿、肩骨木、肖木瓜、玫瑰、枸杞、羅漢松、桃葉珊瑚、瑞木、大葉黃楊、木樨、棕竹、珊瑚樹。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、湖南、浙江、江蘇、山東、河南、寧夏、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、幾內亞、非洲北部、中東、歐洲、蘇聯、美國。本種廣泛分佈于世界各地，有一系列寄主物。

1149. **Parlatoria virescens** Mashell 梨片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:304; Tao, 1999:107)

Parlatoria proteus var. *virescens* Maskell, 1897, 29:300.
寄 主：梨、大葉黃楊、木槿、百合。
分 佈：臺灣、福建、廣東、澳門、浙江；日本。

1150. **Parlatoria yangyuanensis** Tang 鹽源片盾蚧 (Tang, 1984, 2:84; Tao, 1999:107)
Parlatoria yunnanensis Tang, 1984, 2:84.
寄 主：蘋果、枸樹。
分 佈：四川。

1151. **Parlatoria yunnanensis** Ferris 雲南片盾蚧 (Chou, 1985, 2:237; Tao, 1999:107)
Parlatoria yunnanensis Ferris, 1950, 15:76.
寄 主：李、桃、雲南皂莢、黃連木、鼠李、棕。
分 佈：雲南。

1152. **Parlatoria zizyphi** (Lucas) 黑片盾蚧 (ASZI, 1986, 1:304; Chang, 1958:117-118, 1973:34-35; Chang et Tao, 1963:34-47; Chao, 1982:100; Chen, 1995(3):37; Chiu et al., 1985:1-8; Chou, 1985, 2:222; Hu, 1986:222; Huang, 1990[ed.] 2:205-206; Huang et Gao, 1996:155; Huang et al., 1988, 15(1):15-19; Hun., 1992:199; Lei et al., 1993, 19(1):15-17; Li et Liao, 1990:68-70; NZWDI, 1981:1905; Tao, 1999:107; Tao et Chang, 1959:32-33; 1963:34-47; Tsai, 1970:144; Wang et Zhang, 1992:160; Wu, 1994: 646; Zhang, 1987[ed.] 1:73; Zhang et al., 1999(1):13;)
Coccus ziziphi Lucas, 1853, 3, 1:29.
=*Chkermes aurantii* Boisduval, 1867:338.
=*Parlatoria lucasi* Targoni-Tozzetti, 1868:735.
=*Parlatoria ziziphe* Osborn, 1898.
Parlatoria zizyphus Cockerell, 1900:349.
=*Parlatoria zizyphum* Froggatt, 1914:601.
=*Mytilaspis flavescens* Milazzo.
別 名：*黑點蚧*。
[Black parlatoria scale]
寄 主：柑橘、柚、枸橘、檸檬、代代花、棗、椰子、檳榔、油棕、茶、多青、女貞、變葉木、月桂、建蘭。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、河北，我國南部及華北地區。日本、菲律賓、越南、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、非洲、歐洲、蘇聯、美國、古巴、牙買加、阿根廷。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri　紅點唇瓢蟲
Chilocorus similis Rossi　小赤星瓢蟲(二星黑瓢蟲)
Scymnus (*Nephus*) *ryguus* Kamiya　二星小黑瓢蟲
Telsimia nigra (Weise)　裂胸寡節瓢蟲
Aphytis aonidiae Mercet
Aphytis chrysomphali (Mercet)　黃金矮小蜂
Aphytis proclis (Walker)　桑盾蚧黃矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂
Encarsia elongata (Dozier)　長恩矮小蜂
Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli)　單毛長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard)　瘦柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard)　中國矮小蜂
Aschersonia aleyrodis Webbar　菌
Aschersonia marginata Ell. et Ev.　菌
Cephalosporum lecanii Zimmerman　菌
Verticillis parlatorinae Sawada　菌

1153. **Phenacaspis ericacea** Ferris 杜鵑菲盾蚧 (Tao, 1995: Young, 1982:247)

Phenacaspis ericacea Ferris, 1953:

寄 主：柑橘、杜鵑、來江藤、木犀花、越橘。

分 佈：廣東、雲南。

1154. **Phenacaspis kentiae** Kuwana 分體臀凹盾蚧 (ASZI, 1986, 1:306)

寄 主：椰子、桄榔、山檳榔、棕櫚、茶、山茶、烏飯樹、木犀、油杉。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、安徽、浙江、江蘇、陝西、山西；日本。

1155. **Phenacaspis litzeae** (Green) (Tao, 1995:)

Chionaspis litzeae Green, 1896:3.

Phenacaspis litzeae, Fernald, 1903:

寄 主：柑橘、無花果、竹、蘭(*Cymbidium*)。

分 佈：江西。

1156. **Phenacaspis subcorticalis** (Green) 木豆菲盾蚧 (Young, 1982:247)

寄 主：菠蘿蜜、木豆。

分 佈：廣東。

1157. **Phenacaspis vitis** (Green) 葡萄菲盾蚧 (Young, 1982:248)

Chionaspis vitis Green, 1896:3.

寄 主：葡萄。

分 佈：臺灣。

1158. **Pinnaspis aspidistrae** (Signoret) 柑橘并盾蚧 (ASZI, 1986, 1:307; Cao et Peng, 1993:24; Chang, 1973:40; Chao, 1982:101; Chou, 1982, 1:92; Hun., 1992:199; Luo et al., 1996:55; Tang et Li 1989: 156; Tao, 1999:108; Wu, 1994: ; Zhang, 1987[ed.](1):74)

Chionaspis aspidistrae Signoret, 1869, (4), 9:443.

=*Chionaspis brasiliensis* Signoret, 1869:444.

=*Chionaspis latus* Cockerell, 1869:21.

Pinnaspis aspidistrae, Lindinger, 1912:

=*Pinnaspis aphiopogonis* Takahashi, 1952:11.

=*Pinnaspis muntingi* Takagi, 1965:446.

別 名：*根蚧，褐色蚧，葉蘭蚧，梨形蚧，蜘蛛抱卵盾蚧，橘長盾蚧，蘇鐵褐點盾蚧*。

[Fern scale]

寄 主：柑橘、檸果、山楂、無花果、椰子、檳榔、釋迦、芭蕉、胡椒、辣椒、苧麻、蓖麻、木槿、冬青、楝、金合歡、巴豆、山扁豆、刺桐、柃木、鉤藤、馬藍、葉下珠、使君子、棉桐、白珠樹、馬槟榔、醉蝶花、蜘蛛抱蛋、鳥尾、萬年青、麥冬、菝葜、文殊蘭、白子蓮、沿階草、龍血樹、鶴望蘭、棕竹、海芋、石柑子、卷柏、一葉蘭、蘇鐵、果角澤米、三叉蕨、鐵角蕨、鱗毛蕨、水龍骨、赤蒼藤、魚尾葵、菖蒲、墨蘭、建蘭、茶、山茶、樟樹、棕竹、 *Fittonia*, *Hyppeastrum*, *Arecastrum*, *Kentia*, *Blechnum*, *Davallia*, *Cympopteris*, *Nephrolepis*, *Platycerium*.

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、四川、湖南、湖北、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古；日本、菲律賓、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、蘇聯、美國、

中美洲、南美洲、澳洲、夏威夷、大洋洲。

天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1159. **Pinnaspis buxi** (Bouché) 黃楊并盾蚧 (ASZI, 1986, 1:307; Chao, 1982:101; Chou, 1982, 1:96; Hun., 1992:200; Tao, 1999:109)

Aspidiotus buxi Bouché, 1851, 12:111.
=*Mytilaspis pandani* Comstock, 1881:324.
=*Pinnaspis bambusae* Cockerell, 1893:157.
=*Pinnaspis pandani* var. *alba* Cockerell, 1894:307.
=*Fiorinia pandamiana* Del Guercio, 1894:181.
Pinnaspis buxi Newstead, 1901:
=*Pinnaspis siphonodontis* Cockerell et Robinson, 1915:110.
=*Hemichionaspis pseudaspidistrae* Green, 1916:58.

別 名：*黃楊盾蚧*、*黃梨蚧*、*黃楊褐點盾蚧*。

寄 主：椰子、檳榔、無花果、可可、木菠蘿、石榴、茶、黃楊、木槿、臭椿、油桐、含笑、朴、黃竹桃、石柑子、山扁豆、羅望子、露兜、莎草、竹、海棗、棕竹、酒椰子、棕櫚、亮絲草、海芋、安祖花、蓬萊蕉、喜林芋、竹芋、龍血樹、肖鳳尾、鐵角蕨、 *Anubias*, *Trinax*, *Dictyosperma*, *Siphoroden*, *Trichilia*, *Sandoricum*, *Hardwickia*, *Heeliconia*, *Prienium*, *Rhodospatha*, *Homaromene*.

分 佈 ：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、湖南、山東、北京；日本、菲律賓、斯里蘭卡、馬達加斯加、非洲、歐洲、蘇聯、美國、中美洲、己西、幾內亞澳、夏威夷。

天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1160. **Pinnaspis strachani** (Cooley) 棉并盾蚧 (Chao, 1982:101; Chou, 1982, 1:95; Hu, 1986:218; Tao, 1999:110; Wu, 1994:650)

Hemichonaspis minor var. *strachani* Cooley, 1899, 45:54.
=*Hemichionaspis marchali* Cockerell, 1902:82.
=*Hemichionaspis townsendi* Cockerell, 1905:135.
=*Chionaspis* (*Hemichionaspis*) *aspidistrae* var. *gossipi* Newstead, 1906:74.
=*Hemichionaspis proxima* Leonardi, 1914:193.
=*Pinnaspis minor strachani* Kuwana, 1926:36, 40.
=*Pinnaspis temporaria* Ferris, 1942:SIV-407.
=*Pinnaspis marchali* Hall, 1946:529, 550.
=*Pinnaspis gossypii* Hall, 1946:529, 550.
Pinnaspis strachani Ferris et Rao, 1947:29, 39, 44.
[Lesser snow scale]

寄 主：無花果、檬果、柑橘、荔枝、釋迦、菠蘿蜜、椰子、棉、辣椒、油桐、油椰、棕櫚、木槿、佛手瓜、括蔞、黃竹桃、雞蛋花、楝、合歡、紫藤、山扁豆、金合歡、牧豆樹、羊蹄甲、山欖、珊瑚藤、無患子、車桑子、紫玉盤、牛角瓜、紫芭苔、輕木、蛇婆子、老鸛草、天竺葵、薯芋、建蘭、石斛、仙人指甲蘭、杓蘭、虎尾蘭、龍舌蘭、沿階草、朱蕉、蘆筍、蘆薈、棕竹、巴西棕、蘇鐵、同心結、火焰蘭、 *Psiadia*, *Lophira*, *Thelypodium*, *Trichogrotis*, *Phalaenopsis*, *Rhychostylis*, *Verschaffeltia*, *Howea*, *Chamerops*.

分 佈：臺灣、福建、海南；日本、菲律賓、印尼、泰國、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加、歐洲、蘇聯、美國、墨西哥、西印度、巴拿馬、巴西、阿根廷、夏威夷、新加里多尼亞、斐濟、東加群島、塔希塌。

天 敵：*Coccobius fulvus* (Compere et Annecke) 褐黃異角矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Encarsia berlesei (Howard) 桑盾蚧恩矮小蜂

1161. **Pinnaspis theae** (Mashell) 茶并盾蚧 (Chao, 1982:101; Chou, 1982, 1:94; Tao, 1999:110; Wu, 1994:652; Zhang, 1985[ed.]:163)
Chionaspis aspidistae var. *theae* Mashell, 1891:60.
=*Chionaspis prunicola* var. *theae* Mashell, 1896:398.
=*Chionaspis separata* Green, 1900:5.
=*Aulacaspis pentagona theae* Fernald, 1903:235.
Pinnaspis theae Takahashi, 1929:
別 名：*茶梨蚧*，*茶紫長蚧*，*茶片蚧*，*茶細蚧*。
寄 主：柑橘、石榴、茶、山茶、山鬱、朱蕉。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北；印度、錫金、斯里蘭卡。

1162. **Pinnaspis uniloba** (Kuwana) 單瓣褐點盾蚧 (ASZI, 1986, 1:307; Yunn., 1987:467; Zhang, 1987[ed.] 1:74)
Mytilaspis uniloba Kuwana, 1909:156.
=*Pinnaspis simplex* Ferris, 1921:
Pinnaspis uniloba, Takahashi, 1929:
寄 主：柑橘、柚、檸檬、釋迦、檳榔、合歡、黃檀、皂角、木蘭、葛藤、羊蹄甲、秦椒、柃樹、茶、山茶、大頭茶、桂花、白蠟樹、洋橄欖、野茉莉、九里香、多青、白珠樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、青海、湖南、湖北、浙江、江蘇、陝西、山西、河北、遼寧；印度、夏威夷。

1163. **Pseudaonidia duplex** (Cockerell) 蛇眼臀網盾蚧 (ASZI, 1986, 1:309; Chao, 1982:101; Chen, 1996, 22(2):27; Chou, 1985, 2:249; Hun. 1992:201; Ma et al., 1995:118; Wang, 1983:25-28; Wang et Zhang, 1992:160, 1992:406; Wang et al., 2000(1):30-32; Wu, 1994:654; Xiao, 1992:306; Yunn.1987:470; Zhang, 1985[ed.]:161-162; Zhang, 1987[ed.] 1:74
Aspidiotus theae Mashell, 1891:59. (*nec* Green).
Aspidiotus duplex Cockerell, 1896:20.
=*Pseudaonidia rhododendri* Fernald, 1903:
=*Pseudaonidia rhododendri* thearum Fernald, 1903:283.
=*Pseudaonidia thearum* Fernald, 1903:283.
=*Pseudaonidia theae* MacGillivray, 1921:454.
=*Pseudaonidia trilabitiformis* Borchsenius, 1935:19. (*nec* Green).
別 名：*樟網盾蚧*，*樟蚌圓盾蚧*，*茶蚌圓盾蚧*，*網紋盾蚧*，*蛇眼(褐)蚧*，*樟盾蚧*。
[Camphor scale]
寄 主：柑橘、柚、橙、佛手、柿、無花果、蘋果、沙果、杏、梨、桃、李、楊梅、葡萄、柿、栗、棗、茶、山茶、油橄欖、油桐、石楠、樟、月桂、漆樹、女貞、含笑花、素馨、薔薇、杜鵑、牡丹、蘭草等。附著于樹幹、葉面及果實上。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京；日本、印度、斯里蘭卡、印尼、蘇聯、美國、阿根廷、夏威夷。
附 註：本種爲遠東原產，侵入美國南部後，加害 200 餘種植物。不少國家列爲檢疫對象。
天 敵：*Chilocorus kuwanae* Silvestri 紅點唇瓢蟲
蚧生叢赤殼菌
Comperiella unifaciata Ishii 單條巨角跳小蜂
Anabroleps sp. 無軟鱗跳小蜂
粉蚧短角跳小蜂
Azotus perspeciosus (Girault) 雙帶花角矮小蜂

Coccobius flavicornis (Compere et Annecke)　黃鞭異角矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard)　中華四節矮小蜂

1164. **Pseudaonidia trilobitiformis** (Green) 爐臂網盾蚧 (Chao, 1982:101; Chou, 1985, 2:250; Hu, 1986:223; Tsai, 1970:144; Wang et al., 2000(1):30-32; Zhang, 1987[ed.] 1:74)
Aspidiotus trilabitiformis Green, 1896:41.
=*Aspitiotus darutyi* Charmoy, 1898:278.
別　名：*三葉網紋盾蚧*，*可可三葉圓蚧*，*蚌形(褐)蚧*，*蚌盾蚧*。
寄　主：柑橘、龍眼、無花果、檬果、椰子、枇杷、番石榴、楊梅、釋迦、酪梨、波蘿蜜、番櫻桃、葡萄、石榴、李、柿、棗、咖啡、可可、百香果、茶、山茶、榕樹、茄苳、樸樹、楝、檀香、月桂、桕思樹、羊蹄甲、合歡、油桐、木果楝、變葉木、麻風樹、檳如、木槿、紅厚殼、刺籬木、木風子、欖紅樹、槍彈木、尖葉木、柚木、玫瑰樹、風箱樹、黃竹桃、玫瑰、木姜子、山扁豆、蝶豆、豬屎豆、九里香、肖乳香、猴面包、紅毛丹、玉蕊、長春花、龍船花、辣椒、球果紫薑、大戟、龍舌蘭、石柑子、蓬萊蕉、姜果棕、炮彈木、十萬錯(*Asystacia*), *Uvaria*, *Sobvolia*, *Dictyosperma*, *Hura*, *Corthocarpus*, *Dyrostegia*.
分　佈：臺灣、澎湖島、福建、江西、廣東、澳門、海南、雲南、四川、浙江、陝西；日本、菲律賓、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、留尼旺島、馬達加斯加、非洲、馬烏里基島、古巴、波多利各、小安提利斯基島、巴西、新加利多尼亞。
附　註：本種在熱帶地區極爲普通，不僅加害樹枝，也加害葉及果實。
天　敵：*Aphytis lingnanensis* Compere　嶺南黃矮小蜂
Coccobius flavicornis (Compere et Annecke)　黃鞭異角矮小蜂
Marietta carnesi (Howard)　瘦柄花翅矮小蜂

1165. **Pseudaulacspis cockerelli** (Cooley) 柯氏盾蚧 (ASZL 1986, 1:306; Chang et al., 1982:100; Chou, 1982, 1:146; Ma et al., 1995:119; Tang et Li 1989:182; Tao, 1999:112; Zhang, 1987[ed.] 1:73))
Chiomaspis cockerelli Cooley, 1897, 29:278.
=*Chiomaspis ancubae* Cooley, 1897:
=*Chiomaspis dilatata* Green, 1898: 148.
=*Chionaspis aucubae* Cooley, 1897:279.
=*Chionaspis dilatata* Green, 1898:148.
=*Phenacaspis* (*Phenacaspis*) *ntalensis* Cockerell, 1902:25.
=*Phenacaspis eugeniae* Ferris, 1921:213. (*nec* Mashell).
=*Chionaspis miyakoensis* Kuwana, 1931:649, 657.
=*Phenacaspis eugeniae* var. *sandwicensis* Fullawa, 1932:96, 103.
=*Trichomyticlus aucubae* Lindinger, 1933:165.
=*Chionaspis syringae* Borchsenius, 1938:165.
=*Chionaspis hattorii* Kanda, 1941:185.
=*Chiomaspis eugeniae* Maskell,
=*Phenacaspis natalensis* Cockerell, 1902:
=*Chiomaspis miyakoensis* Kuwana, 1931:
=*Phenacaspis* var. *sandwicensis* Fullaway, 1932:
=*Chiomaspis syringae* Borchsenius, 1938:
=*Chiomaspis hottori* Kanda, 1941:
=*Phenacaspis sandwicensis* Zimmermann, 1948:386.
=*Chionaspis akebiae* Takahashi, 1952:8.
=*Phenacaspis syringae* Balachowsky, 1954:351.
=*Pseudaulacaspis biformis* Takagi, 1956: 113, 114.
=*Phenacaspis ferrisi* Mamet, 1959: 384.

Pseudaulacaspis cockerelli, Takagi, 1970:

別 名：*白長盾蚧*，*全腎臀凹盾蚧*。

寄 主：橡果、無花果、番櫻桃、蒲桃、獼猴桃、桑、椰子、芭蕉、野蕉、鳳尾蘭、重陽木、榕樹、蓼、玉蘭、肉豆蔻、油桐、丁香、玉蘭、白蘭花、山茱萸、含笑、夾竹桃、雞蛋花、八仙花、木通、珊瑚樹、柃木、楓香、楠樹、昆蘭樹、莢蓬、珊瑚樹、榆、萬年青、茶、山茶、杜鵑、通草、繡球、土沉香、八角金盤、冬青、桃葉珊瑚、三葉膠、交讓木、昆欄樹、美樹、合柱金絲桃、柃木、重陽木、土沉香、絡石、蓼、鶴望蘭、玉茄、山管蘭、喜林芋、露兜、東鳶尾、散尾葵。 *Willughbeia*, *Canangium*, *Eurycles*, *Neodipsis*.

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、湖北、內蒙古；日本、琉球、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、馬達加斯加、南非、南羅德西亞、美國、蘇聯；大洋洲、夏威夷群島。

1166. **Pseudaulacaspis kiushiuensis** (Kuwana) 櫟擬輪蚧 (Chou, 1985, 2:379; Tao, 1999:112)

Phenacaspis quercus Kuwana, 1931:2, 3. (*nec* Comstock)

=*Chionaspis kuwanai* Takahashi, 1953:50, 56.

=*Phenacaspis saitamensis* Ferris, 1955:51. (*nec* Kuwana).

寄 主：栗、櫟、栲。

分 佈：臺灣。

1167. **Pseudaulacaspis pentagona** (Targioni-Tozzetti) 桑白盾蚧 (ASZI, 1986, 1:309; Borchsenius, 1960: 216; Chang, 1972:81-86; 1987:40; Chang et al., 1981:286; Chen et Wang, 1987:154; Chou, 1982, 1:142; Chu, 1996(4):50; Di, 1993(1):34-35; Ge et Yan, 1995:42; Ge et Yan, 1996(1):48; Guo, 1999(3):13; Guo, 1999(4):40; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.] 2:172-175; Huang, 1998(1):53; Huang et Gao, 1996:233; Hun., 1992:202; Jia, 1995(2):49; Jiang, 1986:19-20; Li, 1998(2):20; Li et al., 1997:47; Lian, 1998(1):36; Lin, 1996(2):57; Lin et al., 1995(2):29-30; Liu, 1995:48-49; Liu et Du, 1998:46; Ma, 1998:47; Ma et al., 1995:118; NZWDI, 1981:1761; Qu et Zhou, 1997(2):25; Song et al., 1991:15; Sun, 1984:379-382; Sun et al., 1998(2):73; Suzhou CS., 1985:233-235; Tang et Li 1989:183; Tao, 1999:113; Wang et Zhang, 1992:161; 1992:405; Wang et al., 1997:22-23; Wei, 1996(4):25-26; Wu, 1994:656; Xiao, 1992:307; Ye, 1993, 19(4):28-29; Zhang, 1987[ed.] 1:74; Zhang et al., 1993(2):25-26; Zhang, 1996(4):47; Zhao et Meng, 1998(4):40; Zhao et al., 1997:190; 193-197; Zheng, 1982:233-235; Zhu, 1995:40-41)

Diaspis pentagona Targioni-Tozzetti, 1886:1 .

=*Diaspis amygdali* Tryon, 1889:89.

=*Diaspis lanatus* Cockerell, 1892:137.

=*Diaspis patelliformis* Sasaki, 1895:107.

=*Aspidiotus vitiensis* Maskell, 1895:40.

=*Chionaspis prunicola* Maskell, 1894:49.

=*Diaspis lanata* Green, 1896:4.

=*Diaspis gerannii* Maskell, 1896:299.

=*Diaspis amygdali* var. *rubra* Maskell, 1898:228.

=*Aulacaspis pentagona rubra* Fernald, 1903:235.

=*Aulacaspis pentagona auranticolor* Carnes, 1907:160.

=*Pseudaulacaspis simplex* Takagi,

Pseudaulacaspis pentagona, Ferris, 1939:109.

=*Diaspis rubra* Scott, 1952:35.

別 名：*桑蚧*，*桑盾蚧蠊*，*桑擬輪蚧*，*油桐蚧*，*桑白蚧*，*黃點介殼蟲*，*桑盾蚧*，*桃白蚧*。

[White peach scale]

寄 主：銀杏、桃、李、梅、杏、梅、梨、蘋果、櫻桃、檻柽、葡萄、柿、核桃、枇杷、無花果、栗、酸栗、柑橘、酸橙、椰子、橡果、橄欖、可可、百香果、番木瓜、胡頹子、番石榴、蘋婆、咖啡、桑、芭蕉、茄子、茶、山茶、油茶、棉、油桐、泡桐、梓、梧桐、懸鈴木、香椿、花椒、桂花、樟、白蠟樹、木麻黃、楊、白楊、柳、杞柳、榛皮、烏桕、苦楝、榆、黃楊、泡桐、皂莢、

金合歡、丁香、朴、樺、柞、楓、槭、槐、女貞、楓楊、木槿、芙蓉、鹿麻、烏桕、柿、玫瑰、枸、菜豆、菊分草、天竺葵、澤米、常山、七葉樹、刺籬木、臭椿、桑寄生、鐵線蓮、翠雀、芍藥、小蘗、高涼菜、景天、茶藨子、羊踟、黃花稔、金絲桃、倒挂金鐘、紫馨、夾竹桃、雞蛋花、牛角瓜、牛皮消、娃兒藤、銀葉花、牽牛、厚殼樹、天芥菜、紫珠、假敗醬、假紫荊、玄參、婆婆納、紫威藤、黃鐘花、黃蟬花、米甘草、鶴望蘭、棕、羊齒、蘇鐵、落地生根、棕櫚、 *Angelonia, Asystasia, Bouvardia, Guazmua, Kennedya, Messersmidia, Poinsettia, Quinaria, Rhycospernum, Sarothamnus.*

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、爪哇、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、摩里達斯、馬達加斯加、非洲、中東、歐洲、蘇聯、美洲、巴拿馬、西印度群島、巴西、阿根廷、澳洲、新西蘭、夏威夷、斐濟、新加利多尼亞、喀羅林群島、關島。

天 敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama　晉草蛉
Adalia bipunctata Linnaeus　二星瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope　黑緣紅瓢蟲
Chilocorus similis Rossi
Chilocorus kuwanae Silvestri　紅點唇瓢蟲
Chilocorus renipustulatus Scriba
Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga　日本方頭甲
癭蚊　Cecidomyiidae　癭蚊科
Aphelinus sp.
Aphytis chrysomphali (Mercet)　黃金矮小蜂
Aphytis proclia (Walker)　桑盾蚧矮小蜂
Archenomus bicolor Howard　雙色短索矮小蜂
Archenomus calvus Viggiani et Ren　裸帶短索矮小蜂
Archenomus orientalis Silverstri　東方短索矮小蜂
Archenomus processus Huang　突并胸短索矮小蜂
Azotus perspeciosus (Girault)　雙帶花角矮小蜂
Coccophagoides kuwanae (Silvestri)　桑名類食蚧矮小蜂
Encarsia berlesi (Howard)　桑蚧矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂(盾蚧長纓矮小蜂)
Encarsia aurantii (Howard)　紅圓蚧金黃矮小蜂
Encarsia berlesei (Howard) (日本)(ind. to Europe)
Encarsia smithi (Silvestri)
Marietta carnesi (Howard)　腹柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard)　中華四節矮小蜂
桑蚧寡節小蜂　Eulophidae　釉小蜂科

1168. **Pseudaulacaspis takahashii** (Ferris) 柿擬輪蚧 (Chen, 1982, 1: 148; Tao, 1999: 114)
Phenacaspis takahashii Ferris, 1955, 20: 52.
Pseudaulacaspis takahashii, Tsakagi, 1970:
寄 主：柿。
分 佈：臺灣。

1169. **Quadraspidiotus cryptoxanthus** (Cockerell) 栗笠盾蚧 (Chou, 1985, 2:314; Hun., 1992:202; Tao, 1999:114)

Aspidiotus cryptoxoanthus Cockerell, 1900, 9:71.
Quadraspidiotus cryptoxanthus, McGillivray, 1921:411.
別 名：*栗笠圓盾蚧*。
寄 主：板栗、櫟類、柳杉(冷杉)。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、安徽、山東；日本。

1170. **Quadraspidiotus ostraeformis** (Curtis) 笠齒盾蚧 (ASZI, 1986, 1:310; Chou 1985, 2:312; Tang et Li 1989:138; Tao, 1999:115; Wu, 1994:658; Zhang et Zhao, 1984:31-32)

Aspidiotus ostraeformis Curtis, 1843, 46:805.
=*Aspidiotus betulae* Baerespnung, 1849.
=*Aspidiotus hippocastani* Signoret, 1869:136.
=*Aspidiotus oxyacanthae* Signoret, 1869:137.
=*Aspidiotus ostreaformis* var. *obiongus* Goethe, 1899:16 .
=*Aspidiotus ostreaformis magnus* Goethe, 1899:17.
=*Aspidiotus scutiformis* Goethe, 1899:18. (*nec* Cockerell).
Quadraspidiotus ostareformis, MacGillivray, 1921:
=*Aspidiotus magnus* Ferris, 1941:45.
=*Aspidiotus oblongus* Ferris, 1941:46.
別 名：*蠣形笠盾蚧*。
[European fruit scale]
寄 主：蘋果、梨、李、梅、桃、山桃、山楂、檸檬、櫻桃、無花果、桑、油橄欖、白楊、樺、椈、杞、櫸、楓、槭、古葉樹、茶、楮、榆、櫟、法國梧桐、金雀花、錦雞兒、皂莢、花楸、玫瑰、枸子、貼梗海棠、鼠李、椴、山茱萸、丁香、海棗、冷杉、*Calluna*, *Pavia*.
分 佈：安徽、陝西、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、北非、中東、歐洲、北美、澳洲。
天 敵：*Orius* spp. 小花蝽
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲
Encyrtidae 跳小蜂科
Archenomus bicolor Howard 雙色短索矮小蜂
Archenomus lauri Mercet 勞里短索矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂

1171. **Quadraspidiotus perniciosus** (Comstock) 梨圓盾蚧 (Chao, 1982:102; Chen et Wang, 1987:129-131; Chou, 1985, 2:316; Fang et Chang, 1994(2):48; Huang, 1994(4):38; Huang et Gao, 1996:234; Hun., 1992:202, Li, 1995:29-30; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Sun, 1995:39; Tang et Li 1989:138; Tao, 1999:115; Wang, 1994, 11(4):224; Zhang, 1987[ed.] 1:75; Zou et al., 1995(4):8)

Aspidiotus perniciosus Comstock, 1880:304.
=*Aonidia fusca* Maskell, 1895:43.
Quadraspidiotus perniciosus, Ferris, 1938:SII-259.
別 名：*梨笠盾蚧*、*梨圓蚧*。
[San Jose scale]
寄 主：梨、蘋果、梅、桃、李、杏、沙果、檸檬、山楂、櫻桃、海棠、枇杷、棗、葡萄、柑橘、枳殼、柿、核桃、石榴、銀杏、楊梅、栗、無花果、草莓、酪梨、獼猴桃、核桃、胡頹子、桑、檳榔、油棕、茶、山茶、油橄欖、胡椒、月桂、花椒、枸杞、油桐、蓖麻、茄、胡蘿蔔、大麻、苧麻、黍、蘆筍、菠蘿、紫杉、雪松、扁柏、落葉松、雲松、松、落羽杉、金鍾柏、鐵杉、金松、楊、柳、山核桃、山毛櫸、櫟、桑屺、朴、榆、樺、榛、屺木、鵝耳櫪、苗

榆、木蘭、鵝掌楸、樟、鉤樟、楓香、懸鈴木、相思樹、合歡、紫穗槐、香槐、洋槐、皂莢、紫藤、沙針、枸橘、臭椿、黃楊、漆樹、冬青、女貞、槭、泡桐、梓、海州常山、夾竹桃、洋臘梅、常春藤、紫薇、桉樹、紅千層、長春花、山茱萸、連香樹、杜木、連翹、芍藥、茉莉、丁香、檉柳、蜀葵、錦葵、木槿、刺竹、薔薇、假葉樹、絲蘭、美人蕉、馬兜鈴、蓼、濱藜、日中花、類葉升麻、鐵線蓮、木通、貓兒屎、小蘗、十大功勞、溲疏、繡球、巴婆、鼠刺、山梅花、茶藨子、海桐花、蠟瓣花、金縷梅、唐棣、毛櫻桃、蚊子草、棣棠花、栒子、山桃、風箱果、野球蘭、貼梗海棠、白鵑梅、歐楂、委陵菜、火棘、珍珠梅、繡線菊、復盆、薔薇、黃花、錦雞兒、紫荊、小冠花、染料木、肥皂莢、胡枝子、毒豆、鷹爪豆、好望角美樹、黃蘗、榆橘、黃葉樹、大戟、野扇花、肖乳香、南蛇藤、衛矛、七葉樹、省沽油、文冠果、美洲茶、鼠李、白欽爬山虎、椴、厚皮香、凝愛神木、岩薔薇、瑞香、結香、革木、沙棘、紫樹、番櫻桃、歐芹、桃葉珊瑚、山柳、梾木、歐石南、山月桂、杜鵑花、越橘、銀鐘花、安息香、醉魚草、絡石、馬利筋、旋花、福祿考、紫珠、藿、牡荊、迷迭香、金魚草、比格諾藤、黃鐘花、風箱樹、黃錦帶、忍冬、接骨木、雪果、莢蒾、紫菀、菊、大麗花、旋復花、金光菊、飛蓬、紅果樹、金雀花、流蘇樹 (*Chionanthus*), *Hicoria*, *Rodotypos*, *Calycotome*, *Sorotamnus*, *Naudinia*, *Exebergia*, *Pavonia*, *Arbutus*, *Azalea*, *Gaylussacia*, *Phillyrea*, *Vanguellis*, *Baccharis*.

分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、安徽、浙江、江蘇、上海、山東、河南、山西、陝西、河北、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、印度、巴基斯坦、非洲、歐洲、加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、澳洲、新西蘭、夏威夷。

附　註：本種爲亞洲原產、現已傳遍世界各地，能加害百餘種植物的幹、枝、葉和果實，多數國家列爲檢疫對象。

天　敵：*Chrysopa shansiensis* Kuwayama　晉草蛉
Chilocorus kuwanae Silvestri　紅黑唇瓢蟲
Chilocorus rubidus Hope　黑緣紅瓢蟲
Aphelinus fuscipennis Howard
Aphytis proclia (Walker)　桑盾蚧矮小蜂
Archenomus bicolor Howard　雙色短索矮小蜂
Archenomus lauri Mercet　勞里短索矮小蜂
Coccophagoides kuwanae (Silvestri)　桑名類食蚧矮小蜂
Encarsia aurantii (Howard)
Encarsia citrinus (Craw)　長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard)　瘤柄花翅矮小蜂
Pteroptrix chinensis (Howard)　中華四節矮小蜂

1172. **Quadraspidiotus slavonicus** (Green) 突笠圓盾蚧 (Tao, 1999:115; Xiao, 1992:311)

Targionia slavonica Green, 1934, 3:95.
Quadraspidiotus slavonicus, Ferris, 1943:
=*Quadraspidiotus populi* Bobenheimer, 1943;

別　名：*楊盾蚧*。

寄　主：蘋果、梨、薔薇、楊、柳。

分　佈：浙江、山東、河北、山西、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧；中亞細亞、中東。

天 敵：多毛原花蝽
Chilocorus kawanae Silvestri 紅點唇瓢蟲
Cybocephalus sp. 方頭甲
Encyrtidae 跳小蜂科
寡節長纓跳小蜂(寄生率達 41.3-85.7%)
斑腿花翅矮小蜂

1173. **Selenaspidus articulatus** (Morgan) 刺盾蚧 (Chou, 1985, 2:257; Tao, 1999:116; Wu, 1994:663)
Aspidiotus articulatus Morgan, 1889, 25:352.
=*Aspidiotus* (*Selenaspidus*) *articulatus* var. *simplex* Charmoy, 1899:21.
=*Aspidiotus rufescens* Lindinger, 1932:204.
=*Aspidiotus simplex* Ferris, 1941:48.
[Rufous scale]
寄 主：柑橘、椰子、油椰、無花果、木菠蘿、檬果、枇杷、咖啡、可可、海棗、酪梨、釋迦、木薯、山茶、木槿、榖、木蘭、桑屺、冷水花、巴豆、肖乳香、南蛇藤、欖仁樹、藤黃、玫瑰、六道木、常春藤、紫金牛、金葉樹、女貞、素馨、槍彈木、假虎刺、夾竹桃、雞蛋花、比格諾藤、龍船花、梔子、桂骨木、姜果棕、蘇鐵、朱蕉、肯特棕、餅樹、鈍葉草、散尾葵、狗骨柴 (*Tricalysia*)、網籽草(*Dictyospermum*)、*Furcraea*, *Neodypsis*, *Washintonia*.
分 佈：臺灣；日本、印度、斯里蘭卡、留尼旺島、摩里西斯、馬達加斯加、非洲、斐濟島、美國、中美洲、南美洲。
天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂

1174. **Selenomphalus euryae** (Takahashi) 柃木薄圓盾蚧 (ASZI, 1986, 1:310; Tao, 1999:117)
Aspidiotus euryae Takahashi, 1931, 3:383.
Selelnomphalus euryae, Takagi, 1969:95.
寄 主：桑、日本柃木、茶科植物。
分 佈：臺灣、貴州、浙江。

1175. **Semelaspidus mangiferae** Takahashi 檬果環紋盾蚧 (Chou, 1985, 2:253; Tao, 1999:117)
Semelaspidus mangiferae Takahashi, 1939, 2:341.
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣、菲律賓。

1176. **Serrataspis maculata** Ferris 鋸盾蚧 (Chou, 1982, 1:123; Tao, 1999:118)
Serrataspis maculata Ferris, 1955, 20:31.
寄 主：蒲桃。
分 佈：廣東、香港。

1177. **Silvestraspis uberifera** (Lindinger) 翼盾蚧 (Chao, 1982:102; Chou, 1985, 2:211; Tao, 1999:118)
Cryptoparlatorea uberifera Lindinger, 1911, 7:126.
=*Silvestraspis sinensis* Bellio, 1929:160.
Silvestraspis uberifera, Takahashi, 1942:46.
寄 主：菠蘿蜜樹、玉桂、粗糠柴(*Mallotus*)、榕。
分 佈：臺灣、福建、香港、海南；菲律賓、柬埔寨、印尼。

1178. **Temnaspidiotus excisus** Green 凹圓盾蚧 (Chao, 1982:102; Chou, 1985, 2:274; Tao, 1999:119; Tsai, 1970:144)
Aspidiotus excisus Green, 1896, 1:50, 53.

Temnaspidiotus excisus, MacGillivray, 1921:
別 名：*梵天花圓蚧*。
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、番木瓜、椰子、胡椒、漆樹、素馨、英蓬、柚木、桐棉、常山、石楠、球蘭、牽牛、蘭瓶花、杓蘭、紫丹、肖梵天花、香港算盤子、地膽草、 *Cyanotis*.
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南；日本、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼、斐濟、密克羅尼西亞、卡羅林島。

1179. **Thysnofiorinia leei** Williams 荔枝圓盾蚧 (Tao, 1999:120)
Thysanofiorinia leei Williams, 1971:451.
寄 主：荔枝、*Nephhelum*。
分 佈：香港。

1180. **Thysanofiorinia nephelii** (Maskell) 纓圓盾蚧 (Chao, 1982:102; Chou, 1982, 1:102; Huang et Gao, 1996:217; Tao, 1999:120)
Fiorinia nephelii Maskell, 1898, 30:234.
=*Fiorinia hirsuta* Marchal, 1906:145.
Thysanofiorinia nephelii, Balachowsky, 1954:
別 名：*纓單蛇蚧*。
寄 主：荔枝、龍眼、荅子、菩提、大戟。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、廣西、浙江；日本、泰國、緬甸、印度、夏威夷、阿爾及利亞、巴西。

1181. **Unaspis acuminata** (Green) 銳矢尖蚧 (Chou, 1982, 1:73; Tao, 1999:121)
Chionaspis acuminata Green, 1896, 4:3.
Unaspis acuminata, McGillivray, 1921:339.
寄 主：柑橘、柚、黃皮、番石榴、無花果、檬果、茶、吳茱萸、龍腦香、衛矛、紫金牛、雞眼藤、霧冰草。
分 佈：廣東、海南、廣西；泰國、印度、斯里蘭卡。

1182. **Unaspis citri** (Comstock) 橘矢尖蚧 (Chou, 1982, 1:70; Tao, 1999:121; Wu, 1994:665; Zhong, 1998(1): 54)
Chionaspis euonymi Comstock, 1880:313. (partum).
Chionaspis citri Comstock, 1883:97, 100.
=*Dinaspis annae* Malenotti, 1917:188, 192 .
=*Dinaspid veitchi* Green et Laing, 1923:123.
Unaspis citri, Ferris, 1937:
[Citrus snow scale]
別 名：*橘雪蚧*，*矢根介殼蟲*。
寄 主：柑橘、柚、橙、佛手、檸檬、枸骨、葡萄、木犀、棕櫚、*Severina* (芸香科)。
分 佈：臺灣、廣東、香港、廣西、四川、浙江、湖北、陝西、河北；日本、新加坡、馬達加斯加、非洲、中東、大洋洲、澳洲、新西蘭、美國、中美洲、南美洲。
天 敵：*Aphytis debachi* Azim 德氏黃矮小蜂
Coccobius fulvus (Compere et Annecke) 褐黃異角矮小蜂
Encarsia inquirenda (Silvestri) 騷蚧恩矮小蜂

1183. **Unaspis euonymi** (Comstock) 衛矛矢尖蚧 (AS2I, 1986, 1:312; Chou, 1982, 1:71; Hun., 1992:203; Tang et Li 1898: 156; Wu, 1994:668; Xiao, 1992 :315; Yunn., 1987:466)
Chionaspis euonymi Comstock, 1881:313 (partim).

=*Chionaspis nemausensis* Signoret, 1886:9.
=*Unaspis hakayamai* Takahashi et Kanda, 1939:185.
Unaspis euonymi, Ferris, 1937:
[Euonymus scale]
寄 主：杏、李、柚、柚橄欖、衛矛、革葉衛矛、女貞、正木、木樨、素馨、丁香、忍冬、瑞香、南蛇藤、落霜紅、山梅花、薔花、鳶尾、富貴草、*Pericheimenum*.
分 佈：廣東、廣西、四川、陝西、江蘇、山東、內蒙古；朝鮮、日本、中東、歐洲、蘇聯、美國、阿根廷。
天 敵：*Encarsia citrinus* (Craw) 長纓恩矮小蜂
Encarsia gigas (Tshumakova) 黃胸撲虱矮小蜂

1184. **Unaspis yanonensis** (Kuwana) 矢尖盾蚧 (ASZI, 1986, 1:312; Chao, 1982:102; Chen, 1991:37-38; Chen, 1996(1):45; Chen, 1996(4):27; Chen, 1996(4):29; Chen et Wang, 1987:235; Chen et al., 1989, 16(3):153-158; Chou, 1982, 1:67; Fan et al., 1996(1):29; Fang, 1993:43; Fang et al., 1993(3):33; Hu, 1995, 12(3):193; Huang, 1990[ed.] 2:203-204; Huang et Gan, 1996:156; Huang et al., 1983, 10(1):19-34; Huang et al., 1994(2):44-45; Hun., 1982:203; Jia et al., 1995(3):17-19; Lei, 1996(3):20; Li et al., 1996(3):11; Liu et al., 1990:292-294; Liu et al., 1994, 11(2):85; Luo et al., 1996:55; Ma et al., 1995:119; Song et al., 1990, 17(3):233-236; Tang, 1995(4):41-42; Tang et Li 1989:159; Tao, 1999:121; Tong, 1995(2):40; Tong et al., 1996(4):30; Wang et Zhang, 1992:161; Wang et al., 1985(1):16-18; Wang et al., 1987:159-160; Wang et al., 1993:144; Wu, 1994:670; Wu et al., 1993(1):63; Wu et al., 1993(2):18; Yang et al., 1990, 17(1):46, 54; Yunn., 1987:466; Zhang, 1987[ed.] 1:75; Zhang, 1995:43; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1995(3):32-34; Zhang et al., 1995(3):37; Zhang et al., 1995(4):39; Zhang et al., 1996(1):20-21; Zhang et al., 1996(1):38-39; Zhang et al., 1999(1):13; Zhong et Liao, 1998, 15(3):33)
Chionaspis yanonensis Kuwana, 1923:1.
Unaspis yanonensis, Rao, 1947:
別 名：*矢尖蚧*，*矢根蚧*，*根蚧*。
[Arrowhead scale]
寄 主：柑橘、柚、佛手、橙、檸檬、枸橘、橄果、龍眼、番石榴、花椒、連翹、松、杉、樟、楠木、茶、油茶等。
分 佈：福建、江西、湖南、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河北、甘肅、內蒙古；朝鮮、日本、法國。
天 敵：*Mallada bonienesis* (Okamoto) 安平草蛉
Chilocorus circumdatus (Gyllenhal) 細緣唇瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲(小二星瓢蟲)
Platynaspis lewisii Crotch
Scymnus hoffmanii Weise 四星小黑瓢蟲
Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga 日本方頭甲
Adelencyrtus aulacaspidis (Brethes) 輪盾蚧長角跳小蜂
Arrhenophagus chionaspidis Aurivillius 盾蚧寡節跳小蜂
Aphytis aonidiae Mercet 長緣毛矮小蜂
Aphytis chrysomphali Mercet 黃矮小蜂
Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂
Aphytis proclia Walker 短緣毛矮小蜂
Aphytis unaspidis Rose et Rosen 鎧盾蚧黃矮小蜂(寄生雄蟲)
Aphytis yanonensis Debach et Rosen 矢尖蚧矮小蜂(寄生雌蟲)
Coccobius fulvus (Compere et Annecke) 花角矮小蜂
Encarsia citrinus (Craw) 長纓恩矮小蜂
Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛長纓恩矮小蜂
Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂(重寄生蜂)
附 註：日本於 1980 年從四川引進 *Aphytis yanonensis* 和 *Coccobius fulvus* 後成功控制矢尖蚧。

1185. **Ungulaspis ficicola** (Takahashi) 無花果爪蠣蚧 (Chou, 1982, 1:183; Tao, 1999:122)
Lepidosaphes ficicola Takahashi, 1931, 23:378.
Ungulaspis ficicola,
寄 主：無花果。
分 佈：臺灣；日本。

1186. **Ungulaspis pinicola** (Chen) 松爪蠣蚧 (Chou, 1982, 1:183; Tao, 1999:122; Wang et Zhang, 1992:160)
Lepidosaphes pinicola Chen, 1937, 5(19):395.
Ungulaspis pinicola, Borchsenius, 1966:
寄 主：馬尾松、松屬。
分 佈：廣西、浙江(黃岩)。

1187. **Yunnanaspis rubus** Young 懸鉤子雲盾蚧 (Tao, 1999:122; Young, 1986:204)
Yunnanaspis rubus Young, 1986, 6:204.
寄 主：懸鉤子葉、葉柄及枝上。
分 佈：雲南。

COLEOPTERA 鞘翅目

Corynetidae 隱跗郭公科

1188. **Necrobia ruficollis** Fabricius 赤頸郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)
寄 主：乾果、乾肉、皮張、骨骼、動物、藥材
分 佈：江西。

1189. **Necrobia rufips** De Geer 赤足郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)
寄 主：腌肉、鹹魚、骨粉、動物、乾果、藥材
分 佈：江西。

Elateridae 叩甲科
(Li, 1997(2):29)

1190. **Agriotes fuscicollis** Miwa 細胸金針蟲 (Beijing FC., 1980[ed.]:162-164; Chen et al., 1993:103; Liu, 1982[ed.]: 167-169; Wang, 1987[ed.]:349-350;)
Agriotes fuscicollis Miwa,
寄 主：漆、松柏類、刺槐、青桐、懸鈴木、元寶楓、丁香、海棠、山荊子及許多農作物種子剛發芽或幼苗。
分 佈：安徽、江蘇、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1191. **Agriotes sericeus** Candose 棘胸叩頭蟲 (Zheng, 1982:247)
Agriotes sericeus Candose,
寄 主：桑苗、麥、玉米、大麻、茄子、豆類、蒜類、蔥類。
分 佈：江蘇。

1192. **Agriotes subrittatus** Motschulsky 細胸金針蟲 (Xiao, 1992:410)

寄 主：松柏類、刺槐、青桐、懸鈴木、元寶楓、丁香、海棠、山荊子及許多農作物種子剛發芽或幼苗。
分 佈：河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、山東、河北、內蒙古、吉林、黑龍江。

1193. **Agroptes seroceis** Candose 棘胸叩頭甲 (Suzhou CS., 1985:247)
寄 主：桑(幼根及主根)、麥、玉米、大麻、茄子、豆類、蒜類、蔥類。
分 佈：浙江、江蘇。

1194. **Agrypnus davidi** (Fairmaire) 血紅溝胸叩甲 (Hun., 1992:385)
=*Lacon argillaceus* var. *davidi* (Fairmaire)
寄 主：華山松、核桃。
分 佈：雲南、四川、湖南、湖北；越南、柬埔寨。

1195. **Alaus berus** Candeze 姥玉叩甲 (Chang & Hung, 1986:111)
別 名：*姥玉叩頭蟲*。
寄 主：松(樹幹)。
分 佈：臺灣；越南、日本。

1196. **Alaus putridus** Candeze 雙紋姥玉叩甲 (Chang & Hung, 1986:111)
別 名：*雙紋姥玉叩頭蟲*。
寄 主：松、印度黃檀(樹幹)。
分 佈：臺灣、中國大陸；越南、日本。

1197. **Archontus argillalceus** Faiarmaire 血紅叩甲 (Yunn., 1987:599)
別 名：*血紅叩頭蟲*。
寄 主：華山松、核桃。
分 佈：雲南；越南、柬埔寨。

1198. **Campsosternus auratus** (Drury) 松麗叩甲 (Hun., 1992:382; Yunn., 1987:599; Zhang, 1987[ed.] 2:12)
別 名：*松麗叩頭蟲*。
寄 主：松樹樹幹、杉。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、湖北、廣東、廣西、雲南、貴州、華北；越南、寮國、柬埔寨。

1199. **Campsosternus gemma** Candeze 朱鞘麗叩甲 (Jiang, 1995:220)
Campsosternus gemma Candeze, 1857:
寄 主：柑橘、紅橘、玉米、花生、棉、黃荊、青杠
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北。

1200. **Melanotus caudex** Lewis 褐紋金針蟲 (Chen et al., 1993:104; Liu, 1982[ed.]:167-169)
寄 主：棗、松柏類、刺槐、青桐、懸鈴木、元寶楓、丁香、海棠、山荊子及許多農作物種子剛發芽或幼苗。
分 佈：安徽、江蘇、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1201. **Melanotus ventralis** Candéze 桑叩甲 (Jiang, 1995:222; Zhang, 1987[ed.] 2:13)

寄 主：桑。

分 佈：江西、浙江、內蒙古。

1202. **Pleonomus canaliculatus** Faldermann 溝叩甲 (Beijing FC., 1980[ed.]:162-164; Chen et al., 1993:101; Hu et Hu, 1993:128; Liu, 1982[ed.]:167-169; Wang, 1987[ed.]:349-350; Xiao, 1992:410)

別 名：*溝金針蟲*，*溝叩頭蟲*。

寄 主：草莓、棗、松柏類、刺槐、青桐、懸鈴木、元寶楓、丁香、海棠、山荊子及許多農作物種子剛發芽或幼苗。

分 佈：安徽、江蘇、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、青海、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Bostrychidae 長蠹科

1203. **Heterobostrychus aequalis** (Waterhouse) 雙鉤異翅長蠹 (Xiao, 1992:417)

寄 主：在海南已知有 16 種木材被害，橡果、山荔枝、黃桐、橡膠樹、木棉、瓊楠、油楠、鳳凰木、黑格、白格、翻白樹、大沙葉、白櫸、小葉膩脂、厚皮樹、黃牛木、竹材。

分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、太平洋的一些島嶼、馬達加斯加。

1204. **Rhyzopertha dominica** Fabricius 穀蠹 (Zhang, 1987[ed.] 2:22)

寄 主：各種貯糧、竹材、木材、乾果、麵粉、中藥材。

分 佈：全世界。

1205. **Sonoxylon anale** Lesne 雙刺長蠹 (Wu, 1995(1):52; Xiao, 1992:419)

寄 主：橡果、葡萄、山龍眼、山荔枝、白格、黑格、華楹、黃檀、鳳凰木、木棉、橡膠樹、黃桐、厚皮樹、翻白葉、黃牛木、小葉英歌、輕木、大葉桃花心木等，食性極雜，在印度爲害樹種達 52 屬 73 種。

分 佈：臺灣、海南、廣東、廣西、四川、陝西；菲律賓、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、澳洲、新西蘭。

1206. **Sinoxylon japonicum** Lesne 二齒莖長蠹 (Shu et al., 1998:27-28; Tang et al., 1997(3):52-53)

寄 主：柿、桑。

分 佈：臺灣、江蘇；日本。

1207. **Sinoxylon mangifera** Chûjô 橡果雙棘長蠹 (Chang & Hung, 1986:114; Yunn., 1987:600)

寄 主：橡果樹木。

分 佈：臺灣、雲南。

1208. **Xylopsocus capucinus** Fabricius 黃腹小長蠹 (Chang & Hung, 1986:114)

寄 主：橡果。

分 佈：臺灣；馬來半島、印度、加羅林群島、馬達加斯加、非洲西部、北美洲。

Nitidulidae 出尾甲科

1209. **Stelidota multiguttata** Reitter 斑背出尾甲 (Chen, 1981:43)
寄 主：蓮霧、其他成熟果實。
分 佈：臺灣；日本、印度。

Coccinellidae 瓢蟲科

1210. **Chilomenes quadriplagiata** (Swartz) 四斑月瓢蟲 (Zhao et al., 1997:189)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

1211. **Coelophora biplatiata** (Swertz) 雙帶盤瓢蟲 (Zhao et al., 1997:189)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

1212. **Epilachna szechuana** (Dieke) 四川食植瓢蟲 (Jing, 1992:571)
Epilachna szechuana (Dieke, 1947:)
寄 主：五味子。
分 佈：四川。

1213. **Harmonia axyridis** ab. **conspicua** Fabricius 異色瓢蟲顯現型 (Luo, 1991:86)
寄 主：腰果(果)
分 佈：海南。

1214. **Henosepilachna vigintioctopunctata** (Fabricius) 二十八星瓢蟲 (Ai, 1998(4):23; Chao, 1982:129; Xiao et Li, 1992:384)
別 名：*馬鈴薯瓢蟲*，*茄二十八星瓢蟲*。
寄 主：柑橘、柿、馬鈴薯、茄子、番茄、辣椒、絲瓜、蔓陀羅、酸漿、枸杞。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東；日本、印度。

1215. **Micraspis discolor** (Fabricius) 稻紅瓢蟲 (Ma et al., 1995:228; Xiao et Li, 1992:384; Zhao et al., 1997:189)
Verania discolor (Fabricius)
寄 主：榛、水稻、麥類、玉米、高粱等作物花粉；捕食飛蝨、葉蟬(若蟲)、稻蚜、菜縊管蚜、薊馬(成蟲和若蟲)
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北；日本、菲律賓、印度、錫金、印尼。

Meloidae 芫菁科

1216. **Epicauta chinensis** Lep. 中國芫菁 (Liu, 1982[ed.]:175)
寄 主：果樹苗圃。
分 佈：

1217. **Epicauta gornami** Marseul 白條芫菁 (Liu, 1982[ed.]:175)

寄 主：果樹苗圃。
分 佈：

1218. **Lytta caraganae** Pallas 藍芫菁 (ASZI, 1986, 1:485; He et al., 1991:111; Huang et al., 1995:62; Hua., 1992:417; Liu, 1982[ed.]:175; Zhang, 1987[ed.] 2:20)
寄 主：蝗(卵)，幼蟲捕食性；成蟲取食刺槐、紫穗槐、黃菠蘿、錦雞兒、豆類、花生、苜蓿、蠶豆、苜蓿、紅花草、油菜、花生、槐、紫穗槐、蔬菜、十字花科蔬菜、梨。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯(哈薩克斯坦)。

1219. **Lytta impressithorax** Pic 黃頸芫菁 (Zhang, 1987[ed.] 2:20)
寄 主：蠶豆、油菜、梨。
分 佈：江西。

1220. **Meloe brevicollis** Panzer 短胸短翅芫菁 (Tan, 1996:108)
Meloe brevicollis Panzer, 1793:
寄 主：
分 佈：江西、江蘇、上海、新疆、東北；蘇聯、中歐。

1221. **Mylabris calida** Pallas 蘋斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:486)
寄 主：蘋果、沙果、瓜類、橘梗、野芍藥。幼蟲捕食性。
分 佈：江蘇、湖北、山東、河北、新疆、內蒙古、黑龍江；蘇聯、埃及。

1222. **Mylabris cichorii** Linnaeus 眼斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:486; Hua., 1992:417; Tan et Ma, 1997:737)
寄 主：成蟲爲害蘋果、瓜類、豆類的花以及番茄、花生、馬鈴薯等的葉子；幼蟲捕食性，取食蝗蟲卵。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河北、北京；越南；印度。

1223. **Stenodera foveicollis** Fairmaire 黑頸紅芫菁 (Zhang, 1987[ed.] 2:21)
捕 食：蝗(卵)；成蟲爲害油菜花、梨花。
分 佈：江西。

Anthicidae 蟻形甲科

1224. **Formicomus braminus** De La Ferte-Senectere 細頸擬蟻甲 (Chang & Hung, 1986:113)
別 名：*細頸擬蟻(一角蟻)*。
寄 主：龍眼。
分 佈：臺灣；日本、印度。

Alleculidae 朽木甲科 (Cistelidae)

1225. **Borboresthes hainanensis** Pic 灰褐朽木甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:22)
寄 主：柑橘、桃。

分 佈：江西、海南。

Mordellidae 花蚤科

1226. **Glipa formosana** Pic 臺灣帶花蚤 (Chang & Hung, 1986:113)
寄 主：琉球松(樹幹)。
分 佈：臺灣。

Trictenotomidae 三櫛牛科

1227. **Tricteonotoma davidi** Deyrolle 三櫛牛 (Zhang, 1987[ed.]:222)
寄 主：柑橘、梨。
分 佈：江西。

Tenebrionidae 偽步行蟲科

1228. **Gonocephalum gueroyi** Chatanay 格氏土潛 (Li, 1997:692)
Gonocephalum gueroyi Chatanay, 1917:
寄 主：植物根部。
分 佈：雲南、湖北。

1229. **Gonocephalum subspinosum** Fairmaire 尖角土潛 (Li, 1997:691)
Gonocephalum subspinosum Fairmaire, 1894:
寄 主：植物根部。
分 佈：海南、雲南、湖北；孟加拉。

1230. **Gonocephalum reticulatum** Motschulsky 蒙古砂潛 (Chen et al., 1993:107)
寄 主：棗、作物苗木。
分 佈：華北、西北、東北各省，以黃淮海地區及河西走廊。

1231. **Opatrum subaratum** Falldermann 網目砂潛 (Chen et al., 1993:107)
寄 主：棗、作物苗木。
分 佈：華北、西北、東北各省，以黃淮海地區及河西走廊。

1232. **Tribolium castaneum** (Herbst) 擬穀盜 (Chao, 1982:135)
別 名：*赤擬穀盜*。
寄 主：乾果、麵粉、稻穀、米、玉米、小米等多種加工糧、多種原糧、豆類、油料、藥材、蠶繭、乾魚、鹹魚、挂麵、酒曲等。
分 佈：臺灣、福建、江西、新疆等全世界。

Anobiidae 竊蠹科

1233. **Magdalis** sp. 松梢黑竊蠹 (Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:64; Li et al., 1992:70-72)
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(雌球花、新梢)
分 佈：陝西、山西。

Lagriidae 僞葉甲科

1234. **Cerogria popularis** Borchmann 普通角僞葉甲 (Chen, 1997:744)
Cerogria popularis Borchmann, 1937:
寄 主：蘋果、核桃、馬尾松、漆樹、黃楊、櫟樹。
分 佈：福建、廣西、雲南、四川、山東。

1235. **Lagria lameyi** Fairmaire 凸紋僞葉甲 (Chen, 1997:743)
Lagria lameyi Fairmaire, 1893:
寄 主：松樹、山茱萸、油茶、漆樹。
分 佈：福建、湖南、廣西、四川、浙江、湖北；越南。

1236. **Lagria nigricollis** Hope 黑背僞葉甲 (Chen, 1997:742; Zhang, 1987[ed.] 2:21)
Lagria nigricollis Hope, 1843:
寄 主：桑、榆、月季、苧麻、油茶、黃楊、玉米、小麥、雜草。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、湖北、河南、新疆、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯。

1237. **Lagria rufipennis** Marseul 紅翅僞葉甲 (Chen, 1997:741)
Lagria rufipennis Marseul, 1876:
寄 主：葡萄、玉米、水稻、大豆、黃楊、槐樹。
分 佈：四川、湖北、陝西、北京、寧夏；日本、俄羅斯。

Buprestidae 吉丁蟲科

1238. **Agrilus auriventris** Saunders 柑橘窄吉丁 (Chang & Hung, 1986:112; Chao, 1982:120; Chen et Wang, 1987:236-238; Huang, 1990[ed.] 2:239-241; Hun., 1992:398; Li et Li, 1993(1):34; Lin, 1994(1):30-31; NZWDL, 1981:1926)
=*Agrilus tzonglokianus* Kerremans
別 名：*柑橘吉丁蟲*，*柑橘爆皮蟲*，*柑橘銹皮蟲*，*柑橘溜皮蟲*。
寄 主：柑、橙類(樹枝)、椰子。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、陝西；日本。
天 敵：*Spathus ochus* Nixon 爆皮蟲柄腹繭蜂

1239. **Agrilus chrysoders** Obenberger 薔薇窄吉丁 (ASZI, 1986, 1:446; Yunn., 1987:588)
寄 主：醋栗、野薔薇、茶藨子。
分 佈：雲南、西藏、四川；蘇聯、中南歐、敘利亞。

1240. **Agrilus citri** Matsumura 柑橘爆皮蟲 (ASZI, 1986, 1:445; Chao, 1982:120; Huang, 1990[ed.] 2:241-244; Liu et al., 1994, 11(2):85; Zhang, 1987[ed.] 2:13)
別 名：*柑橘鏽皮蟲*，*柑橘溜皮蟲*，*柑橘吉丁*。
寄 主：柑橘類。
分 佈：福建、江西、廣東、四川、浙江、湖北。
天 敵：*Spathus ochus* Nixon 爆皮蟲柄腹繭蜂

1241. **Agrilus lewisiellus** Kere 核桃小吉丁 (ASZI, 1986, 1:446; Huang, 1990[ed.] 2:344-3346; Liu, 1982[ed.]:374-375; NZWDL, 1981:1771; Wang, 1987[ed.]:189-190; Wang, 1995:29)

寄 主：核桃(主要害蟲)。
分 佈：河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古。
天 敵：*Eurytoma wachtli* Mayr 甲蟲肩小蜂

1242. **Agrilus mali** Matsumura 蘋果小吉丁 (ASZI, 1986, 1:444; Chen et Wang, 1987:43-45; Li, 1993:63; Huang, 1990[ed.] 2:67-69; NZWDI, 1981:1714; Sun, 1984:394-395; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Yang et Song, 1994(2):32)
別 名：*串皮蟲*，*旋皮蟲*。
寄 主：蘋果、沙果、海棠、紅果、香果、奈子、秋子、槟子、楹柿等。
分 佈：廣西、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。
天 敵：寄生蜂 2 種
寄生蠅 1 種
啄木鳥 (啄食 30 % 左右幼蟲及蛹)

1243. **Agrilus sinensis** Thomson 中華窄吉丁 (Hun., 1992:398)
寄 主：柑橘。
分 佈：雲南、廣西、四川、貴州、江西、湖南；越南、寮國。

1244. **Agrilus viridis** Linnaeu 綠窄吉丁 (ASZI, 1986, 1:447; Yum., 1987:588)
寄 主：橙、樺樹、千金榆、槭、山毛櫸、楊、柳。
分 佈：雲南、西藏、西南、西北、蘇聯、西歐、北非。

1245. **Agrilus** sp. 柑橘溜皮蟲 (NZWDI, 1981:1929; Zhang, 1987[ed.] 2:13)
寄 主：柑橘類。
分 佈：江西、廣西、四川、福建、浙江等。

1246. **Agrilus** sp. 核桃小吉丁 (Chen et Wang, 1987:197)
寄 主：核桃。
分 佈：陝西。

1247. **Ancylocheira novemnaculata** Linnaeus 松斑吉丁 (ASZI, 1986, 1:442)
寄 主：松類、雲杉。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、西歐、阿爾及利亞。

1248. **Anthaxia morio** Fabricius 松扁吉丁 (ASZI, 1986, 1:443)
寄 主：松、雲杉類。
分 佈：西藏、西北、東北；蘇聯、西歐。

1249. **Anthaxia quadripunctata** Linnaeus 松四凹點吉丁 (ASZI, 1986, 1:443)
寄 主：松類、雲杉的幼林、冷杉、落葉松的風折木等。
分 佈：山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、西歐、北非。

1250. **Buprestis haemorrhoidalis japonensis** Saunders 黑小吉丁 (Chang & Hung, 1986:112)
別 名：*黑緣吉丁蟲*。
寄 主：赤松、黑松。

分 佈：臺灣，東北；朝鮮、日本，西伯利亞，歐洲。

1251. **Buprestis sibirica** Fleisch 松青銅吉丁 (ASZI, 1986, 1:442; Hun., 1992:390)
=*Buprestis haemorrhoidalis sibirica* Fleish
別 名：*西伯利亞吉丁*。
寄 主：在多種針葉樹(已枯萎)的木質部發育，尤其紅松、黑松、冷杉。
分 佈：湖南、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、蒙古、歐洲。

1252. **Capnodis cariosa** Fall. 果樹扁胸吉丁 (ASZI, 1986, 1:441)
寄 主：扁桃、核果類果樹、黃連木、烏荊子、漆樹、楊樹、櫻樹、法國梧桐。
分 佈：甘肅、新疆；蘇聯、歐洲、敘利亞、巴勒斯坦。

1253. **Capnoids henningim** Fald. 桃樹扁胸吉丁 (ASZI, 1986, 1:441)
寄 主：核果類果樹(杏、桃等)。
分 佈：新疆；蘇聯、伊朗。

1254. **Caraebus rusticanus** Lewis 梨小吉丁 (Cao et Peng, 1993:24)
寄 主：山楂。
分 佈：山西。

1255. **Catoxantha fulgidissima** (Schoenh) 桃金吉丁 (Hun., 1992:387)
Chrysochroa fulgidissima Schoenh,
=*Buprestis elegans* Thunberg,
寄 主：桃、櫻、柿、樸、柳等。
分 佈：湖南、廣東、廣西；日本。

1256. **Chalcophora japonica** Gory 日本松脊吉丁 (Chun, 1982:120; Hun., 1992:388; Zhang, 1987[ed.] 2:13))
別 名：*銅吉丁蟲，日本吉丁蟲*。
寄 主：馬尾松、橋、杉。
分 佈：福建、江西、雲南、湖南、江西；日本。

1257. **Chalcophora japonica chinensis** Schauffuss 日本脊吉丁 (ASZI, 1986, 1:441)
寄 主：馬尾松。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、湖北。

1258. **Chalcophora satsumae** Lewis 薩摩銼吉丁 (Chang & Hung, 1986:112)
寄 主：馬尾松、琉球松(樹幹)。
分 佈：臺灣；日本。

1259. **Chalcophora yunnana** Fairmaire 雲南脊吉丁 (ASZI, 1986, 1:441; Chang & Hung, 1986:112; Hun., 1992:388; Xiao, 1992:403; Yunn., 1987:396)
別 名：*雲南松脊吉丁，高砂銼吉丁蟲*。
寄 主：華山松、雲南松、馬尾松等樹幹。
分 佈：雲南、廣西、四川、貴州、湖南、江西、河南；日本、琉球、越南。

1260. **Chrysobothris ffinis** Fabricius 六星銅吉丁 (ASZI, 1986, 1:440)
寄 主：梨、蘋果、桃、櫻桃、棗、樸類、唐槭、五角楓、楊樹。
分 佈：陝西、甘肅、山東、山西、河北、內蒙古、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯、土耳其、歐洲中部及南部。

1261. **Chrysobothris chrysosligma** Linnaeus 銅棱吉丁 (ASZI, 1986, 1:440)
寄 主：紅松、赤松、油松、落葉松、雲杉等。
分 佈：山東、河北、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、蘇聯。

1262. **Chrysobothris succedanea** Saunders 柑橘星吉丁 (Chao, 1982:120; Chen et al., 1993:88; Huang, 1990[ed.] 2:238; Huang et Cao, 1996:205; Hun., 1992:391; Wen et Liu, 1999(3):57-58)
別 名：*柑橘吉丁蟲*，*六星吉丁蟲*。
寄 主：柑橘、棗樹、蘋果、三角楓。
分 佈：福建、浙江、河南、南方各省區、北京；日本。
天 敵：*Spathus ochus* Nixon 爆皮蟲柄腹繭蜂

1263. **Chrysochroa fulgidissima** Schoenherr (Chao, 1982:120)
寄 主：馬尾松。
分 佈：福建。

1264. **Coraebus amabilis** Kerr 藍綠紋吉丁 (Yunn., 1987:584)
寄 主：懸鉤子。
分 佈：雲南、四川。

1265. **Coraebus amabilis amorosus** Obenberger 銅綠紋吉丁 (Yunn., 1987:584)
寄 主：懸鉤子。
分 佈：雲南。

1266. **Coraebus cloueti** Théry 銅胸紋吉丁 (Hun., 1992:397)
=*Coraebus szechuanensis* Obenberger,
寄 主：柑橘。
分 佈：廣西、雲南、四川、貴州、湖南、江西、上海。

1267. **Coraebus pruni** Miwa et Chûjô 白星細背吉丁 (Chang & Hung, 1986:112)
寄 主：櫻(樹枝)。
分 佈：臺灣。

1268. **Coraebus rubi** Linnaeus 薔薇紋吉丁 (Yunn., 1987:587)
寄 主：懸鉤子、薔薇科。
分 佈：雲南、四川；東南亞、印度、蘇聯、歐洲。

1269. **Coraebus rusticanus** Lewis 梨小吉丁 (Chen et Wang, 1987:123; Huang, 1990[ed.] 2:133-134; Zhang, 1987[ed.] 2:13)
寄 主：梨、枇杷、櫻木。
分 佈：江西、湖南、湖北、陝西、甘肅。

1270. **Coraebus sidae** Kerramans 赤紋吉丁 (Hun., 1992:394)
=*Coraebus intricatus* Fairmaire,
寄 主：栗類、櫟。
分 佈：長江以南各省區；日本、緬甸、印度。

1271. **Dicerca acuminata** (Pall) 樺雙尾吉丁 (ASZI, 1986, 1:439)
寄 主：山楂、樺。
分 佈：河北、內蒙古、東北；朝鮮、蘇聯、蒙古、歐洲。

1272. **Julodis variolaris** Pall 土棲吉丁 (ASZI, 1986, 1:442)
寄 主：沙棗。
分 佈：甘肅、新疆；蘇聯。

1273. **Lampra bellula** Lewis 紅緣綠吉丁 (ASZI, 1986, 1:439)
寄 主：梨、桃、杏、山楂。
分 佈：華東、華北、東北；朝鮮、日本。

1274. **Lampra limbata** Gebler 梨金緣吉丁 (ASZI, 1986, 1:438; Chen et Wang, 1987:122-123; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:134-136; Lin, 1986[ed.]:341; NZWDI, 1981:1744; Sun, 1984:393-394; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Zhang, 1987[ed.] 2:13)
寄 主：梨、蘋果、沙果、杏、桃、山楂。
分 佈：江西、長江流域、陝西、山西、北京、華北、甘肅、寧夏、西北、東北；蒙古、蘇聯。
天 敵：白僵菌
寄生蜂 2 種
啄木鳥

1275. **Melanophila acuminata** Degeer 松黑吉丁 (ASZI, 1986, 1:443; Yunn., 1987:596)
別 名：*松針地吉丁*。
寄 主：華山松、油松、雲杉、冷杉及多種闊葉樹。
分 佈：雲南、西藏、陝西、甘肅、新疆；日本、蘇聯、阿富汗、伊朗、歐洲、北非、北美。

1276. **Phaenops cyanea** Fabricius 藍吉丁 (ASZI, 1986, 1:440)
寄 主：松樹類、雲杉。
分 佈：東北；蒙古、蘇聯。

1277. **Phaenops guttulata** Gebler 松六星吉丁 (ASZI, 1986, 1:442)
寄 主：落葉松、雲杉、松樹。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1278. **Ptosima chinensis** Marseul 黃斑吉丁 (Hun., 1992:387; Yunn., 1987:598; Zhang, 1987[ed.] 2:13)
=*Ptosima flavoguttata* Ill,
別 名：*四黃斑吉丁*。
寄 主：桃、李、杏、山楂等薔薇科植物。

分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京。

天 敵：Stephanidae 冠蜂科

Megishcus ptosimae Chao 桃吉丁大腿冠蜂

Braconidae 繭蜂科

Spathius bellus Chao 桃吉丁柄腹繭蜂

1279. **Scintellatrix djingschani** Obenberger 金緣鶻線斑吉丁 (Hun., 1992:389)

別 名：*紅緣線斑吉丁*、*金緣吉丁蟲*。

寄 主：桃、李等。

分 佈：湖南及長江以南大部分省區均有分布。

1280. **Sphenoptera kozlovi** B. Jak. 金緣紋吉丁 (Yunn., 1987:386)

別 名：*雲南松黑吉丁*。

寄 主：雲南松。

分 佈：雲南；巴基斯坦。

Dermestidae 皮蠹科

1281. **Dermestes maculatus** (De Geer) 白腹皮蠹 (Zhang, 1987[ed.] 2:14)

寄 主：動物、藥材、生皮、水產品、核桃仁等

分 佈：江西。

1282. **Ophiloides ovivorous** Matsumura et Yok. 螳螂皮蠹 (Zhang, 1987[ed.] 2:14)

寄 主：螳螂卵囊。

分 佈：江西。

1283. **Thaumaglossa rufocapillata** Redtenbacher 三帶蠟蛸皮蠹 (Li, 1992:583)

寄 主：螳螂卵囊。

分 佈：雲南；朝鮮、日本、馬來西亞、印尼。

Salvanidae 鋸穀盜科

1284. **Oryzaephilus surinamensis** (Linnaeus) 鋸穀盜 (Li, 1992:584)

Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758:)

寄 主：穀物、種子、乾果、植物性藥材。

分 佈：全世界。

Lucanidae 鍬甲科

1285. **Aegus laevicollis** Saunders 溝紋眼鍬甲 (Chao, 1982:220; Hun, 1992:463; Ma, 1992:279; Yunn., 1987:546)

寄 主：李、白楊、濮楊、泡桐。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南；印度、錫金。

1286. **Dorcus reichei** Hope 雷陶鍬甲 (Ma, 1992:538)

Dorcus reichei Hope, 1842:
寄 主：雲南松、櫟類等植物的皮和嫩枝條。
分 佈：臺灣、雲南、西藏；馬來西亞、泰國、印度、印尼。

1287. **Dorcus tityus** (Hope) 佬陶鍬甲 (Ma, 1992:538)
Dorcus titytus (Hope, 1842:)
寄 主：山楂、櫟類等植物的皮和嫩枝條。
分 佈：雲南、西藏、四川；越南、緬甸、印度、錫金、不丹、尼泊爾。

1288. **Eurytrachelus platymetus** Saunder 大扁鍬甲 (Zhang, 1987[ed.]2:28)
寄 主：柑橘、梨。
分 佈：江西。

1289. **Lucanus fortunei** Saunders 福州鍬甲 (ASZI, 1986, 1:494; Chao, 1982:220; Ma, 1995:249; 1997:795)
Lucanus fortunei Saunders, 1853:
寄 主：柑橘、櫟類、榆、楊。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、湖北、遼寧。

1290. **Lucanus furcifer** Arrow 叉鍬甲 (Ma, 1992:539; Yunn., 1987:543)
Lucanus furcifer Arrow, 1839:
寄 主：板栗、蘋果等果樹和林木樹皮和嫩枝條。
分 佈：雲南、四川、西藏；錫金。

1291. **Lucanus parryi** Boileau 黃斑鍬甲 (Ma, 1992:539; Yunn., 1987:543)
Lucanus parryi Boileau, 1899:
寄 主：板栗、泡桐、櫟類等林木的樹皮。
分 佈：福建、雲南、四川；朝鮮、日本。

1292. **Lucanus planeti** Planet 巨叉鍬甲 (Yunn., 1987:543)
寄 主：板栗、櫟類。
分 佈：雲南；越南。

1293. **Neolucanus championi** Parry 小黑新鍬甲 (Chao, 1982:220; Ma, 1992:279; 1997:794; Yunn., 1987:548)
Neolucanus championi Parry, 1864:
寄 主：板栗。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；越南、柬埔寨。

1294. **Neolucanus sinicus** Saunders 華新鍬甲 (Ma, 1992:279)
寄 主：柑橘、沙田柚、麻櫟。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、貴州；越南。

1295. **Odontolabis cuvera** Hope 庫光脛鍬甲 (ASZI, 1986, 1:497; Ma, 1992:279; 1995:249; Yunn., 1987:547)
Odontolabis cuvera Hope, 1845:
寄 主：柑橘、沙田柚、板栗、櫟木、麻櫟。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、浙江、湖北；越南、泰國、緬甸、印度。

1296. **Odontolabis sinensis** Westwood 中華椰齒鍬甲 (Ma, 1992:279; Zhao et al., 1997:189)

寄 主：棕。

分 佈：福建。

1297. **Odontolabis siva** Hope 西光脛鍬甲 (ASZI, 1986, 1:496; Ma, 1992:279; 1995:249; 1997:794; Yunn., 1987:547)

Odontolabis siva (Hope et Westwood, 1854:)

寄 主：板栗、麻櫟、柑橘、沙田柚等樹木的幼樹嫩枝皮層。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、湖北；越南、寮國、緬甸、印度、孟加拉。

1298. **Odontolabis vesicolor** Didier 黃光脛鍬甲 (Yunn., 1987:547)

寄 主：華山松、麻櫟。

分 佈：雲南；印度。

1299. **Prosopocoilus astacoides** Hope 褐紅前鍬甲 (Ma, 1992:538; Yunn., 1987:544)

Prosopocoilus astacoides Hope, 1840:

寄 主：板栗、麻櫟等植物的樹皮及嫩枝條。

分 佈：廣西、雲南、西藏；緬甸、印度、不丹。

1300. **Prosopocoilus blanchardi** Parry 褐黃前鍬甲 (ASZI, 1986, 1:494; Hun., 1992:460; Ma, 1992:278; 1997:792;)

Prosopocoilus blanchardi Parry, 1873:

寄 主：梨、板栗、麻櫟、榆等

分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山西、河北；蒙古。

1301. **Prosopocoilus cilipes** Thoms. 褐前鍬甲 (ASZI, 1986, 1:495)

寄 主：柑橘、沙田柚。

分 佈：廣東、廣西、雲南、江蘇；越南、印度。

1302. **Serrognathus titanus** Boisduval 巨鋸鍬甲 (ASZI, 1986, 1:495; Ma, 1992:278; 1995:248; 1997:793)

Serrognathus titanus Boisduval, 1835:

寄 主：柑橘、沙田柚、核桃、麻櫟。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、越南、泰國、緬甸、印度。

Dynastidae 犀金龜科

1303. **Allomyrina dichotoma** (Linnaeus) 雙叉犀金龜 (ASZI, 1986, 1:532; Chao, 1982:218; Hun., 1992:423; Liao, 1994(2):46; Yunn., 1987:553; Zhang, 1992:270; Zhang, 1995:241; Zhang et Li, 1997:767)

Allomyrina dichotoma (Linnaeus, 1771:)

別 名：*獨角仙*、*獨角蜣螂蟲*、*紫蜣螂*。

寄 主：柑橘、桑、無花果、榆、瓜類。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、

四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、寮國、中南半島、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

1304. **Allomyrina gideon** Linnaeus 短角犀金龜 (Chao, 1982:218)

寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

1305. **Dynastes gideon** Linnaeus 單叉犀金龜 (Luo et Li, 1998:56; Luo et al., 1996:57)

寄 主：橡果(果)、荔枝、龍眼、柑橘、鳳梨、椰子、橡膠。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南。

1306. **Oryctes rhinoceros** (Linnaeus) 椰蛀犀金龜 (ASZL 1986, 1:536; Chang & Hung, 1986:116; Luo et Li, 1998:23; Pingtung AC., 1986:58-59)

別 名：*臺灣兜蟲*，*單角金龜*，*二枕犀甲*。

[Rhinoceros beetle]

寄 主：椰子，還加害棕櫚科的蒲葵、桄榔、王棕、魚尾葵屬及散尾葵屬，鳳梨科的鳳梨，天南星科的芋屬、海芋屬等多種植物，在臺灣尚爲害甘蔗；蟻總尚爲害桑科、露兜樹科、漆樹科、山竹子科的多種植物。

分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、密克羅尼西亞、斐濟群島、夏威夷群島。

1307. **Trichogomphus mongol** Arrow 蒙瘤犀金龜 (Zhang, 1992:270; Zhang, 1995:241; Zhang et Li, 1997:767)

Trichogomphus mongol Arrow, 1908:

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江；越南、柬埔寨、寮國、緬甸。

1308. **Xylotrupes gideon** Linnaeus 獨角犀金龜 (Tan et al., 1999, 26(3):213-218)

寄 主：荔枝。

分 佈：廣西。

Melolonthidae 鰓金龜科

(Hou et Gao, 1989, 16(3):168; Liang et al., 1995(1):40)

1309. **Apogonia bricricollis** Burmeister 顏阿鰓金龜 (Huang et Gao, 1996:296; Zhang, 1987[ed.]:2.23)

寄 主：荔枝(葉)、梨、泡桐。

分 佈：福建、江西。

1310. **Apogonia cribricollis** Burmeister 山藤鰓金龜 (ASZL, 1986, 1:505; Chao, 1982:219; Gong, 1999(20:36; Huang et Lin, 1993(2):43; Hun., 1992:426; Tan et al., 1999, 26(3):213-218; Zhang et Li, 1997:776)

Apogonia cribricollis Burmeister, 1855:

別 名：*顏阿鰓金龜*，*黑褐金龜子*。

寄 主：梨、梅、柑橘、荔枝、無花果、芭蕉、木鼈、烏桕、油桐、蓖麻等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、湖北；越南。

1311. **Apogonia cupreoviridis** Kolbe 黑阿鰓金龜 (Huang et Lin, 1993(2):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

1312. **Apogonia pilifera** Moser 毛阿鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:506; Zhang, 1992:271; Zhang, 1987[ed.] 2:25)
寄 主：梨、梅、佛手、水杉、喜、桐、烏桕。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州。

1313. **Autoseria japonica** Motschulsky 小金龜 (Chang & Yu, 1950:186; Chao, 1982:211; Zhang, 1985[ed.]:247)
別 名：*小栗金龜子*。
寄 主：梨、櫻桃、葡萄、甘藷、李、梅、柿、棠梨、沙果、水蜜桃、桃、咖啡、西瓜、茶、油茶、刺槐、泡茶、苦楝、麻櫟、白楊、油桐、柯樹、薔薇、黃金樹、女貞、蠶豆、辣椒。
分 佈：福建、江西。

1314. **Chioneosoma reitteri** Semenov 雷氏鰓金龜 (Li, 1987:165-167; Xiao, 1992:379; Zhang, 1996:120)
寄 主：桑、沙拐棗、楊、柳、榆、白茨、鈴鐺刺、沙棗樹。
分 佈：陝西、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古。
天 敵：寄生菌(寄生成蟲及幼蟲)
寄生蜂(寄生幼蟲)
雞、鴨、喜鵲、烏鴉、珠頸斑鳩(地面活動的成蟲及幼蟲)

1315. **Ectinohoplia rufipes** (Motschulsky) 紅腳平爪鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:520)
寄 主：蘋果、李、榛、樺樹的葉子。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯遠東地區、庫頁島。

1316. **Eotrichia titanis** Reitt. 棕色鰓金龜 (Chen et Wang, 1987:159)
寄 主：桃、李、杏、梅等核果類(果)
分 佈：陝西。

1317. **Exolontha serrulata** Gyllenhal 大等鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:500; Zhang, 1992:270)
寄 主：雜食性，板栗、荔枝、梧桐、榕樹、化香、鹽膚木等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、湖北；菲律賓、印度。

1318. **Exolantha umbraculata** Burmeister 影等鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:500; Hun., 1992:424; Zhang et Li, 1997:768)
Exolantha umbraculata Burmeister, 1855:
寄 主：柚子、荔枝、板栗、油桐。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、江蘇、湖北。

1319. **Hilyotrogus bicoloreus** (Heyden) 二色希鰓金龜 (ASZI, 1986,1:503; Zhang et Li, 1997:771)
Hilyotrogus bicoloreus (Heyden, 1887:)
寄 主：核桃楸、櫻桃、桃、梨、李、核桃等闊葉樹的葉子。
分 佈：四川、湖北、河北、遼寧；朝鮮、俄羅斯(遠東地區)。

1320. **Hilyotrogus unguicularis** Fairmaire 爪希鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:503)
寄 主：蘋果。
分 佈：雲南、四川。

1321. **Hilyosternus nepalensis** Hope 尼胸突鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:503)
寄 主：蘋果樹、柳樹、洋槐、大麻、油菜、苜蓿、玉米、豌豆、甘藍等。
分 佈：西藏：印度北部、孟加拉、尼泊爾。

1322. **Hilyotrogus longiclavis** Waterhouse 長棒希鰓金龜 (Yunn., 1987:536)
寄 主：蘋果、梨等果樹。
分 佈：雲南、四川。

1323. **Holotrichia (Pledina) aequabilis** Bates 勻脊鰓金龜 (Yunn., 1987:560)
寄 主：蘋果、楝樹。
分 佈：雲南、四川。

1324. **Holotrichia cochinchina** Nonfried 闊緣齒爪鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:512)
寄 主：蘋果、梨等果樹葉片。
分 佈：廣東、雲南、四川；越南、柬埔寨。

1325. **Holotrichia diomphalia** (Bates) 東北大黑鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:515; Chen et Wang, 1987:159; Chen et al., 1993:105; Heilungjinan, Mudingjiang, 1988[ed.]:167-168; Huang, 1990[ed.]:2:390-393; Liu, 1982[ed.]:157-159; Shang et al., 1981, 8(2):95-100; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:381; Zhang, 1985[ed.]:246; Zhao et al., 1997:189)
別 名：*大黑金龜甲*、*朝鮮金龜子*。
寄 主：雜食性，多達 32 科 94 種，其中栽培主要的果樹、林木及作物：桃、李、梅、蘋果、梨、杏、山楂、棗、栗、桑、紅松、落葉松、樟子松、赤松、榆、楊、柳、槭等苗木根部。
分 佈：福建、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯。

1326. **Holotrichia gebleri** Falder 江南大黑鰓金龜 (Zhang, 1987[ed.]:2:26)
寄 主：梨、櫻桃、沙果、枸橘、板栗、月季、蜀葵、楓楊、白楊、柳、刺槐、苦楝、喜樹、女貞。
分 佈：江西。

1327. **Holotrichia lata** Branske 寬齒爪鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:511; Chang & Yu, 1950:186; Yunn., 1987:562; Zhang, 1987[ed.]:2:26; Zhang, 1992:271; Zhang, 1995:242; Zhang et Li, 1997:774)
Holotrichia lata Branske, 1892:
別 名：*大栗褐色金龜子*。
寄 主：食性極雜，最喜食櫻桃、沙果、梅、板栗、甘薯、樟、榆、漆樹、刺槐、紫藤、楊、柳、白楊、苦楝。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；越南北部。

1328. **Holotrichia oblita** Faldermann 華北大黑金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:152-152-153; Chen et al., 1993:105; Hu et Hu, 1993:128; Hu et al., 1996, 22(4):34; Liu, 1982[ed.]:161; Lou et al., 1988, 15(4):255-259; Song et al.,

1989, 16(2):119-123; Wang, 1987[ed.]:337; Zhou, 1993(3):30)

別 名：*朝鮮黑金龜子*。

寄 主：棗、山楂、梨、蘋果、桃、黑莓、草莓、核桃、桑、楊、柳、櫟、刺槐。

分 佈：江西、江蘇、陝西、華北、甘肅、寧夏、內蒙古。

1329. **Holotrichia ovata** Chang 卵圓齒爪鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:513; Chao, 1982:211; Huang et Gao, 1996:294; Zhang, 1987[ed.]2:26)

別 名：*褐色金龜子*，*龍眼褐色金龜子*。

寄 主：食性甚雜，柑橘、梨、櫻桃、沙果、梅、葡萄、刺槐、白楊、柳、油茶、甘薯。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西。

1330. **Holotrichia parallela** Motschulskly 暗黑鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:511; Chao, 1982:212; Gao et al., 1996(1):32; Hu et Hu, 1993:128; Hu et al., 1996, 22(4):34; Liu, 1982[ed.]:161; Lou et al., 1988, 15(4):255-259; Luo, 1981, 8(3):179-185; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Song et al., 1989, 16(2):119-123; Suzhou, CS., 1985:192-194; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:382; Yang et al., 1993:228-229; Yunn., 1987:565; Zhang, 1987[ed.]2:26; Zhang, 1992:273; Zhang et Li, 1997:774; Zheng, 1982[ed.]:192-194)

Holotrichia parallela Motschulskly, 1854:

=*Holotrichia morosa* Waterhouse, 1875:

寄 主：核桃、蘋果、梨、櫻桃、沙果、草莓、黑莓、桑、榆、柳、楊、槐、蓖麻、白麻、向日葵、花生、大豆、甘薯、甜菜。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(遠東地區)。

1331. **Holotrichia pilipyga** Chang 毛臀齒爪鰓金龜 (Yunn., 1987:562)

寄 主：蘋果。

分 佈：雲南。

1332. **Holotrichia sauteri** Moser 大黑鰓金龜 (Chao, 1982:212; Hu et al., 1996, 22(4):34; Huang et Gao, 1996:296; Huang et Lin, 1987:33-34; Zhang, 1985[ed.]:247; Zhang, 1987[ed.]2:26)

別 名：*棕色金龜甲*。

寄 主：荔枝、龍眼(嫩梢、花穗)、梅、海棠、黑莓、茶、月季、女貞、甘薯。

分 佈：福建(沿海)、江西、長江以南地區。

1333. **Holotrichia serobriculata** Brenske 暗黑金龜 (Chen et Wang, 1987:159)

寄 主：桃、李、杏、梅等核果類

分 佈：陝西。

1334. **Holotrichia (Pledina) sinensis** Hope 華脊鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:509; Chao, 1982:212; Huang et Gao, 1996:296; Hun., 1992:429; Yunn., 1987:558; Zhang, 1992:271; Zhang et Li, 1997:772)

Holotrichia sinensis Hope, 1845:

寄 主：荔枝、龍眼(根部)、楓、漆樹、鹽膚木、桉樹、楓楊、槭、化香等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東。

1335. **Holotrichia titanis** (Reitter) 棕色鰓金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:153-154; Heilongjiang, Mudingjiang

FS, 1998[ed.]:168-169; Liu, 1982[ed.]: 161)
寄 主：苗木、榆、刺槐、珍珠梅、紫藤等葉；紅松、落葉松(根部)。
分 佈：浙江、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧。

1336. **Hoplia cincticollis** (Faldermann) 圍綠單爪鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:521)
寄 主：梨、楊、榆等。
分 佈：河南、甘肅、寧夏、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1337. **Hoplosternus incanus** Motschulsky 灰胸突鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:502; Liu, 1982[ed.]:161; Zhang, 1992:270; Zhang et Li, 1997:769)
寄 主：各種果樹、林木的葉片。
分 佈：江西、湖南、貴州、四川、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯遠東地區。

1338. **Lepidiota bimaculata** Saunders 二斑鱗鰓金龜 (Yunn., 1987:558)
寄 主：橡果。
分 佈：廣東、廣西、雲南。

1339. **Lepidiota nana** Sharp 葡萄鰓金龜 (Chang, 1987:41)
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

1340. **Lepidiota stigma** Fabricius 痣鱗鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:508; Luo, 1991:86)
寄 主：菠蘿蜜、荔枝、腰果、柯木、大葉榕、小葉榕、橡膠、桉樹。
分 佈：廣東、海南、廣西；馬來西亞、印尼。

1341. **Lepidiota** sp. 大土黃鰓金龜 (Zhang, 1987[ed.]:2:26)
寄 主：松、茶、油桐。
分 佈：江西。

1342. **Maladera castanea** (Arrow) 栗瑪絨金龜 (Tan et al., 1999, 26(3):213-218)
寄 主：荔枝。
分 佈：廣西。

1343. **Maladera japonica** Motschulsky 紫絨金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:157; Zhang, 1992:274; Zhang, 1995:243; Zhang et Li, 1997:777)
Maladera japonica Motschulsky, 1860:
別 名：*日本瑪絨金龜*。
寄 主：板栗、桑、刺槐、紫穗槐等闊葉樹。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、浙江、湖北、東南沿海各省、陝西；日本。

1344. **Maladera orientalis** Motschulsky 黑絨鰓金龜 (Chen et Wang, 1987:159; Chen et al., 1997:19; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:385)
別 名：*天鵝絨金龜子*、*東方金龜子*。
寄 主：食性雜，爲害 149 種植物，最喜取食楊、柳、榆、蘋果、梨、桃、李、梅、杏、櫻桃、山楂、檸檬、草莓、棗、柿、桑、等嫩芽和葉片。

分 佈：全國普遍發生，臺灣、福建、江西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、山東、青海、甘肅、寧夏、陝西、河南、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、蒙古。

1345. **Maladera ovatula** (Fairmaire) 小闊腔絹金龜 (Huang et Gao, 1996:296)

別 名：*豆形絨金龜*。
寄 主：荔枝、龍眼。
分 佈：福建。

1346. **Maladera verticalis** Fairmaire 闊腔鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:519; Chen et Wang, 1987:159; Hu et al., 1996, 22(4):34; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:386)

別 名：*闊腔絨金龜*，*旧銹絹鰓金龜*。
寄 主：梨、蘋果、沙果、黑莓、葡萄、桑、榆、柳、楊、油茶、刺槐、紫穗槐、櫟、泡桐、棉、蠶豆。
分 佈：江西、雲南、安徽、江蘇、河南、陝西、山西、山東、河北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蘇聯。

1347. **Melolontha hippocastani** Fabricius 大栗鰓金龜 (Xiao, 1992:387)

寄 主：松、杉、樺、楊和農作物、牧草。
分 佈：四川、青海、陝西、甘肅、內蒙古。
天 敵：寄生菌
寄生蠅
鴉、鵲、鷹、雕、獾豬。

1348. **Melolontha incanus** (Motschulsky) 灰粉鰓金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:155)

寄 主：柞樹、樟子松、落葉松、楊、柳、榆等多種針闊葉樹根部。
分 佈：河南、山西、河北、遼寧、吉林、黑龍江。

1349. **Melolontha rubignosa** Fabricius 銹褐鰓金龜 (Huang et Gao, 1966:296; Zhang, 1987[ed.]:2-27; Zhao et al., 1997:189)

寄 主：梨、榛、柑橘、荔枝、龍眼、栗、桑、楓楊、刺槐、麻櫟。
分 佈：福建、江西。

1350. **Melolentha tarimensis** Semenov 塔里木鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:502; Xiao, 1992:388)

寄 主：胡桃、榆。
分 佈：新疆。
天 敵：白僵菌(成蟲,幼蟲,蛹)
狼蛛
雞、鴨、鵝、戴勝、寒鴉、烏鶇、喜鵲
蜥蜴

1351. **Metabolus flavescens** Brenske 小黃鰓金龜 (ASZI, 1986, 1:509; Gao et al., 1994(1):33-34; Hua., 1992:427; Xiao, 1992:390; Zhang, 1995:242)

寄 主：蘋果、山楂、梨、西府海棠、絨毛白蠟、楊、柳、丁香等葉片；幼蟲在土食害樹木根部。
分 佈：湖南、江西、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧；

朝鮮。

1352. **Polyphylla chinensis** Fairmaire 雲斑金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:156-157)
別 名：*花石金龜*。
寄 主：油松(針葉)、楊、柳多種闊葉樹。
分 佈：北方地區較常見。

1353. **Polyphylla davidis** Fairmaire 戴雲鰓金龜 (Zhang, 1992:270; Zhang et Li, 1997:768)
Polyphylla davidis Fairmaire, 1888:
寄 主：松針、甘薯、花生、小麥、煙草、竹、桤木、麻柳、青岡櫟、苦楝等。
分 佈：福建、四川、浙江、湖北。

1354. **Polyphylla formosana** Niijima et Matsumura 臺雲鰓金龜 (Zhang, 1987[ed.] 2:27)
寄 主：橘、蘋果、松、棉、油桐。
分 佈：江西。

1355. **Polyphylla gracilicornis** Blanchard 小雲斑鰓金龜 (Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Xiao, 1992:391)
寄 主：林木幼苗、果樹及各類農作物。
分 佈：四川、貴州、浙江、江蘇、青海、寧夏、甘肅、陝西、河南、山西、山東、河北、內蒙古、新疆、遼寧。

1356. **Polyphylla laticollis** Lewis 雲斑鰓金龜 (Liu, 1982[ed.]:161)
寄 主：林木、果樹。
分 佈：華北。

1357. **Polyphylla** sp. 雲斑金龜 (Zhang, 1985[ed.]:247)
寄 主：茶等。
分 佈：安徽。

1358. **Serica boops** Waterhous 豆形鰓金龜 (Luo, 1991:96)
寄 主：腰果(小苗)。
分 佈：海南。

1359. **Serica orientalis** Motschulsky 黑絨金龜 (ASZI, 1986, 1:519; Beijing FC., 1980[ed.]:156; Chen et al., 1993:105; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:169-171; Hu et Hu, 1993:128; Hu et Wang, 1996:43-44; Hu et al., 1996(2):52-53; Hu et al., 1996, 22(4):34; Hua et Zhang, 1996:34-35; Huang, 1990[ed.] 2:75-77; Huang et Lin, 1993(2):42; Liu, 1982[ed.]:160, 161; Long, 1993(2):43; Sun, 1984:388-390; Suzhou, CS., 1985:186-188; Tsai & Hwang, 1963:490-505; Wang, 1987[ed.]:338; Wang et al., 1997:22-23; Wu, 2000(1):21; Xia, 1996(2):43; Zhang, 1985[ed.]:246-247; Zhang, 1987[ed.] (2):27; Zhang et Li, 1997:777; Zheng, 1982[ed.]:186-188)
Serica orientalis Motschulsky, 1857:
=*Maladera orientalis* (Motschulsky)
別 名：*東方絹金龜*，*東方絨金龜*，*天鵝絨金龜子*，*棕絨金龜子*，*黑絨鰓金龜*。
寄 主：雜食性，可取食 45 科 116 屬 149 種植物，喜食榆、楊、柳，是防護林、蘋果、梨、梅、李、杏、草莓、黑莓、棗、柿、栗、桑、葡萄、楊梅、果樹、苗圃的大害蟲，也爲害田間作物大豆、向日葵、麥類、玉米、高粱、甜菜、甘薯、棉、亞麻、蘿蔔。

分 佈：臺灣、福建、江西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、日本、俄羅斯(遠東地區)。

1360. **Serica** sp. 姬豆形鰓金龜 (Chao, 1982:213)

寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

1361. **Serica** sp. 豆形鰓金龜 (Luo et Jin, 1995:86)

寄 主：酪梨。

分 佈：海南。

1362. **Sophrops lata** Frey 寬索鰓金龜 (Huang et Gao, 1996:295; Wu et al., 1992:40-45)

寄 主：中華獼猴桃(*Actinidia chinensis* Planch)

毛花獼猴桃(*Actinidia eriantha* Benth.)

棕毛獼猴桃(*Actinidia fulvicoma* Hance.)

葡萄科

分 佈：福建。

1363. **Trematodes grandis** Semenov 大鰓鰓金龜 (Xiao, 1992:396)

寄 主：踏朗、花棒、早柳、檉條、沙蒿，也爲害果樹、蔬菜和農作物。

分 佈：四川、貴州、青海、寧夏、甘肅、陝西、河南、山西、山東、河北、內蒙古、新疆、遼寧。

天 敵：真菌

Metarrhizium anisopliae (Metsch.) Soro. 金龜子綠僵菌

白頸烏鴉

蜥蜴、沙蜥(俗稱沙和尙)

Rutelidae 麗金龜科

(Liang et al., 1995(1):40; Liao, 1994(4):45)

1364. **Adoretus (Chaehtadoretus) formosanus** Ohaus 臺灣茶色金龜 (Chang & Hung, 1986: 115)

寄 主：柑橘類、錫蘭橄欖、可可樹、蓖麻、苧麻、黃麻。

分 佈：臺灣。

1365. **Adoretus hirsutus** Ohaus 中喙麗金龜 (Tan et al., 1999, 26(3):213-218)

寄 主：荔枝。

分 佈：廣西。

1366. **Adoretus (Leptadoretus) sinicus** Burmeister 中喙麗金龜 (ASZI, 1986, 1:531; Chang, 1987:41; Chang et Hung, 1986:115; Chao, 1982:214; Gong, 1999(2):36; Huang et Gao, 1996:295; Huang et Lin, 1993(2):42; Hun., 1992:432; Luo et Jin, 1995:86; Lu, 1996(2):48-49; Wu, 2000(1):21; Xia, 1996(2):43; Xiao, 1992:375; Zhang, 1987[ed.] 2:23)

別 名：*中華喙麗金龜*、*長金龜*、*中國茶金龜*、*粉蚊*、*茶色金龜子*、*散點圓頭金龜子*。

寄 主：葡萄、板栗、梨、蘋果、杏、桃、李、櫻桃、柿、可可樹、蓮霧、龍眼、檬果、柑橘、酪梨、桑、茶、刺槐、玉米、絲瓜、菜豆、芝麻、甘薯、黃麻、棉花、篦麻、榆、油桐、梧桐、烏桕、楓香、白楊、薄殼山核桃、合歡、楝樹、南仁樹、楓楊、薔薇類等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、山東；朝鮮、日本、琉球、越南、寮國、柬埔寨、印尼、緬甸、印度、夏威夷。

1367. **Adoretus tenuimaculatus** Waterhouse 斑點喙麗金龜 (ASZI, 1986, 1:530; Chang, et al., 1955:199; Chang & Hung, 1986:115; Chao, 1982:214; Chen et Wang, 1987:159; Hu et al., 1996, 22(4):35; Huang et Gao, 1996:295; Huang et Lin, 1993(2):42; Hun., 1992:432; Liu, 1992:281; 1997:803; Wang, 1987[ed.]:339; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:376)

Adoretus tenuimaculana Waterhouse, 1975:

別 名：*茶色金龜*，*茶色金龜子*，*葡萄金龜子*，*毛斑喙麗金龜*。

寄 主：葡萄、板栗、核桃、梨、蘋果、杏、梅、桃、李、櫻桃、黑莓、柿、蓖、桑、松、杉、茶、玉米、高粱、粟、大豆、向日葵、絲瓜、菜豆、棉、芝麻、甘蔗、油茶、篦麻、黃麻、棉花、杉、榆、刺槐、油桐、梧桐、法國梧桐、泡桐、桉樹、烏桕、白楊、楊、柳、木槿、黃檀、楓楊、檬類、油棕等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印尼、夏威夷。

1368. **Anomala anthusa** Ohaus 花麗金龜 (Chang, 1987:41; Chang & Hung, 1986:115; Chao, 1982:214)

寄 主：桃、李、龍眼、柿、檬果、柑橘類、葡萄。

分 佈：臺灣、福建。

1369. **Anomala antiqua** (Gyllenhal) 銅黑異麗金龜 (Chao, 1982:214; Liu et Zhang, 1998, 20(2):76; Tong et Fang, 1989:150-151)

寄 主：桃、無花果、荔枝、泡桐、女貞、懸鈴木、杜仲、樟、梓。

分 佈：福建、江西、廣東、浙江、河南等。

1370. **Anomala auracoides** Ohaus 臺灣條金龜 (Chang & Hung, 1986:115)

寄 主：琉球松、德達松。

分 佈：臺灣。

1371. **Anomala castaneoventris** Bates 紅腹金龜 (Chang, 1987:41)

寄 主：葡萄。

分 佈：臺灣。

1372. **Anomala corpulenta** Motschulsky 銅綠麗金龜 (ASZI, 1986, 1:525; Beijing FC., 1980[ed.]:154-155; Chao, 1982:215; Chen et Wang, 1987:159; Chen et al., 1993:35, Heilongjing, Mudingjiang FS. 1988[ed.]:166-167; Hu et Hu, 1993:128; Hu et al., 1996, 22(4):35; Hua et Zhang, 1996:34-35, 105; Huang, 1990[ed.] 2:77-78, Hun., 1992:433; Kuoh et Chang, 1959, 9(6):491-514; Lin, 1992:281; Liu, 1982[ed.]:159-160, 161; Lou et al., 1988, 15(4):255-259, Miao, 1995(2):46; NZWDI, 1981:1718; Sun, 1985, 12(4):253-259; Suzhou, CS., 1985:194-195; Wang, 1987[ed.]:338; Wang et al., 1997:22-23; Wu, 2000(1):21; Wu et Wu, 1997:49-50; Xia, 1996(2):43; Xiao, 1992:377; Xue et Zhang, 1997, 14(2):45; Yang et al., 1993:228-229, Zhang, 1985[ed.]:244245; Zhang, 1995:245; Zhang et Liu, 1993(3):38; Zhao et al., 1997:189; Zheng, 1982[ed.]:194-195)

Anomala corpulenta Motschulsky, 1853:
別 名：*銅綠金龜子*，*銅綠異麗金龜*。
寄 主：板栗、核桃、蘋果、梨、杜梨、桃、梅、李、榛、杏、櫻桃、沙果、紅花、海棠、黑莓、草莓、棗、葡萄、柿、油橄欖、桑、松、茶、白楊、柳、楓、榆、杉、櫟、油桐、油茶、烏桕、木麻黃、柏、槭樹、丁香等多種果樹和林木及大豆、花生、甘薯、玉米、向日葵、豆類。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古。

1373. **Anomala coxalis** Bates 深綠麗金龜 (Hu et al., 1996, 22(4):35; Lin, 1992:281; 1997:796)
Anomala coxalis Bates, 1891:
=*Amomala heydeni* Frivaldszky, 1892:124.
別 名：*深綠異麗金龜*。
寄 主：黑莓。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西，長江以南諸省；越南。

1374. **Anomala cupripes** Hope 紅腳綠麗金龜 (ASZI, 1986, 1:526; Chang, 1987:41; 1988:425; Chang & Hung, 1986:115; Chao, 1982:215; Chu et Juang, 1986:113; Chu et al., 1987:33-44; 1982:23-33; 34-52; Gong, 1999(2):36; Huang et Gao, 1996:294; Huang et Lin, 1993(2):42; Luo, 1991:96; Luo et Jin, 1995:86; Luo et al., 1996:57; Wang et Liu, 1991:17-24; Xia, 1996(2):43; Xiao, 1992:378; Zhang, 1985[col.]:247)
別 名：*紅腳綠光金龜子*，*紅豆金龜子*，*紅腳麗金龜*，*赤腳銅金龜*，*大綠麗金龜*。
寄 主：荔枝、龍眼、檬果，柑橘，櫻桃、蓮霧，楊桃，葡萄，栗、橄欖、酪梨，腰果、桑、松、茶、大豆、柳、杉、白楊、油桐、小葉榕、鳳凰木、大葉桉、相思樹，大葉榕、三年桐、油茶、柯樹等多種果樹及林木、甘蔗、棉、黃麻、向日葵、豆類、茄子。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、四川、浙江、湖北；越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸。
天 敵：*Oecophylla smaragdina* Fabricius 黃柑蟻

1375. **Anomala ebenina** Fairmaire 漆黑異麗金龜 (Chao, 1982:215; Lin, 1992:505; 1997:799; Yunn., 1987:569; Zhang, 1995:246)
Anomala ebenina Fairmaire, 1886:
別 名：*漆黑異麗蚊*。
寄 主：核桃、樟、櫟。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；蒙古。

1376. **Anomala exoleta** Faldermann 黃褐麗金龜 (ASZI, 1986, 1:527)
寄 主：杏樹的花、葉，及楊、榆、大豆等植物葉子。
分 佈：河南、寧夏、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

1377. **Anomala expansa** Bates 臺灣青銅金龜 (Chang, 1982:388; 1987:41; 1988:425; Chang & Hung, 1986:115; Chao, 1982:215; Chen et Chang, 1990:363; Hu et al., 1996, 22(4):35)
寄 主：柑橘、檬果、龍眼、黑莓、蓮霧、葡萄、杉木、柳杉、油桐、日本油

桐、烏桕、栲皮樹、鳳凰木、榕樹、相思樹。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、華南。

1378. **Anomala gudzenkoi** Jacobs 古基畸麗金龜 (Huang et Lin, 1993(2):42)
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

1379. **Anomala luculenta** Erichson 側斑麗金龜 (ASZI, 1986, 1:528)
寄 主：板栗、核桃楸、尖柞、小灌木等葉片。
分 佈：山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、俄羅斯遠東地區。

1380. **Anomala mongolica** Faldermann 蒙古麗金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:157; Hu et al., 1996, 22(4):35; Liu, 1982[ed.]:161)
寄 主：黑莓、楊、柞、山里紅等樹葉。
分 佈：江蘇、華東、華北、內蒙古、東北。

1381. **Anomala rubuioes** Lin 紅腳異麗金龜 (Liu et Zhang, 1998, 20(2):76)
寄 主：荔枝。
分 佈：廣東。

1382. **Anomala siamensis** (Nontried) 突唇異麗金龜 (Lin, 1992:510; Yunn., 1987:570)
Anomala siamensis (Nontried, 1891:)
別 名：*突唇異麗蚊*。
寄 主：桃樹、泡桐。
分 佈：福建、廣東、雲南；越南、泰國。

1383. **Anomala sieversi** Heyden 油桐綠麗金龜 (Chao, 1982:216; Zhang, 1987[ed.] 2:24)
別 名：*蘋綠麗金龜*。
寄 主：板栗、蘋果、梨、沙果、葡萄、油桐、油茶、野薔薇。
分 佈：福建。

1384. **Anomala splendens** (Gyllenhal) 光綠麗金龜 (Zhao et al., 1997:189)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

1385. **Anomala sulcipennnis** Faldermann 弱脊異麗金龜 (ASZI, 1986, 1:528; Hun., 1992:433; Lin, 1992:282; 1997:797)
Anomala sulcipennnis Faldermann, 1838:
別 名：*蛙翅麗金龜*。
寄 主：蘋果、梨等果樹葉片。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、南京、湖北、南、陝西、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧。

1386. **Anomala (Euchlora) trachypyga** Bates 小青銅金龜 (Chang & Hung, 1986:115)
寄 主：錫蘭橄欖、檬果、柑橘類、茄苳、樟、楝、白楊、相思樹、棉。

分 佈：臺灣。

1387. **Anomala virdis** Fabricius 綠麗金龜 (Zhao et al., 1997:189)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

1388. **Mimela chinensis** Kirby 中華艷麗金龜 (Lin, 1992:282; 1992:515; 1997:800; Zhang, 1987[ed.] 2:25; Zhang, 1995:246)

Mimela chinensis Kirby, 1825:

別 名：*中華彩麗金龜*。

寄 主：葡萄、油茶、油桐。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江；中南半島。

1389. **Mimela cyanipes** Newman 藍足彩麗金龜 (Yunn., 1987:568)

別 名：*藍足彩麗蚊*。

寄 主：梨樹、冬瓜。

分 佈：雲南、西藏、四川；越南、緬甸。

1390. **Mimela ohausi** Arrow 富色彩麗金龜 (Yunn., 1987:568)

別 名：*富色彩麗蚊*。

寄 主：蘋果、板栗、桉樹。

分 佈：雲南、四川；越南、印度。

1391. **Mimela specularis** Ohaus 油茶黃綠麗金龜 (Lin, 1992:516; 1997:800; Zhang, 1987[ed.] 2:25)

Mimela specularis Ohaus, 1902:

別 名：*背溝彩麗金龜*。

寄 主：栗、毛栗、油茶、白櫟、擦木。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、四川、陝西；越南。

1392. **Mimela splendens** (Gyllenhal) 墨綠彩麗金龜 (ASZI, 1986, 1:529; Hun., 1992:433; Lin, 1992:283; 1992:516; 1997:801; Zhang, 1987[ed.] 2:25; Zhang, 1995:246)

Mimela splendens (Gyllenhal, 1817:)

別 名：*亮綠彩麗金龜*。

寄 主：蘋果、李、栗、茶、油桐、櫟等葉片。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、越南、緬甸。

1393. **Mimela testaceoviridis** (Blanchard) 淺褐彩麗金龜 (ASZI, 1986, 1:529; Chao, 1982:217; Hu et al., 1996, 22(4):35; Hun., 1992:434; Zhang, 1987[ed.] 2:25)

別 名：*黃閃彩麗金龜*、*黃艷金龜*。

寄 主：蘋果、黑莓、葡萄、柑橘、茄苳、楊、榆等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、山東、河北；朝鮮、日本。

1394. **Phyllopertha irregularis** Waterhouse 黃條葉麗金龜 (Huang et Gao, 1996:294)

寄 主：

分 佈：

1395. **Popillia atrocoerulea** Bates 琉璃弧麗金龜 (Chao, 1982:217; Hu et al., 1996, 22(4):35; Huang et Lin, 1993(2):42; Hun., 1992:435; Li et al., 1995, 21(1):30-31; Zhang, 1987[ed.] 2:25)

寄 主：桃、蘋果、黑莓、葡萄、玫瑰、榆樹。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北、遼寧；朝鮮。

1396. **Popillia histeroidea** (Gyllenhal) 小青豆金龜 (Chang & Hung, 1986:117; Chao, 1982:217; Chow et Lin, 1984:128; Lin, 1992:283; 1992:518; 1997:802)

Popillia histeroides (Gyllenhal, 1817:)

=*Popillia coerulea*

別 名：*弱斑弧麗金龜*。

寄 主：柑橘類、果樹類(花、葉)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北；越南、緬甸、印度。

1397. **Popillia mutans** Newman 無斑弧麗金龜 (Chang & Hung, 1986:117; Chao, 1982:217; Chow et Lin, 1984:128; Hun., 1992:435; Lin, 1992:283; 1992:519; 1997:802; Zhang, 1987[ed.] 2:25; Zhang, 1995:245)

Popillia mutans Newman, 1838:

別 名：*棉弧麗金龜*，*臺灣琉璃豆金龜*，*靛蛟*，*棉藍金龜子*，*藍黑金龜子*，*豆藍金龜子*。

寄 主：李、蘋果、黑莓、葡萄、咖啡、茶、大豆、胡枝子、棉、甘薯、玉米花絲、木槿、油茶、月季、玫瑰、芍藥、木芙蓉、紫薇的花器以及多種果木的花器，葉片。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林，全國各省區；朝鮮、日本、菲律賓、越南、印度。

1398. **Popillia quadriguttata** (Fabricius) 四紋麗金龜 (Chen et Wang, 1987:159; Chow et Lin, 1984:128; Hu et al., 1996, 22(4):35; Huang et Gao, 1996:295; Huang et Lin, 1993(2):42; Hun., 1992:536; Lin, 1992:519; Sang, 1979:478-480; Sun, 1984:390-392; Wu, 2000(1):21; Xaio, 1992: 392)

別 名：*中華弧麗金龜*，*四紋蛟*。

寄 主：葡萄、蘋果、梨、桃、李、杏、梅、山楂、黑莓、山櫻桃(*Prunus sachalinensis* Koide)、托盤(*Rubus crataegifolius* Bunge)、板栗、核桃、等核果類、榛、高粱、小麥、馬鈴薯、甘薯、花生、大豆、棉、花椒、大豆、玉米、楊、柳櫟、榆、紫穗槐等 30 種以上的植物及雜草。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、越南。

1399. **Popillia taiwana** Arrow 臺灣弧麗金龜 (Zhao et al., 1997:189)

寄 主：榛。

分 佈：福建。

1400. **Popillia** sp. 豆金龜 (Zhang, 1987[ed.] 2:25)

寄 主：葡萄、蒲瓜、大豆、花生、小豆、玉米。

分 佈：江西。

1401. **Proagopertha lucidula** (Faldermann) 蘋毛麗金龜 (ASZI, 1986, 1:524; Beijing FC., 1980[ed.]:157; Chen et Wang, 1987:159; Hu et al., 1996, 22(4):34; Hua et Zhang, 1996:34-35; Huang, 1990[ed.] 2:74-85; Lee, et al., 1972:25-31; Liu, 1982[ed.]:161; NZWDI, 1981:1717; Sun, 1984:392-393; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:394)

別 名：*蘋毛金龜子*，*長毛金龜甲*，*棕棕茶色龜甲*。

寄 主：雜食，蘋果、梨、桃、山毛桃、櫻桃、杏、山定子、歐李、山楂、山里紅、黑莓、桑、葡萄、楊、柳、榆、刺槐、豆類、蔥等達 11 科 30 種。

分 佈：四川、貴州、江西、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、甘肅、山西、山東、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

1402. **Pseudosinghala dallmanni** Gyllanhal 黃邊短麗金龜 (Huang et Gao, 1996:294)

寄 主：龍眼(花穗)、柑橘。

分 佈：福建。

1403. **Spilopopillia** sp. 咖啡花金龜 (Chao, 1982:218)

寄 主：咖啡。

分 佈：福建。

Cetoniidae 花金龜科

(Liang et al., 1995(1):40)

1404. **Agestrata orichalcea** (Linnaeus) 綠奇花金龜 (ASZI, 1986, 1:547; Chao, 1982:218)

寄 主：荔枝、龍眼、柑橘等果樹。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州；印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

1405. **Campsiura mirabilis** (Faldermann) 赭翅臀花金龜 (Ma, 1992:286; 1992:530; 1997:787)

Campsiura mirabilis (Faldermann, 1835:)

寄 主：柑橘、板栗、櫟類、松等。

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、湖北、陝西、山西、河北、北京、寧夏、遼寧。

1406. **Campsiura omisiena** Heller 黃帶臀花金龜 (Ma, 1997:787)

Campsiura omisiena Heller, 1923:

寄 主：柑橘、板栗、麻櫟等。

分 佈：江西、湖南、雲南、四川。

1407. **Cetonia aurata** (Linnaeus) 金綠花金龜 (ASZI, 1986, 1:543)

寄 主：葡萄、桃、梨、杏、蘋果、櫻桃等果樹和林木。

分 佈：內蒙古、新疆；蘇聯、蒙古、中亞細亞。

1408. **Cetonia magnifica** Ballion 長毛花金龜 (ASZI, 1986, 1:543; Cao et Peng, 1993:24; Wu, 2000(1):21)

寄 主：蘋果、梨、山楂、松樹、槐、玉米、高粱等的花。

分 佈：河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1409. **Cetonia pilifera** Motschulsky 銅綠花金龜 (Luo et al., 1996:57)

寄 主：橡果(葉)。
分 佈：海南。

1410. **Cetonia (Eucetonia) rutilans** Janson 銅紅花金龜 (Hun., 1992:446; Ma, 1992:285)
寄 主：松、櫟類等植物的花。
分 佈：湖南、西藏、湖北；印度、錫金、尼泊爾。

1411. **Coilodera flavofasciata** Moser 橫帶瘦花金龜 (ASZI, 1986, 1:540)
寄 主：柑橘、櫟類、傘形科植物。
分 佈：福建、雲南；越南、印度、不丹。

1412. **Coilodera mouhoti** Wallace 一帶瘦花金龜 (Yunn, 1987:573)
寄 主：柑橘、榆、灌木。
分 佈：雲南；越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸。

1413. **Coilodera penicillata** (Hope) 脊瘦花金龜 (ASZI, 1986, 1:539; Hun., 1992:439; Ma, 1992:284; Yunn., 1987:573)
寄 主：柑橘、櫟類等植物的花。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南；越南、寮國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

1414. **Coilodera quadrilineata** Hope 四帶瘦花金龜 (ASZI, 1986, 1:540; Yunn., 1987:573)
寄 主：柑橘、槟榔、麻櫟、櫟類、鐵杉科等果樹和林木植物的花。
分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、西藏；寮國、緬甸、錫金、尼泊爾。

1415. **Cosmiomorpha modesta** Saunders 褐鱗花金龜 (ASZI, 1986, 1:538; Hun., 1992:441; Ma, 1992:284)
寄 主：柑橘、板栗、麻櫟等果和林木的花。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、雲南、四川、廣西、廣東、浙江、江蘇、湖北、河北。

1416. **Cosmiomorpha setulosa** Westwood 毛鱗花金龜 (Hun., 1992:442; Ma, 1992:285; 1992:525; 1997:782; Yunn., 1987: 572)
Cosmiomorpha setulosa Westwood, 1864:
寄 主：桃樹、柑橘、板栗、櫟類、雜木、灌木植物的花。
分 佈：江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北。

1417. **Dicranobia potanini** (Kraatz) 綠凹緣花金龜 (Ma, 1992:528)
Dicranobia potanini (Kraatz, 1889:)
寄 主：柑橘、櫟類、雜木等植物的花。
分 佈：雲南、西藏、四川、河南、甘肅。

1418. **Dicranocephalus adamsi** Pascoe 寬帶鹿花金龜 (ASZI, 1986, 1:538; Hun., 1992:441; Ma, 1992:284; 1992:525; 1997: 780)
Dicranocephalus adamsi Pascoe, 1863:
寄 主：梨、松、麻櫟、櫟類、等果樹和林木植物的花。

分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、湖北、河南；朝鮮、越南。

1419. **Dicranocephalus bourgoini** Pouillande 臺灣角金龜 (Chen, 1981:42)

寄 主：蓮霧。

分 佈：臺灣。

1420. **Dicranocephalus dabryi** Ausux 光斑鹿花金龜 (Ma, 1992:525; 1997:781)

Dicranocephalus dbryi Ausux, 1869:

寄 主：柑橘、松、樸類等(花)

分 佈：雲南、四川、湖北

1421. **Dicranocephalus wallichi bowring** Pascoe 黃粉鹿花金龜 (ASZI, 1986, 1:538; Hun., 1992: 441; Ma, 1997:780)

Dicranocephalus wallichi bowring Pascoe, 1863:

寄 主：梨、松、板栗、樸類、麻樸、大麻等果樹和林木的花。

分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、山東、河北；緬甸、印度、錫金。

1422. **Euselates quadrilineata** Hope 四帶麗花金龜 (Hun., 1992:440; Ma, 1992:284)

寄 主：柑橘、沙田柚、槭樹、樸類等植物的花。

分 佈：湖南、廣西、雲南、西藏、四川；寮國、緬甸、錫金、尼泊爾。

1423. **Glycyphana fulvistemma** (Motschulsky) 黃斑短突花金龜 (ASZI, 1986, 1:546; Cao et Peng, 1993:24; Hun., 1992:449; Ma, 1992:286; 1992:529; 1997:785; Wu, 2000(1):21; Zhang, 1987[ed.] 2:27)

Glycyphana fulvistemma (Motschulsky, 1860:)

寄 主：柑橘、蘋果、梨、桃、山楂、栗、松、胡蘿蔔、油桐、楊、柳、樸類、柞樹、玉米、棉花、黃麻、野薔薇、雜木等植物的花。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

1424. **Glycyphana horsfieldi** (Hope) 紅綠短突花金龜 (Ma, 1992:286, 1992:529)

寄 主：柑橘、柿、松、樸類、泡桐、雜灌木等花和嫩芽。

分 佈：廣西、貴州、雲南、四川、湖北；緬甸、印度、孟加拉、錫金、不丹、尼泊爾。

1425. **Ingrisma viridipallens** Boutigoin 螢擴唇花金龜 (Yunn., 1987:574)

寄 主：板栗、雜木。

分 佈：雲南、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸。

1426. **Liocola brevitarsis** Lewis 銅色白紋金龜 (Beijing FC., 1980[ed.]:157; Chang, et al., 1955:204; Chao, 1982:219; Ding, 1998(2):44; Huang, 1990[ed.] 2:79-81; Liu, 1982[ed.]:161; Niu et al., 1993:29)

別 名：*白星金龜子*，*白星花潛*。

寄 主：柑橘、檸果、蘋果、桃、李、沙果、櫻桃、山楂、無花果、麻樸、榆、玉米等葉片、花和果實。

分 佈：福建、江西、山西、全國除新疆外均有發生。

1427. **Moseriana rugulosa** Ma 皺莫花金龜 (Ma, 1990:344; 1997:782)

Moseriana rugulosa Ma, 1990:344.

寄 主：板栗、櫟樹、白楊等果樹和林木的花。

分 佈：廣西、雲南、四川、貴州、湖北、陝西。

1428. **Mycteristes microphyllus** Wood-Mason 褐色頭花金龜 (Ma, 1992:525)

Mycteristes microphyllus Wood-Mason, 1881:

寄 主：松樹、櫟類等花。

分 佈：雲南、四川；印度、錫金、不丹。

1429. **Neophaedimus auzouxi** Lucas 褐斑背角花金龜 (Ma, 1997:781)

Neophaedimus auzouxi Lucas, 1870:

寄 主：板栗、櫟類等

分 佈：四川、湖北、陝西、甘肅。

1430. **Oxycetoma bealiae** (Gory et Percheron) 斑青花金龜 (Hu et al., 1996, 22(4):35; Hun., 1992:450; Ma, 1992:286; 1992:529; 1995:249; 1997:786; Yunn., 1987:577)

Oxycetoma bealiae (Gory et Percheron, 1833:)

寄 主：柑橘、蘋果、梨、杏、桃、梅、黑莓、栗、松、白蠟樹、櫟類、女貞、玫瑰、油桐、櫟類、女貞、月季、雜木、胡蘿蔔、蔥、油茶(花部)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；越南、印度。

1431. **Oxycetonia jucunda** (Faldermann) 小青花金龜 (ASZI, 1986, 1:546; Beijing FC., 1980[ed.]:157; Chao, 1982:219; Chen et Wang, 1987:159; Chen et al., 1993:37; Hu et al., 1993, 19(1):25-26; Hu et al., 1996, 22(4):35; Hua et Zhang, 1996:34-35; Huang, 1990[ed.] 2:79; Huang et Gao, 1996:294; Hun., 1992:450; Liu, 1982[ed.]:161; Ma, 1992:286; 1992:529; 1997:786; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:390; Zhang, 1987[ed.] 2:27; Zhao et al., 1998(4):29)

Oxycetonia jucunda (Faldermann, 1835:)

別 名：*潛花蚊*、*小青花蚊*。

寄 主：山楂、蘋果、桃、杏、梅、梨、黑莓、棗、柑橘、葡萄、板栗、櫟、楓、玫瑰、薔薇、月菊、胡蘿蔔、蔥、玉米、高粱、油茶、柞樹、櫟類、棉花。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯(遠東地區)、印度、孟加拉、錫金、尼泊爾、北美洲。

1432. **Poecilophilides rusticola** Burmeister 褐銹花金龜 (Hu et al., 1996, 22(4):35; Zhang, 1987[ed.] 2:28)

寄 主：柑橘、蘋果、梨、桃、李、黑莓、玉米、高粱、向日葵、棉、榆、櫟、櫟。

分 佈：江西。

1433. **Potosia aerata** Erichson 凸星花金龜 (ASZI, 1986, 1:544; Chang & Hung, 1986:117; Wu, 2000(1):21)

別 名：*白點花金龜*。

寄 主：桃、蘋果、柑橘類、果樹類、玉米、高粱、大麻、麻櫟等農作物、林木的花和成熟的水果等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、山東、河北、遼寧、黑龍江。

1434. **Potosia (Liocola) brevitarsis** (Lewis) 白星花金龜 (ASZI, 1986, 1:544; Chen et Wang, 1987:159; Chen et al., 1993:38; Hu et al., 1996, 22(4):35; Hua et Zhang, 1996:34-35; Huang et Gao, 1966:296; Huang et Lin, 1993(2):42; Hun., 1992:446; Wu, 2000(1):21; Xiao, 1992:394; Zhang, 1987[ed.]:228; Zhang, 1994:37-38; Zhao et al., 1998(4):29)

別 名：*白紋絢花金龜*。

寄 主：蘋果、梨、桃、杏、李、海棠、櫻桃、枇杷、黑莓、棗、柑橘、葡萄、栗、芙蓉、木槿、柳、榆、樸類、麻櫟、槠、苦楝、油茶、玉米、高粱、大麻等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、江蘇、湖北、陝西、河南、山東、山西、河北、華北、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

天 敵：*Scolia clypeata* Sickman 大斑土蜂(幼蟲)

1435. **Potosia** (s. str.) **famelica** Janson 多紋星花金龜 (ASZI, 1986, 1:545; Chao, 1982:219; Hun., 1992: 448; Ma, 1992:528)

Potosia famelica Janson, 1879:

寄 主：桃、蘋果、板栗、樸類、玉米、高粱、大麻等的花和嫩芽。

分 佈：湖南、海南、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、陝西、山西、河北、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、蘇聯。

1436. **Potosia formosana** Moser 臺灣白點花金龜 (Chang & Hung, 1986:117)

寄 主：柑橘類及其他果樹類(花、葉)。

分 佈：臺灣。

1437. **Potosia fusca** (Herbst) 紡桃花金龜 (ASZI, 1986, 1:545)

寄 主：桃、梨等果樹、林木的花。

分 佈：福建、浙江、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州；泰國、緬甸、孟加拉、印度。

1438. **Potosia (Liocola) lugubris orientalis** Medvedev 暗綠星花金龜 (ASZI, 1986, 1:544; Ma, 1992:528; Yunn., 1987:376)

寄 主：桃、栗、麻櫟、榆、玉米、高粱、大麻等多種植物的花。

分 佈：雲南、山東、山西、河北、西北、遼寧、吉林、黑龍江。

1439. **Potosia (Calopotosia) nitididorsis** Fairmaire 亮綠星花金龜 (Ma, 1992:528)

Potosia nitididorsis Fairmaire, 1898:

寄 主：桃、栗、樸、榆、玉米、高粱等植物的花。

分 佈：華南、西南、華中、華北、東北；蘇聯。

1440. **Protaetia (Calopotosia) aerata** (Erichson) 凸星花金龜 (Hun.,1992:447; Ma, 1997:784)

Protaetia aerata (Erichson, 1834:)

寄 主：桃、蘋果、栗、玉米、高粱、大麻、麻櫟、榆等。

分 佈：華南、湖南、華東、華中、華北、東北。

1441. **Protaetia (Liocola) brevitarsis** (Lewis) 白星花金龜 (Chen et Chang, 1990:363; Hun, 1992:446;

Wu, 2000(1):21; Zhao et al., 1997:188)
寄 主：蘋果、梨、桃、李、榛、杏、海棠、櫻桃、西印度櫻桃、葡萄、栗、榆、櫟類等。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、西藏、四川、湖南、湖北、河南、山西、河北、華東、西北、東北等地區。

1442. **Protaetia** (s. str.) **famelica** (Janson) 多紋星花金龜 (Ma, 1997:784)
Protaetia famelica (Janson, 1879:)
寄 主：桃、蘋果、板栗、櫟類、玉米等。
分 佈：華南、西南、華中、華北、東北區。

1443. **Protaetia fusca** (Herbst) 紡星花金龜 (ASZI, 1986, 1:545; Hun., 1992:448)
別 名：*紡桃花金龜*。
寄 主：桃、梨、麻櫟、女貞等的花和嫩枝等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇；泰國、緬甸、印度、孟加拉。

1444. **Protaetia (Calopotosia) nitididorsis** (Fairmaire) 亮綠星花金龜 (Hun., 1992:448; Ma, 1992:285; 1997:784)
Protaetia nitididorsis (Fairmaire, 1889:)
寄 主：桃、板栗、玉米、高粱、櫟類、榆等。
分 佈：湖南、貴州、西南、中南、華北、東北地區；蘇聯。

1445. **Protaetia orientalis** Govy et Percheron 白點花金龜 (Chang, 1982:288; 1987:41; 1988:425; Chen, 1981:43)
寄 主：葡萄、蓮霧、柑橘、可可椰子、果樹類。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、印度。

1446. **Rhomborhina** (s. str.) **fortunei** (Sauders) 橫紋羅花金龜 (Ma, 1992:285; 1995:249)
Rhomborhina (s. str.) *fortunei* (Sauders, 1852:)
寄 主：柑橘、櫟類(花)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇。

1447. **Rhomborrhina (Torynorrhina) fulvopilosa** Moser 黃毛羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:541; Hun., 1992:443; Ma, 1992:285)
寄 主：柑橘、梨、板栗、櫟類等植物的花。
分 佈：江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北。

1448. **Rhomborrhina heros** Gory et Percheron 黑緣羅花金龜 (Yunn., 1987:575)
寄 主：柑橘、櫟類、榆。
分 佈：雲南；越南、錫金。

1449. **Rhomborrhina** (s. str.) **japonica** Hope 日銅羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:541; Hun., 1992:443; Ma, 1992:285; 1992:527; 1997:783)
Rhomborrhina japonica Hope, 1841:
寄 主：柑橘、板栗、華山松、茶、櫟類、紅椿、玉米等植物的花。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北；

朝鮮、日本。

1450. **Rhomborrhina (s. str.) mellyi** (Cory et Percheron) 細紋羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:541; Hun., 1992:444; Ma, 1992:527)
Rhomborrhina mellyi (Cory et Percheron, 1833:)
寄 主：柑橘、梨樹、櫟類、榆樹等植物的花。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川；越南、寮國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。

1451. **Rhomborrhina (s.str.) mellyi diffusa** Fairmaire 紅足羅花金龜 (Hun., 1992:444)
寄 主：板栗、櫟類、油桐、瓜類。
分 佈：湖南、雲南、西藏、四川。

1452. **Rhomborrhina nigra** Saunders 黑羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:542; Chao, 1982:219)
寄 主：柑橘、麻櫟等植物的花。
分 佈：福建、浙江、江西、湖南。

1453. **Rhomborrhina olivacea** (Janson) 橄羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:542; Ma, 1992:285)
寄 主：柑橘、麻櫟等植物的花。
分 佈：福建、江西、湖南、貴州、四川、浙江、安徽。

1454. **Rhomborrhina parryi** Westwood 赤紋羅花金龜 (Ma, 1992:527)
Rhomborrhina parryi Westwood, 1841:
寄 主：松、櫟類、雜木等植物的花。
分 佈：雲南、西藏；印度。

1455. **Rhomborrhina unicolor** Motschulsky 綠羅花金龜 (ASZI, 1986, 1:542; Hu et al., 1996, 22(4):35)
寄 主：梨、黑莓、柑橘、麻櫟等植物的花和嫩心葉。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇；日本。

1456. **Taeniodera coomani** (Bourgoin) 群帶花金龜 (Hun., 1992:437; Ma, 1992:284)
寄 主：柑橘、巴茅、櫟類等植物的花。
分 佈：江西、湖南、海南、貴州、雲南。

1457. **Taeniodera malabaricensis** (Gory et Perch.) 莫帶花金龜 (Ma, 1992:284)
寄 主：柑橘、櫟類。
分 佈：福建、湖南、海南、貴州、雲南；越南、寮國、菲律賓。

1458. **Thaumastopeus pullus** Billberg 暗藍異花金龜 (ASZI, 1986, 1:547)
寄 主：柑橘、板栗、麻櫟、女貞等植物的花。
分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州；菲律賓、越南、柬埔寨、印尼、泰國。

1459. **Trigonophorus orthschildi varians** Bourgoin 蘋綠唇花金龜 (Hun., 1992:442; Ma, 1992:285)
寄 主：柑橘、櫟類(花)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州。

Trichiidae 斑金龜科

1460. **Anthracophora rusticola** Burm. 赤斑金龜 (Chen et Wang, 1987:159)
寄 主：桃、李、杏、梅等核果類。
分 佈：陝西。

1461. **Trichius dubernaardi** Pouillaude 十點綠斑金龜 (Ma, 1992:533)
Trichius dubernaardi Pouillaude, 1913:
寄 主：柑橘、櫟類、珍珠梅等植物的花。
分 佈：雲南、西藏、四川、陝西。

1462. **Trichius kuatuenensis** Tesar 紫黑斑金龜 (AS ZI, 1986, 1:549)
寄 主：柑橘、珍珠梅及傘形科植物的花。
分 佈：臺灣、福建、廣東。

1463. **Trichius succinctus** Pallas 斑金龜 (Luo et al., 1996:57)
寄 主：櫟果(花枝)。
分 佈：海南。

Valgidae 彎腿金龜科

1464. **Dasyvalgus laliganti** Fairmaire 黑毛黑腿金龜 (Yunn., 1987:583)
寄 主：柑橘、櫟類、女貞等。
分 佈：海南、雲南；越南。

1465. **Dasyvalgus subglaber** Paulian 白毛彎腿金龜 (Yunn., 1987:582)
寄 主：柑橘、櫟類等。
分 佈：雲南；越南。

1466. **Hybovalgus bioculatus** Kolbe 斑駝彎腿金龜 (Ma, 1992:534; Yunn., 1987:582)
Hybovalgus bioculatus Kolbe, 1904:
寄 主：柑橘、白蠟樹、女貞等植物的花。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇；越南。

1467. **Hybovalgus sexdentatus** Arrow 齒駝彎腿金龜 (Yunn., 1987:581)
寄 主：柑橘、櫟類、女貞等。
分 佈：雲南；寮國、印度。

1468. **Oreoderus momeitensis** Arrow 黑山彎腿金龜 (Yunn., 1987:581)
寄 主：松樹、櫟類等植物。
分 佈：雲南；緬甸。

Cerambycidae 天牛科

Prioninae 鋸天牛亞科

1469. **Bandar pascoei** (Lansberge) 本天牛 (Hua, 1992:467)
=*Macrotoma fisheri* Waterhouse, 1884:382.
別 名：*密綴鋸天牛*。
寄 主：栗、柿、沙梨、蘋果、杏、桃、雲南松、栓皮櫟、黃連木。
分 佈：湖南、南海、雲南、西藏、四川；越南、寮國、緬甸、中亞(?)。

1470. **Bandar pascoei gressitti** Quentin et Villiers 瘦角密齒天牛 (Yunn., 1987:641)
寄 主：梨、沙梨、蘋果、杏、桃、柿、雲南松、櫟類、黃連木。
分 佈：雲南。

1471. **Dorysthenes buqueti** Gurin 竹土天牛 (Hua, 1992:1; Yunn., 1987:641)
Lophosternus buqueti Gurin, 1844:209. (Java)
Dorystenes (Lophosternus) buqueti. Lameere, 1911:331.
寄 主：竹根部、板栗、櫟。
分 佈：雲南；寮國、馬來西亞、爪哇、緬甸、印度北部。

1472. **Dorysthenes granulouse** (Thomson) 蔗根土天牛 (Qian, 1985, 2(3/4):223-225; Zeng, 1981:18-20)
寄 主：椰子、檳榔、油棕、柑橘、橡膠植物根部。
分 佈：海南、華南。

1473. **Dorysthenes hugeli** Redtenbacher 蘋根土天牛 (Hua, 1982:1; Yunn., 1987:641)
Dorysthenes hugeli Redtenbacher 1848:
寄 主：蘋果、雪松、聖櫟、烏桕、印度黃檀、杜鵑花、婆羅雙樹。
分 佈：雲南；印度、巴基斯坦。

1474. **Dorysthenes hydropicus** (Pascoe) 甘蔗鋸天牛 (Chang, 1987:41; Qian, 1985, 2(3/4):223-225)
別 名：*曲牙鋸天牛*。
寄 主：葡萄、棗、林木、果樹、甘蔗的地下器官和組織。
分 佈：臺灣、福建、廣東、湖北、河南、河北。

1475. **Dorysthenes paratoxus** (Faldermann) 大牙土天牛 (Qian, 1985, 2(3/4):223-225)
寄 主：
分 佈：

1476. **Dorysthenes sternalis** (Fairmaire) 鈎突土天牛 (Gressitt, 1951:23; Hua, 1982:2; Yunn., 1987:640)
Cyrtognathus sternalis Fairmaire, 1902:244.
Dorysthenes (Baladeva) sternalis, Lameere, 1911:344.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南、四川；越南。

1477. **Dorysthenes (Baladeva) walkeri** (Waterhouse) 長牙土天牛 (Chien, 1982:31-34; Gressitt, 1951:23; Qian, 1982, 25(1):31-34; Qian, 1985, 2(3/4):223-225)
Dorysthenes walkeri Waterhouse, 1840:226. (Burma)
Dorysthenes (Baladeva) walkeri, Lameere, 1911:343.81,18(1):18-20)
寄 主：椰子、檳榔、油棕、柑橘、橡膠植物根部。

分 佈：海南、華南。

1478. **Eurypoda antennata** Saunders 家扁天牛 (Gressitt, 1951:12; Hua., 1992:468)
Eurypodaa antennata Saunders, 1853:110. (China)
Eurypoda davidis Fairmaire, 1886:355.
寄 主：松、杉、楓香、樟、樺、麻櫟、乾燥木材、房屋建築、家具。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、香港、貴州、浙江、江蘇。

1479. **Mantitheus pekinensis** Fairmaire 芫天牛 (ASZI, 1986, 1:553; Gressitt, 1951:31; Hua, 1982:3)
Philus antennatus, Heyden, 1886:287. (*nec* Gyll.)
Mantitheus pekinensis Fairmaire, 1889:90.
Paraphilus duplex Gahan, 1893:255.
寄 主：白皮松、刺槐。
分 佈：廣西、湖南、山西、河北、內蒙古。

1480. **Megopis (Baralipton) maculosa** (Thomson) 褐斑薄翅天牛 (Hua, 1982:3)
Baralipton maculosum Thomson, 1857:342. (N. India)
Megopis (Baralipton) maculosa, Lameere, 1909:161.
寄 主：桑。
分 佈：雲南；寮國、印度。

1481. **Megopis severini** Lameere 褐斑薄翅天牛 (Yunn., 1987:642)
寄 主：桑。
分 佈：雲南；寮國、印度。

1482. **Megopis (Aegosoma) sinica sinica** (White) 中華薄翅天牛 (Chao, 1982:137; Chang & Hung, 1986:124; Gressitt, 1951:16; Hua, 1982:3; Hun., 1992:468; Li et al., 1981:93; Yunn., 1987: 643; Xiao, 1992:481; Zhang, 1987[ed.] 2:29)
Aegosoma sinicum White, 1853:30. (Shanghai)
=*Aegosoma amplicolli* Motschulsky, 1853:48. (Pekang)
Megopis sinica, Okamoto, 1927:77.
=*Megopis sinica cornicula* Yoshida, 1931:273. (Taiwan)
Megopis (Aegosoma) sinica sinica, Gressitt, 1951:16.
別 名：*薄翅鋸天牛*、*中華鋸天牛*、*油桐鋸天牛*、*大棕天牛*。
寄 主：核桃、蘋果、柿、棗、栗、松、桑、馬尾松、思茅松、杉、苦楝、泡桐、油桐、梧桐、橡膠、楓、枸樹、梧桐、櫟、楊、柳、榆、白蠟、雲杉、冷杉等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、江蘇、上海、山東、河南、陝西、甘肅、山西、河北、北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、琉球、越南、寮國、緬甸。

1483. **Megopis sinica ornaticollis** (White) 顯脊薄翅天牛 (Chang & Hung, 1986:124; Gressitt, 1951:17; Hua, 1982:3; Yunn., 1987:642)
Aegosoma ornaticolle White, 1853:30. (E. India)
Megopis (Aegosome) sinica oraticollis, Lameere, 1909:138.
別 名：*臺灣薄翅天牛*。
寄 主：桑、思茅松、柳、枸樹。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、西藏、四川、貴州、湖北、陝西；越

南、寮國、緬甸、印度北部。

1484. **Megopis sinica sinica** (White) 華夏薄翅牛 (Chang, 1963:214)

Aegosoma sinicum White, 1853:
Aegosoma amplicollis Motschulsky, 1853:
Megopis (*Aegosoma*) *sinica* Lameere, 1909:
Megopis (*Aegosoma*) *sinica cornicula* Yoshida, 1931:
寄 主：柑橘、蘋果、梨、桑、松、冷杉、楊、柳、白臘樹、野桐、槐。
分 佈：臺灣。

1485. **Megopis tibialis** White 松薄翅天牛 (Hua, 1982:4)

Megopis tibialis White, 1853:
寄 主：松、高山櫟。
分 佈：西藏；印度。

1486. **Philus antennatus** (Gyllenhal) 橘狹胸天牛 (Chao, 1982:137; Gressitt, 1951:30; Hua, 1982:4; Hun., 1992:469; Li et al., 1981:93; Xiao, 1992:493)

Stenochorus antennatus Gyllenhal, 1817:180. (E. China)
=*Stenochorus stuposus* Gyllenhal, 1817:180, ♀.
=*Philus inconspicuus* Saunders, 1853:110
Philus antennatus, Lacordaire, 1869:160.
別 名：*狹胸橘天牛*，*狹翅橘天牛*。
寄 主：柑橘類、桑、茶、濕地松根部。
分 佈：臺灣、福建、江西、海南、廣東、香港、廣西、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、陝西、河北；印度。

1487. **Philus pallescens** Bates 甘蔗天牛 (Chang & Hung, 1986:127; Gressitt, 1951:30)

Philus pallescens Bates, 1866:350. (Taiwan)
Philus cantonensis Pic, 1930:14.
寄 主：柑橘類、甘蔗。
分 佈：臺灣、海南、華南；寮國。

1488. **Prionus insularis** Motschulsky 鋸天牛 (ASZI, 1986, 1:553; Chang, 1963:215; Chang & Hung, 1986:128; Gressitt, 1951:26; Hua, 1982:4; Hun., 1992: 469; Zhang, 1987[ed.] 2:29)

Prionus insularis Motschulsky, 1857:36.
=*Prionus tetanicus* Pascoe, 1867:412.
=*Prionus insularis* var. *inchikii* Nish.,
別 名：*尹速拉利鋸天牛*。
寄 主：蘋果，臺灣蘋果、松、日本赤松、柳杉、雲杉、冷杉、榆、柳、槐、扁柏、山毛櫸、水青岡、榆。
分 佈：臺灣、江西、湖南、四川、浙江、陝西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、東西伯利亞。

1489. **Priotyrranus closteroides** (Thomson) 橘根接眼天牛 (Chang & Hung, 1986:128; Chao, 1982:137; Gressitt, 1951:18; Hua, 1982:5; Hun., 1992:469; Li et al., 1981:93; Yunn., 1987:639; Zhang, 1987[ed.] 2:29)

Chollides closteroides Thomson, 1877:264.
=*Cnethocerus messi* Bates, 1878:273.
=*Prionacus strigicornis* Fairmaire, 1897:127.
Priotyrranus (*Chollides*) *closteroides*, Lameere, 1910:274.
=*Priotyrranus closteroides* ab. *testaceus* Kano, 1933:130.

別 名：*橘根窟天牛*，*柑橘窟天牛*。
寄 主：柑橘類之根部、板栗。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、廣東、香港、廣西、雲南、貴州、江蘇、陝西；越南、印度。

Aseminae 幽天牛亞科

1490. **Arhopalus (Megasemum) quadricostulatus** Kraatz 隆紋梗天牛 (Chang & Hung, 1986:118; Gressitt, 1951:37; Hua, 1982:6; Li et al., 1981:94; Yunn., 1987:644; Zhang, 1987[ed.] 2:39)
Megasemum quadricostulatum Kraatz, 1879:98.
=*Megasemum sharpi* Reitter, 1913:43.
=*Megasemum projectum* Okamoto, 1927:63.
別 名：*隆紋幽天牛*、*栗色凹胸天牛*、*隆紋幽天牛*。
寄 主：華山松、松、冷杉屬、雲杉屬。
分 佈：臺灣、福建、江西、雲南、陝西、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東部

1491. **Arhopalus (s. str.) rusticus** (Linnaeus) 褐梗天牛 (Gressitt, 1951:35; Hua, 1982:6; Li et al., 1981:94; Zhang, 1987[ed.] 2:39)
Cerambyx rusticus Linnaeus, 1758:395.
Arhopalus rusticus, Serville, 1834:78.
別 名：*褐幽天牛*。
寄 主：華山松、白皮松、日本赤松、油松、日本扁柏、檜、冷杉、柏屬、側柏、櫟、多瓜樹。
分 佈：江西、雲南、陝西、內蒙古、遼寧；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、蒙古、歐洲。

1492. **Arhopalus (s. str.) tibetanus** (Sharp) 西藏梗天牛 (Gressitt, 1951:35; Hua, 1982:6)
Criocephalus tibetanus Sharp, 1905:159.
Arhopalus (s. str.) *tibetanus* Gressitt, 1951:35.
寄 主：雪松、雪松。
分 佈：西藏；尼泊爾、印度。

1493. **Arhopalus (s. str.) tristis** (Fabricius) 暗梗天牛 (Gressitt, 1951:35; Hua, 1982:6)
Callidium tristis Fabricius, 1787:154.
Criocephalus ferus Mulsant, 1839:64.
寄 主：胡桃屬、樟子松、雲杉屬。
分 佈：東北；西伯利亞、外高加索、敘利亞、歐洲、北非。

1494. **Arhopalus (Cephallus) unicolor** (Gahan) 赤梗天牛 (Chao, 1982:137; Hua, 1982:6; Zhao et al., 1997:188)
Criocephalus unicolor Gahan, 1906:97. (Assam, Japan)
=*Criocephalus* (Cepphalallus) *oberthuri* ssp. *unicolor*, Mitono, 1940:79.
Arhopalus (*Cephalallus*) *unicolor*, Gressitt, 1951:37.
別 名：*赤短梗天牛*。
寄 主：櫟、鳥松。
分 佈：雲南、廣東沿海、福建、浙江、江蘇；朝鮮、日本、蘇聯、緬甸、印度(阿薩姆)。

1495. **Asemum amurense** Kraatz 松幽天牛 (ASZI, 1986, 1:554; Gressitt, 1951:38; Hua, 1982:6)
Asemum amurense Kraatz, 1879:97.
Asemum punctulatum var. *amurense*, Plavilst, 1927:192.
Asemum amurense abb. *limbatum*, *similis*, *tomentosum* Plavilst, 1940:24, 619.
寄 主：紅松、華山松、油松、魚鱗松、日本赤松、雲杉。
分 佈：浙江、山東、陝西、河北、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1496. **Asemum punctulatum** Blessig 坦背幽天牛 (Gressitt, 1951:39; Hua, 1982:6)
Asemum punctulatum Blessig, 1872:182.
寄 主：松、紅松、冷杉、雲杉。
分 佈：新疆、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東部。

1497. **Asemum striatum** (Linnaeus) 脊鞘幽天牛 (Gressitt, 1951:39; Hua, 1982:6)
Cerambyx striatus Linnaeus, 1758:396.
Asemum striatum, Mulsant, 1839:62.
Asemum subsulcatum Motschulsky, 1860:152.
Asemum striatum ab. *agreste* Matsushita, 1933:235.
Asemum striatum ssp. *japonicum* Matsushita, 1933:235.
寄 主：松、冷杉。
分 佈：新疆、內蒙古東部、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1498. **Proatimia pinivora** Gressitt 原幽天牛 (Gressitt, 1951:42; Hua, 1982:6)
Proatimia pinivora Gressitt, 1951:42.
寄 主：雲南松。
分 佈：雲南。

1499. **Spondylis buprestoides** (Linnaeus) 椎天牛 (ASZI, 1986, 1:554; Chao, 1982:137; Chang & Hung, 1986:130; Gressitt, 1951:32; Hua, 1982:6; Hua., 1992:470; Li et al., 1981:94; Zhao et al., 1997:188)
Attelabus buprestoides Linnaeus, 1758:388.
Spondylis buprestoides Fabricius, 1775:159.
=*Spondylis sinensis* Northied, 1892:92.
別 名：*短角幽天牛*、*擬玉蟲斯脊天牛*。
寄 主：椿、華山松、馬尾松、日本赤松、油松、日本扁柏、冷杉、柳杉、雲杉。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、浙江、安徽、江蘇、陝西、河北、北京、內蒙古、黑龍江；朝鮮、庫頁島、西伯利亞、日本、琉球、小亞細亞、外高加索、歐洲。

1500. **Tetropium castaneum** (Linnaeus) 光胸斷眼天牛 (ASZI, 1986, 1:554; Gressitt, 1951:40; Hua, 1982: 7; Xiao, 1992: 504)
Cerambyx castaneus Linnaeus, 1758:396.
=*Cerambyx luridus* Linnaeus, 1767:634.
=*Callidium aulicum* Fabricius, 1775:190.
Tetropium castaneum, Jacobson, 1910:pl. 66, f. 3.
=*Tetropium luridum* var. *atricone* Pic, 1931:258.
別 名：*光胸幽天牛*。
寄 主：紅松、落葉松、雲杉屬、冷杉屬。
分 佈：江西(武夷山)、雲南、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、

黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1501. **Tetropium gracilicornis** Reitter 雲杉黑眼天牛 (Gressitt, 1951:40; Hua, 1982:7)

=*Tetropium luridum*, Bates, 1884:208.
Tetropium gracilicorne Reitter, 1899:287.
=*Tetropium gracilicorne* abb. *altaiensis*, *rubripes* Pic, 1902:1, 9.
=*Tetropium castaneum* Okamoto, 1927:65. (*nec* Linnaeus)
=*Tetropium gracilicorne* ab. *subaulicum* Plavilst, 1927:105.
=*Tetropium castaneum*, et abb. *aulicum*, *flucuratum*, *luridum*, Matsushita, 1933:235. (*nec* Fabricius, Linnaeus)
=*Tetropium gracilicorne* ab. *manchuricum* Ohbayashi, 1939:115.
寄 主：松、雲杉、冷杉。
分 佈：內蒙古、東北；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東部。

1502. **Tetropium orienum** Gahan 溝胸黑眼天牛 (Gressitt, 1951:41; Hua,1982:7)

Tetropium orcinum Gahan, 1906:95.
=*Trinophyllum cribratum*, Stebbing, 1914:340.
寄 主：雪松、喬松、雲杉。
分 佈：西藏、四川；印度、克什米爾西部。

Disteniinae 瘦天牛亞科

1503. **Distenia gracilis** (Blessig) 瘦天牛 (ASZI, 1986, 1:534; Gressitt, 1951:45; Hua, 1982:7)

Apheles gracilis Blessig, 1872:168.
=*Distenia japonica* Bates, 1873:155.
Distenia gracilis, Kraatz, 1879:91.
別 名：*長角瘦天牛*。
寄 主：松屬、魚鱗松、椴、雲杉、冷杉。
分 佈：浙江、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、俄羅斯濱海地區。

1504. **Melegena fulva** Pu 褐鋸腿瘦天牛 (Pu, 1990:234)

Melegena fulva Pu, 1990:234.
寄 主：橄欖樹。
分 佈：福建(福州)。

Lepturinae 花天牛亞科

1505. **Acmaeops (Dinoptera) collaris** (Linnaeus) 紅胸眼花天牛 (Gressitt, 1951:69; Hua, 1982: 8)

Leptura collaris Linnaeus, 1758:398.
=*Leptura ruficollis* De Geer, 1775:143.
=*Leptura silvestris* Geoffroy, 1785:88.
=*Leptura carneola* Schrank, 1798:698.
Acmaeops (Dinoptera) collaris, Mulsant, 1863:495.
寄 主：栗屬、櫟屬。
分 佈：甘肅北部、內蒙古；小亞細亞、中亞、歐洲。

1506. **Acmaeops** (s. str.) **septentrionis** (Thomson) 紅緣眼花天牛 (Gressitt, 1951:69; Hua, 1982:8)

Pachyta septentrionis Thomson, 1866:61.
Acmaeops septentrionis, Tamanuki, 1933:72.
寄 主：華山松、魚鱗雲杉。

分 佈：陝西、內蒙古北部、東北北部；庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1507. **Anastrangalia dissimilis** (Fairmaire) 褐鞘緣花天牛 (Chao, 1982:138; Gressitt, 1951: 87; Hua., 1992:470)
Leptura dissimilis Fairmaire, 1900:639. (Fukien)
Anoplodera (s. str.) *dissimilis dissimilis*, Gressitt, 1951:87.
寄 主：松樹。
分 佈：臺灣、福建、湖南、四川、華東地區；日本(琉球)。

1508. **Anoplodera rubra dichroa** (Blanchard) 赤楊褐天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:29)
寄 主：赤楊、松。
分 佈：江西。

1509. **Anoplodera scotodes** (Bates) 黑色阿花天牛 (Chang & Hung, 1986:118; Gressitt, 1951:89)
Leptura scotodes Bates, 1873:194.
=*Leptura* (s. str.) *kongoensis* Matsuhita, 1933:201.
寄 主：松類。
分 佈：臺灣；朝鮮、日本、千葉島、庫頁島。

1510. **Anoplodera variicornis** (Dalman) 斑角緣花天牛 (ASZI, 1986, 1:556; Gressitt, 1951:89; Hua, 1982:10)
Leptura variicornis Dalman, 1817:482.
=*Leptura variicornis* ab. *nigromarginata* Tamanuki, 1933:75.
Anoplodera variicornis, Gressitt, 1947:192.
別 名：*斑角花天牛*。
寄 主：松、冷杉、雲杉、忍冬。
分 佈：陝西、河北、內蒙古、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、千島群島、庫頁島、西伯利亞、北歐。

1511. **Aredolpona rubra dichroa** (Blanchard) 赤楊亞花天牛 (ASZI, 1986, 1:555; Gressitt, 1951: 88; Hua, 1982:11; Li et al., 1981:94; Wang & Chiang, 1988:145)
Leptura dichroa Blanchard 1871:812.
=*Leptura succedanea* Lewis, 1879:464.
=*Leptura rubra* var. *muliebris* Heyden, 1886:276.
=*Anoplodera rubra succedanea*, Gressitt, 1947:192.
Anoplodera rubra dichroa, Gressitt, 1951:88.
別 名：*赤楊褐花天牛*，*赤楊緣花天牛*。
寄 主：柿、華山松、紅松、赤松、松、油松、柏、櫟、柳、赤楊、山楊。
分 佈：福建、四川、貴州、湖南、江西、浙江、陝西、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東南部。

1512. **Anoplodera sequensi** (Reitter) 黑緣花天牛 (Li et al., 1981:94)
寄 主：松、樅。
分 佈：福建。

1513. **Gaurotes (Paragaurotes) ussuriensis** Blessig 凹緣金花天牛 (Gressitt, 1951:65; Hua, 1982:13)
Gaurotes (?) (*Acmaeops*) *ussuriensis* Blessig, 1873:247.
=*Acmaeops* (*Gaurotes* ?) *ussuriensis donacioides* Kraatz, 1879:85.
Gaurotes ussuriensis, Auriv., 1912:194.

Gaurotes (*Paragaurotes*) *ussuriensis*, Plav., 1921:116.
寄 主：胡桃楸。
分 佈：河北、天津、吉林、黑龍江；朝鮮、庫頁島、西伯利亞。

1514. **Leptura aethiops** Poda 南方花天牛 (Zhang, 1987[ed.] 2:30)
寄 主：松、杉。
分 佈：江西。

1515. **Leptura** (s. str.) **arciata** Panzer 曲紋花天牛 (ASZI, 1986, 1:556; Hua, 1982:13)
Leptura (s. str.) *arciata* Panzer, 1793:
寄 主：紅松、華山松、雪松、油松、松、雲杉、冷杉。
分 佈：陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1516. **Leptura** (s. str.) **auratopilosa** (Matsuhita) 金絨花天牛 (Chang & Hung, 1986:123, 130; Hua, 1982:14; Hua., 1992:471)
Strangalia auratopilosa Matsuhita, 1931:42. (Taiwan: Taihonroku)
=*Strangalia* (s. str.) *tattkana* Kano, 1933:266.
=*Strangalia tattakana* spp. *piyanan* Kano, 1933:267. (Taiwan: Piyanan)
=*Strangalia* (s. str.) *horishana* Matsushita, 1933:214.
=*Strangalia quadranglithoracica* Tamanuki, 1942:145. (Taiwan: Arisan)
=*Strangalia* (s. str.) *auatopilosa f. segregata* Tamanuki, 1942:146.
Leptura auratopilosa, Gressitt, 1947:192.
別 名：*金毛四條花天牛*。
寄 主：青松、赤松、馬尾松。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、四川、貴州；琉球群島。

1517. **Leptura** (s. str.) **meridiosinica** Gressitt 南方花天牛 (Chao, 1982:138; Gressitt, 1951: 99; Hua, 1982:14)
Leptura (s. str.) *meridiosinica* Gressitt, 1951:99.
寄 主：松、杉等。
分 佈：福建、江西、廣東、貴州。

1518. **Leptura** (s. str.) **ochraceofasciata** (Motschulsky) 黃紋花天牛 (Gressitt, 1951:101; Hua, 1982:14)
Stenura ochraceofasciata Motschulsky, 1861:21.
Leptura ochraceofasciata, Bates, 1873:196.
寄 主：松屬、魚鱗松、冷杉。
分 佈：福建、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島。

1519. **Leptura** (s. str.) **quadrifasciata** Linnaeus 四紋花天牛 (Gressitt, 1951:101; Hua, 1982: 15)
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758:398.
寄 主：赤松、柳、赤楊。
分 佈：華北、東北；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1520. **Leptura** (**Macroleptura**) **quadrizona** (Fairmaire) 四帶花天牛 (Yunn., 1987:646)
Strangalia quadrizona Fairmaire, 1902:244. (Yunnan)
=*Strangalia quadrizone* ab. *zaitzevi* Plavilst, 1931:39.
Leptura (s. str.) *quadrizona*, Gressitt, 1951:101.
寄 主：油杉。

分 佈：雲南；察國。

1521. **Leptura spinipennis** (Fairmaire) 刺尾花天牛 (Gressitt, 1951:96; Hua, 1982:15)
Acanthoptura spinipennis Fairmaire, 1894:224.
Leptura (*Acanthoptura*) *spinipennis*, Gressitt, 1951:96.
寄 主：華山松。
分 佈：西藏、四川、陝西。

1522. **Nanostrangalia chujoi** (Mitono) 小花天牛 (Hua, 1982:15)
Nanostrangalia chujoi Mitono, 1938:20. (Taiwan: Mt. Senjo)
=*Strangalia chujoi* ab. *dokuritsuensis* Seki, 1938:630.
=*Strangalia chujoi* ab. *yamoi* Matsushita et Tamanuki, 1940:7. (nec Tamanuki, 1939)
寄 主：松、雲杉、櫟。
分 佈：臺灣、福建；日本。

1523. **Nivellia** (s. str.) **sanguinosa** (Gyllenhal) 紅翅裸花天牛 (Gressitt, 1951:80; Hua, 1982:16)
Leptura sanguinosa Gyllenhal, 1827:21.
=*Leptura extensa* Gebler, 1841:613.
=*Leptura kratteri* Hampe, 1852:67.
=*Leptura sacheri* Wolfner, 1852:93.
=*Leptura rubripennis* Matsumura, 1911:139.
Nivellia sanguinosa, Plavilst, 1936:551.
寄 主：松、櫟、冷杉。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1524. **Pachyta bicuneata** Motschulsky 雙斑厚花天牛 (ASZI, 1986, 1:555; Gressitt, 1951:59; Hua, 1982:16)
Pachyta bicuneata Motschulsky, 1860:147.
=*Pachyta bicuneata* ab. *bisbimaculata* Pic, 1900:17.
別 名：*雙斑松天牛*。
寄 主：松、紅松、雪松、油松。
分 佈：陝西、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞。

1525. **Pachyta lamed** (Linnaeus) 松厚花天牛 (Gressitt, 1951:59; Hua, 1982:16)
Leptura lamed Linnaeus, 1758:291.
=*Leptura spadicea* Paykull, 1800:103.
Pachyta lamed, Zetterstedt, 1828:376.
寄 主：華山松、馬尾松、油松。
分 佈：吉林；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、阿拉斯加、歐洲。

1526. **Pachyta mediofasciata** Pic 黃帶厚花天牛 (ASZI, 1986, 1:555; Gressitt, 1951:60; Hua, 1982:16)
Pachyta mediofasciata Pic, 1936:15.
=*Pachyta mediofasciata* var. *subapicalis*, *nigromarginalis* Pic, 1939:1.
寄 主：華山松、油松。
分 佈：陝西、河北。

1527. **Pachyta quadrimaculata** (Linnaeus) 四斑厚花天牛 (Gressitt, 1951:60; Hua, 1982:17)
Leptura 4-maculata Linnaeus, 1755:397.

Pachyta quadrimaculata Zetterstedt,1828:376.
寄 主：松、紅松、華山松。
分 佈：陝西、華北、黑龍江；西伯利亞、蒙古北部、歐洲。

1528. **Sachalinobia koltzei** (Heyden) 冷杉網花天牛 (Gressitt, 1951:55; Hua, 1982:18)
Brachyta koltzei Heyden, 1887:304.
=*Sachalinobia retata* Jacobson, 1899:40.
Sachalinobia koltzei, Jacobson, 1902:363.
寄 主：赤松。
分 佈：東北；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞東部。

1529. **Stenocorus** (s. str.) **inquisitor japonicus** (Bates) 松脊花天牛 (Chang & Hung, 1986:130; Gressitt, 1951:54; Hua, 1982:19; Zhang, 1987[ed.]2:30)
Rhagium inquisitor var. *japonicum* Bates, 1884:209.
=*Rhagium rugipennis* Reitt., 1898:357.
=*Rhagium rugipennis sibiricum* Pic, 1905:5.
=*Rhagium mordax*, Okamoto, 1927:68. (*nec* De Geer)
=*Rhagium* (*Hargium*) *inquisitor* ssp. *rugipenne*, Plavilst, 1930:55.
Stenocorus (s. str.) *inquisitor japonicus*, Gressitt, 1951:54.
別 名：*松皮天牛*。
寄 主：松、紅松、華山松、雪松、油松、日本赤松、魚鱗松、雲杉、冷杉。
分 佈：江西、陝西、東北；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞。

1530. **Stenocorus inquisitor morrisonense** (Kano) 新高灰天牛 (Chang & Hung, 1986:130; Gressitt, 1951:55)
Rhagium inquisitor ssp. *morrisonensis* Kano, 1933:262.
Stenocorus (s. str.) *inquisitor morrisonensis*, Gressitt, 1951:55.
寄 主：松類。
分 佈：臺灣。

1531. **Strangalia** (s. str.) **attenuata** (Linnaeus) 樸瘦花天牛 (Gressitt, 1951:114; Hua, 1982:19)
Leptura attenuata Linnaeus, 1758:398.
Strangalia attenuata, Okamoto, 1927:72.
寄 主：栗、樸。
分 佈：東北；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、伊朗、土耳其、歐洲。

1532. **Strangalia linsleyi** Gressitt 松瘦花天牛 (Zhang, 1987[ed.]2:30)
寄 主：松。
分 佈：江西。

1533. **Toxotus** (s. str.) **meridinus** (Linnaeus) 大突花天牛 (Gressitt, 1951:58; Hua, 1982:22)
Leptura meridiana Linnaeus, 1758:398.
Toxotus meridianus, Redtenbacher, 1849:504.
寄 主：歐洲酸櫻桃、雲南歐李、山楊、柳、栲。
分 佈：陝西、甘肅；西伯利亞、歐洲。

Cerambycinae 天牛亞科

1534. **Aeolesthes** (s. str.) **holosericea** (Fabricius) 皺胸閃光天牛 (Gressitt, 1951:137; Hua,

1982:23; Li et al., 1981:95)
Cerambyx holosericea Fabricius, 1787:135. (Inida)
=*Pachydissus velutinus* Thomson, 1865:576.
=*Pachydissus similis* Gahan, 1890:52.
Aeolesthes holosericea, Gahan, 1906:127.
別 名：*酸胸天牛*。
寄 主：檬果、柑橘、李、梨、番石榴、松、桑、金合歡、檀木、羊蹄甲、木棉樹、土密樹、紫薇、香椿、桉樹、土沉香、梅、扁擔杆、野桐、紫薇、蜜榴木、肉豆冠、白柳安、紫檀、烏桕、婆羅雙樹、櫻柳、柚木、櫻仁樹等。
分 佈：福建、廣東、海南、雲南、四川；寮國、馬來西亞、印尼、安達曼-尼科巴群島、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

1535. **Aeolesthes induta** (Newman) 棟閃光天牛 (Chao, 1982:140; Chang & Hung, 1986:118; Gressitt, 1951:137; Hua, 1982:23; Li et al., 1981:95; Luo et al., 1996:57)
Hammaticherus induta Newman, 1842:245. (Philippines)
=*Aeolesthes holosericea* Matsumura, (nec Fabricius)
Aeolesthes indula, Gahan, 1890:253.
別 名：*楝樹天牛*，*茶天牛*，*灰綾絨天牛*。
寄 主：松屬、柑橘、檬果、蒲桃、茶、人面子、楝樹、鳳凰木、油茶、烏桕、臺灣赤楊、垂柳。
分 佈：臺灣(蘭嶼、琉球)、福建、江西、廣東、海南、雲南、四川；菲律賓、婆羅洲、越南、寮國、爪哇、蘇門答臘、泰國、緬甸、斯里蘭卡。

1536. **Aeolesthes** (s. str.) **oenochrous** (Fairmaire) 櫻紅腫角天牛 (Chang & Hung, 1986:123; Hua, 1982: 43; Hun., 1992:482; Yunn., 1987:649)
Hemadius oenochrous Fairmaire, 1889:57. (China)
=*Neocerambyx stoetzneri* Heller, 1923:72. (China)
=*Neocerambyx mushaensis* Kano, 1928:224. (Taiwan: Musha)
別 名：*櫻紅天牛*，*血涙天牛*，*深山紅絨天牛*。
寄 主：桃、李、福建山櫻桃、霧社櫻花。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、雲南、西藏、四川、安徽、湖北；寮國。

1537. **Aeolesthes** (s. str.) **sinensis** Gahan 中華閃光天牛 (Chao, 1982:140; Chang & Hung, 1986:118; Gressitt, 1951:138; Hua, 1982:23; Hun., 1992:474; Li et al., 1981:95; Yunn., 1987:648)
Aeolesthes (s. str.) *sinensis* Gahan, 1890, 252, 255. (S. China)
=*Aeolesthes holosericea*, Gressitt, 1940:4. (nec Fabricius)
別 名：*閃光天牛*，*華夏綾絨天牛*。
寄 主：柑橘、柿、君遷子(軟棗)、香椿、櫟、油茶。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、香港、海南、廣西、雲南、四川、陝西；寮國、緬甸、印度。

1538. **Allotraeus (Nysina) grahami** Gressitt 紅足纓天牛 (Gressitt, 1951:152; Hua, 1982:23; Hun., 1992:474; Zhang, 1987[ed.]:230)
Allotraeus (*Nysina*) *grahami* Gressitt, 1937:68.
寄 主：桑、柳。
分 佈：江西、湖南、西藏、四川。

1539. **Anubis inermis** (White) 黃帶燦天牛 (Gressitt, 1951:211; Hua,1982:25)
Polyonua inwemia Whirw, 1853:171. (E. India)
Anubis inermis, Gahan, 1906:220.
寄 主：番櫻桃屬(巴基斯坦)。
分 佈：華南；寮國、馬來亞、泰國、緬甸、印度東北部、錫金、巴基斯坦西部。

1540. **Aphrodisium faldermanni** (Saunders) 黃頸柄天牛 (Hua, 1982:25; Hun., 1992:475)
Callichroma faldermannii Saunders, 1850:111. (N. China)
=*Arcmia faldermanni insularis* Gressitt, 1936:90. (Taiwan: Bukai, Hori, Hassenzan, Hinokiyama)
=*Aphrodisium yugoi*, Hirayama, 1940:126. (*nec* Kano) (Musha)
別 名：*桃黃頸天牛*。
寄 主：桃、李。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、浙江、江蘇、華北、內蒙古；東西伯利亞。

1541. **Aphrodisium gibbicolle** (Withe) 皺綠柄天牛 (Hua, 1982:25; Hun., 1992:475)
Callichroma gibbicolle White, 1853:160.
別 名：*皺綠橘天牛*。
寄 主：柑橘、板栗、山核桃、華山松、櫟、青杠、茴香、小油桐。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、安徽、江蘇、華北；寮國、印度(阿薩姆)。

1542. **Aphrodisium sauteri** Matsushita 紹德柄天牛 (Liu et al., 1993(2):16)
別 名：*臺灣柄天牛*。
寄 主：板栗。
分 佈：臺灣、山東。

1543. **Aromia** (s. str.) **bungii** (Faldermann) 桃紅頸天牛 (Chao, 1982:140; Chen et Wang, 1987:156-157; Di, 1993(1):34-35; Chen et al., 1987, 5(1,2):36-37; Gressitt, 1951:200; Hua, 1982:26; Huang, 1990[ed.] 2:185-187; Huang, 1978:121; Hun., 1992:476; Li, 1995:27; Li et al., 1981:95; Lin, 1997(4):40-41; NZWDI, 1981:1763; Qing, 1987:221-222; Wang, 1987[ed.]:274-275; Wu, 1978:121; Xue et al., 2000(2):24; Zhang, 1987[ed.] 2:30; Zhao et al., 1997:188)
Cerambyx bungii Falermann, 1835:433.
=*Callichroma cyanicornis* Guerin, 1844:222.
=*Aromia cyanicornis* var. *ruficollis* Redtenbacher, 1869:149.
Aromia bungii, Lacordaire, 1869:15.
=*Aromia* (s. str.) *cyanicornis* ab. *puncticollis* Plavilst, 1940:204, 670.
寄 主：桃、蘋果、梨、杏、櫻桃、李、郁李、榛、梅、柿、楊梅、蕙櫻、清水櫻、柳等。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、甘肅、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、蘇聯。

1544. **Aromia faldermannii** Saunders 桃黃頸天牛 (Li et al., 1981:95; Zhang, 1987[ed.] 2:30)
寄 主：桃。
分 佈：福建、江西。

1545. **Aromia** (s. str.) **moschata orientalis** Plavilstshikov 楊紅頸天牛 (Gressitt,

1951:201; Hua, 1982:26)
Aromia moschata, Saito, 1932:471.
=*Aromia moschata* var. *ambrosiaca*, Matsushita, 1933.252.
Aromia moschata var. *orientalis* Plavilstshakov, 1933:12.
=*Aromia moschata ambrosiaca* var. *vetusta* Yankovskii, 1934:107.
寄 主：山桃、桑、楊、柳類。
分 佈：江西、陝西、甘肅、華北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

1546. **Asias halodendri** (Pallas) 紅緣亞天牛 (ASZL 1986, 1:570; Chen et al., 1993:86; Gressitt, 1951:322; Hua, 1982:27; Zhang, 1987[ed.] 2:31)
Cerambyx halodendri Pallas, 1776:724. (Siberia)
=*Cerambyx humeralis* Olivier, 1795:38.
=*Cerambyx elaeagni* Fischer, 1824: pl. 49, f. 5-6.
Asias halodendri, Auriv., 1912:467.
=*Asias heptapotamicus* Semenov, 1926:48. (S. Russia)
=*Asias pirus* Arakawa, 1932:18. (S. Manchuria)
別 名：*紅緣天牛*。
寄 主：葡萄、棗、李、蘋果、沙棗、柳、小葉榆、忍冬、油茶、白欒、糖槭、錦雞兒、刺槐、榆、枸杞。
分 佈：江西、貴州、浙江、江蘇、河南、陝西、甘肅、寧夏、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、蒙古、西伯利亞、蘇聯南部。

1547. **Brachyclytus singularis** Kraatz 黑胸短虎天牛 (Gressitt, 1951:261; Hua, 1982:27)
Brachyclytus singularis Kraatz, 1879: pl. 1, f. 6.
=*Clytus fukukii* Seki, 1935:224.
別 名：*黑胸葡虎天牛*。
寄 主：葡萄。
分 佈：江蘇；朝鮮、日本、西伯利亞。

1548. **Callidium** (s. str.) **violaceum** (Linnaeus) 紫扁胸天牛 (Gressitt 1951:226; Hua, 1982:28)
Cerambyx violaceus Linnaeus, 1758:395.
Callidium violaceus, Fabricius, 1775:188.
寄 主：錐栗、雲杉、鵝耳櫪、山毛欅、櫟。
分 佈：臺灣(?)、內蒙古南部、黑龍江；朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲、北美。

1549. **Cataphrodisium castaneae** Gressitt 栗擬柄天牛 (Gressitt, 1951:192; Hua, 1982:28)
Cataphrodisium castaneae Gressitt, 1951:192.
寄 主：栗。
分 佈：雲南。

1550. **Ceresium flavipes** (Fabricius) 黃蠟天牛 (Gressitt, 1951:155; Hua, 1982:28)
Ceresium flavipes Fabricius, 1792:327. (Cape of Good Hope)
=*Stenochorus simplex* Gyllenhal, 1817:178. (E. Indies)
=*Arhopalus ambiguum* Newman, 1842:246. (Philippines)
Ceresium flavipes, Schwarzer, 1925:22.
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣、廣東、香港及沿海島嶼；菲律賓、寮國、印尼、印度、毛

里求斯、馬達加斯加、墨西哥。

1551. **Ceresium sculpticolle** Gressitt 胝胸蠟天牛 (Gressitt, 1951:156; Hua, 1982:28)
Ceresium sculpticolle Gressitt, 1942:1.
寄 主：柑橘。
分 佈：四川。

1552. **Ceresium sinicum** White 中華蠟天牛 (Gressitt, 1951:156; Hua, 1982:28; Hun., 1992:476; Xiao, 1992:474)
Ceresium sinicum White, 1855:245. (N. China)
=*Ceresium sinicum* ab. *5-maculatum* Plavilst., 1931:43.
別 名：*中華桑天牛*。
寄 主：桑、柑橘、桃、蘋果、水杉、池杉、杉木、柳杉、苦楝、刺槐、樟、梧桐、楓楊、楊、柳。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、河北、北京；日本、越南(北部)、寮國、泰國。
天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein) 兩色刺足蘭蜂(幼蟲)

1553. **Ceresium sinicum ornaticolle** Pic 斑胸蠟天牛 (Gressitt, 1951:157; Hua, 1982:28; Hun., 1992: 477; Xiao, 1992:474)
Ceresium sinicum orenaticolle Pic, 1907:20. (S. China)
Ceresium sinicum ab. *ornaticolle*, Plavilst., 1931:196.
寄 主：柑橘、蘋果、梨、石榴、桑、樟、楝、蓖麻。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、江蘇；越南、寮國。

1554. **Ceresium zeylanicum longicarne** Pic 橘蠟天牛 (Gressitt, 1951:157; Hua, 1982:29; Zhang, 1987[ed.] 2:31)
Ceresium zeylanicum, Schwarzer, 1925:22. (*nec* White)
=*Ceresium immite*, Sonan, 1925:44. (*nec* Newman)
=*Ceresium longicorne* Pic, 1926:24.
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣、江西；日本、琉球。

1555. **Chelidonium** (s. str.) **addictum** (Newman) 光胸長綠天牛 (Hua, 1982:30)
Callichroma addictum Newman, 1842:245. (Philippines)
=*Chelidonium* (?) *kotoense* Kano, 1931:182. (Taiwan: Lanyu Is., Philippines)
寄 主：蒲桃屬、番櫻桃屬。
分 佈：臺灣；菲律賓。

1556. **Chelidonium argentatum** (Dalman) 橘光綠天牛 (ASZI, 1986, 1:563; Chao, 1982:141; Chang, 1958:281-288; Hua, 1982:29; Hun., 1992:477; NZWDI, 1981:1935; Zhang, 1987[ed.] 2:31)
Cerambyx argentatum Dalman, 1817:151. (China)
Chelidonium argentatum, Thomson, 1864:176.
別 名：*光綠天牛*，*光盾綠天牛*，*光綠橘天牛*，*柑橘光盾枝綠天牛*，*柑橘光盾綠天牛*，*吹簫蟲*，*枝尾蟲*，*枝天牛*。
寄 主：檸檬、雪柑、椪柑、蕉柑、紅橘及蠶香科的柑屬、黃皮、核桃、九里香、兩面針、枸樹。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、香港、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西；越南、寮國、緬甸、印度。

1557. **Chelidonium cinctum** (Guerin-Meneville) 黃斑綠天牛 (Hua, 1982:29)

Chelidonium cinctum (Guerin-Meneville 1844:)

寄 主：柑橘、柚、橙。

分 佈：雲南；寮國、柬埔寨、印度。

1558. **Chelidonium citri** Gressitt 橘綠天牛 (ASZI, 1986,1:563; Gressitt, 1951:198; Hua, 1982:29)

Chelidonium citri Gressitt, 1942:2.

別 名：*綠橘天牛*。

寄 主：橘屬、朱欒。

分 佈：四川。

1559. **Chelidonium gibbicolle** (White) 瘤綠天牛 (ASZI, 1986, 1:563; Chao, 1982:141; Gressitt, 1951: 198; Luo et al., 1996:86; Wang, 1987[ed.]:203-204; Zhang, 1987[ed.] 2:31)

Callichroma gibbicolle White, 1853:160. ("N. China")

Chelidonium gibbicolle, Gahan,1906:213.

=*Chelidonium gibbicolle* var. *subgibbicolle* Pic, 1925:17.

=*Chelidonium gibbicolle* var. *rubrofemoralis* Pic, 1932:24.

別 名：*巖綠橘天牛*。

寄 主：柑橘、柚、蓮霧、山核桃。

分 佈：臺灣、福建、江西、海南、廣東、浙江、江蘇、安徽、河北；印度。

1560. **Chelidonium provosti** (Fairmaire) 榆綠天牛 (Gressitt, 1951:199; Hua, 1982:29)

Callichroma provosti Fairmaire, 1887:liv.

Chelidonium provosti, Gressitt, 1951:199.

寄 主：梨、榆、楊。

分 佈：陝西、河北。

1561. **Chelidonium quadricolle** Bates 楊綠天牛 (Gressitt, 1951:199; Hua, 1982:29)

Chelidonium quadricolle Bates, 1884:226.

寄 主：板栗、楊、桐、榆、槭屬、楓香屬。

分 佈：臺灣；朝鮮、日本。

1562. **Chelidonium sinense** (Hope) 中華綠天牛 (Hua, 1982:29)

Promeces sinense Hope, 1841:63. (China)

Chelidonium sinense, Gahan, 1906:212.

寄 主：柑橘。

分 佈：廣東；緬甸、印度、錫金。

1563. **Chlorophorus annularis** (Fabricius) 竹綠虎天牛 (ASZI, 1986, 1:568; Chang, 1963:216; Hua, 1982:31; Hun., 1992:478; Xiao, 1992:475; Yunn., 1987:667)

Callidium annulare Fabricius, 1787:156. (Siam)

=*Callidium bidens* Weber, 1801:90.

Chlorophorus annularis, Chevrolat, 1863:290.

別 名：*竹虎天牛*。

寄 主：梨、蘋果、葡萄、柑橘、板栗、楓、槭、柚木、牡丹屬、刺竹、慈竹、棉，而以竹材爲主。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、陝西、河北、遼寧、吉林；朝鮮、

日本、越南、寮國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞、澳洲北部、馬里安那南部。

天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein) 兩色刺足繭蜂(幼蟲)
Pristaulacus comptipennis Enderlein 旗蜂(幼蟲)

1564. **Chlorophorus diadema** (Motschulsky) 槐綠虎天牛 (ASZI, 1986, 1:569; Chung, 1987:41; Gressitt, 1951:276)
Clytus diadema Motschulsky, 1853:48.
=*Clytanthus latifasciatus*, Bates, 1884:228. (*nec* Fischer)
=*Clytus* (*Clytanthus*) *herzianus*, Gangl., 1886:134.
=*Clytus artemisiae* Fairmaire, 1888:143.
=*Chlorophorus diadema* var. *itoi* Matsushita, 1934:240.
=*Chlorophorus diadema* var. *breuningi* Heyrovsky, 1938:93.
=*Chlorophorus diadema* var. *kanekoi* Matsushita, 1941:154.
別 名：*刺槐綠虎天牛*，*王冠綠虎天牛*。
寄 主：櫻桃、酸櫻桃(*Prunus cerasus*)、葡萄、刺槐、洋槐、樺(*Betula*)、楠木。
分 佈：臺灣、江西、廣西、四川、湖北、江蘇、山東、山西、陝西、甘肅、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、蒙古。
天 敵：*Zombrus bicolor* (Enderlein) 兩色刺足繭蜂(幼蟲)

1565. **Chlorophorus eleodes** (Fairmaire) 欖綠虎天牛 (Gressitt, 1951:277; Hua, 1982:31)
Clytus eleodes Fairmaire, 1889:65.
=*Clytanthus insignifer* Pic, 1902:31.
Chlorophorus eleodes, Auriv., 1912:403.
寄 主：雲南松、刺桐屬、麻櫟、棉花。
分 佈：西藏、雲南、四川、貴州、湖北、陝西、新疆。

1566. **Chlorophorus figuratus** (Scopoli) 滅字綠虎天牛 (Gressitt, 1951:278; Hua, 1982:32)
Cerambyx figuratus Scopoli, 1763:55.
Chlorophorus figuratus, Plavilstshikov, 1940:472.
寄 主：栗、竹類、柳、楊。
分 佈：江西；西伯利亞、歐洲南部。

1567. **Chlorophorus japonicus** (Chevrolat) 日本長綠天牛 (Gressitt, 1951:278; Hua, 1982:32)
Anthoboscus japonicus Chevrolat, 1863:298.
Chlorophorus japonicus, Auriv., 1912:397.
=*Clytanthus japonicus* varr. *latepubescens*, *griseobimaculatus*, *rufotinctus* Pic, 1924:16.
寄 主：葡萄、鹽膚木、紫藤。
分 佈：江西、浙江、江蘇、山東、陝西、河北；朝鮮、日本、庫頁島。

1568. **Chlorophorus macaumensis** (Chevrolat) 澳門綠虎天牛 (Gressitt, 1951:279; Hua, 1982: 32)
Clytus macaumensis Chevrolat, 1845:98.
Chlorophorus macaumensis, Auriv., 1912:403.
寄 主：咖啡。
分 佈：廣東(澳門)、海南、廣西。

1569. **Chlorophorus notabilis cuneatus** (Fairmaire) 散斑綠虎天牛 (Gressitt, 1951:280; Hua, 1982:32)

Clytus (*Clytanthus*) *cuneatus* Fairmaire, 1888:35.
=*Clytanthus notabilis* var. *semiobliteratus* Pic. 1902:31.
Chlorophorus cuneatus, Auriv., 1912:403.
=*Chlorophorus notabilis* var. *obliteratus*, Auriv., 1912:398.
=*Chlorophorus subobliteratus* Pic, 1918:4. (n. n.)
寄 主：核桃。
分 佈：四川、陝西。

1570. **Chlorophorus quatuordecimmaculatus** (Chevrolat) 十四斑綠虎天牛 (Hua, 1982:33; Hua., 1992:478)
Anthoboscus 14-maculatus Chevrolat, 1863:295. (Nilgiris, S. India)
Chlorophorus quatuordecimmaculatus, Aurivillius, 1912:404.
=*Clytanthus guerryi* Pic, 1902:30. (S. China, Tonkin)
寄 主：葡萄、苦蕎、苧麻(?)。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、四川、貴州；越南、寮國、印度。

1571. **Chlorophorus quinquefasciatus** (Castelnau et Gory) 五帶綠虎天牛 (Gressitt, 1951:281; Hua, 1982:33)
Clytus quinquefasciatus Castelnau et Gory, 1841:101. (Japan)
Chlorophorus quinquefasciatus, Kano, 1927:67.
寄 主：李。
分 佈：臺灣；朝鮮、日本。

1572. **Cleroclytus stgrigicollis** Jakovlev 溝胸細條虎天牛 (Gressitt, 1951:309; Xiao, 1992:476)
Cleroclytus strigicollis Jakovlev, 1900:663.
寄 主：蘋果、梨、李、杏、山楂、沙棗、柳、胡楊、野薔薇、接骨木。
分 佈：新疆；蘇聯。

1573. **Clytobius davidis** (Fairmaire) 槐黑星瘤虎天牛 (ASZI, 1986, 1:568; Gressitt, 1951:262; Hua, 1982:34)
Clytus davidis Fairmaire, 1878:132.
Clytobius davidis, Gressitt, 1951:262.
別 名：*槐黑星虎天牛*。
寄 主：桑、國槐、榆。
分 佈：華中、江蘇、河北。

1574. **Cyrtoclytus capra** (Germar) 黃紋曲虎天牛 (Gressitt, 1951:259; Hua, 1982:35)
Callidium (*Clytus*) *capra* Germar, 1824:518.
Cyrtoclytus capra, Gangl., 1882:58(736).
=*Cyrtoclytus capra* ab. *inbasalis* Plavilstshikov, 1924:229.
=*Cyrtoclytus sachalinensis* Kano, 1933:134.
寄 主：紅松、赤楊。
分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、庫頁島、西伯利亞、歐洲。

1575. **Cyrtoclytus caproides** (Bates) 柿曲虎天牛 (Gressitt, 1951:259; Hua, 1982:35)
Clytus caproides Bates, 1873:200.
Cyrticlytus caproides, Auriv., 1912:373.
寄 主：柿、樺屬、檞木屬。